

线性代数总复习 II

考试班级_____学号_____姓名_____成绩_____

试卷说明:

1. 本次考试为闭卷考试。本试卷共计 4 页, 共 八 大部分, 请勿漏答;
2. 考试时间为 120 分钟, 请掌握好答题时间;
3. 答题之前, 请将试卷和答题纸上的考试班级、学号、姓名填写清楚;
4. 本试卷答案全部写在试卷上;
5. 答题完毕, 请将试卷正面向外摊开交回, 不得带出考场;

考试中心提示: 请你遵守考场纪律, 诚信考试、公平竞争!

一、填空题(本题共 10 小题, 每题 3 分, 共 30 分)

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 1$, $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 - c_1 \\ a_2 & b_2 - c_2 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设三阶行列式 $|-2A| = 8$, 则 $|A| =$ _____.

3. 设 $D(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix}$, 则 $D(x) = 0$ 的全部根为_____.

4. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ x & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & y \end{bmatrix}$, $A = B$ 则 _____.

5. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____.

6. 已知非齐次线性方程组 $AX = b$ 无解, 则 $R(A)$ _____ $R(A, b)$ (填 “>”, “=” 或 “<”).

7. 矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 中每一行诸元素之和为零时, 则 $|A| =$ _____.

8. 设 A 为 n 阶矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 若 A 有一个特征值为 -2 , 则 $|2E + A| =$ _____.

9. 已知 n 阶方阵 A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$, 则 A 的全部特征值为_____.

10. 设 $A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & b \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$ 是正交矩阵, 则 $b =$ _____.

二、单项选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 齐次方程组 $\begin{cases} (k-1)x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + (k-1)x_2 = 0 \end{cases}$ 只有零解的充要条件是 ().

- (A) $k \neq -1$ (B) $k \neq 3$ (C) $k \neq -1$ 且 $k \neq 3$ (D) $k \neq -1$ 或 $k \neq 3$

2. 设 A, B, X 均为 n 阶矩阵, 且 A, B 可逆, 则下列结论 **错误** 的是 ().

- (A) 若 $AX=B$, 则 $X=A^{-1}B$ (B) 若 $XA=B$, 则 $X=BA^{-1}$
(C) 若 $AXB=C$, 则 $X=A^{-1}CB^{-1}$ (D) 若 $ABX=C$, 则 $X=A^{-1}B^{-1}C$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11}+a_{31} & a_{12}+a_{32} & a_{13}+a_{33} \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$

则 $B = ()$ 成立.

- (A) AP_1P_2 (B) AP_2P_1 (C) P_1P_2A (D) P_2P_1A

4. 设 $A_{m \times s}, B_{s \times n}$, 则以下正确的结论是 ().

- (A) $R(AB) \leq R(A), R(AB) \leq R(B);$ (B) $R(AB) < R(A), R(AB) < R(B)$
(C) $R(AB) < R(A) + R(B);$ (D) $R(AB) \leq R(A) + R(B)$

5. n 阶矩阵 A 与 B 相似的充分条件是 ().

- (A) $A \sim B$ (B) $R(A) = R(B)$ (C) A 与 B 有相同的特征多项式.
(D) A 与 B 有相同的特征多项式且 n 个特征值互不相同.

三、(本题 10 分) 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 2 & 2 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & -5 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, 求 $A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43}$

四、(本题 10 分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, B 为三阶矩阵, 且满足 $A^2 = E + AB$, 求矩阵 B .

五、(本题 10 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 3, 0, 5)^T, \alpha_2 = (1, 2, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 1, 2, 3)^T,$

$\alpha_4 = (1, -3, 6, -1)^T, \alpha_5 = (1, a, 3, b)^T$ 的秩为 2.

(1) 求 a, b 的值

(2) 求此向量组的一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

六、(本题 12 分) 化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 为标准形, 并写出所用的正交线性替换.

七、(本题 6 分) 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 . 试证:

$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2$ ($c_1c_2 \neq 0$) 不是 A 的特征向量.

八、(本题 7 分) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$,

试讨论向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.