



Abbott



SUPLEMENTACIÓN

**Detección del Riesgo y
Valoración Nutricional**



Abbott

Objetivos



- ❖ Reconocer el proceso de tamización y evaluación nutricional como punto de partida del cuidado nutricional
- ❖ Conocer las herramientas de tamización nutricional a utilizar en los diferentes ámbitos de atención
- ❖ Aplicar herramientas alternativas de valoración nutricional

Tamización vs valoración





Abbott

Tamización nutricional



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

Prueba, procedimiento o examen estandarizado que se usa para identificar pacientes que requieren intervención especial; esta prueba puede ser aplicada por profesionales de la salud que **no necesariamente son nutricionistas.**

Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos

Proceso para identificar un individuo desnutrido o a riesgo de desnutrición para determinar si se encuentra **indicada una valoración nutricional detallada.**

Sociedad Americana para la Nutrición Parenteral y Enteral ASPEN

Proceso rápido y simple realizado por personal de salud en ámbito hospitalario o comunitario, el cual tiene como objeto **predecir la probabilidad de mejores o peores desenlaces** debido a factores nutricionales.

Sociedad Europea para la Nutrición Enteral y Parenteral ESPEN

Writing Group of the Nutrition Care Process/Standardized Lan- guage Committee. Nutrition care process and model part I: the 2008 update. J Am Diet Assoc. 2008
Definition of terms, style, and conventions used in A.S.P.E.N. guidelines and standards. Nutr Clin Pract. 2005
Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Terminology, definitions and general topics. Clin Nutr. 2006



Abbott

Tamización vs valoración




*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

	Tamización	Valoración
Objetivo	Identificar individuos a riesgo	Emitir un diagnóstico nutricional
Realizado por	Profesional de la salud	Profesional en nutrición y dietética
Ingesta Dietética	Cambios recientes	Medición cuantitativa de nutrientes Frecuencia de consumo
Antropometría	Variación en el peso	Talla, Pesos, composición corporal
Bioquímicos	No aplica	Perfil nutricional completo
Examen Físico	Apariencia general	Revisión por sistemas
Historia Clínica	No se incluye	Historial socio económico Antecedentes

¿A quién tamizar y cuándo hacerlo?



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™





Abbott



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

Herramientas de tamización

Una buena herramienta debe ser:¹

- ✓ Válida
- ✓ Fiable
- ✓ Reproducible
- ✓ Práctica
- ✓ Económica
- ✓ **Conectada con un protocolo de actuación**

El uso de herramientas validadas se asocia con un mejor cuidado nutricional y disminución de la prevalencia de malnutrición en pacientes hospitalizados.²


1.Jones JM. The methodology of nutritional screening and assessment tools. J Hum Nutr Diet 2002

2.Eglseer, D., Halfens, R. J. G., & Lohrmann, C. Is the presence of a validated malnutrition screening tool associated with better nutritional care in hospitalized patients? Nutrition, 37, 104–111. 2017

Puntos clave para la tamización



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™



Riesgo Nutricional

Herramientas de tamización



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

Herramienta	IMC	Pérdida Peso	Baja Ingesta	Severidad Enfermedad	Tiempo promedio requerido
SNAQ		X	X		5 min
MNA	X	X	X	X	5 min
MUST	X	X	X	X	5 - 8 min
MST		X	X		No reportado
NRS 2002	X	X	X	X	10 min

Tomado de: Ulibarri J. I., Burgos R., Lobo G., Martínez M. A., Planas M., Pérez de la Cruz A. et al . Recomendaciones sobre la evaluación del riesgo de desnutrición en los pacientes hospitalizados. Nutr. Hosp. [Internet]. 2009



Abbott



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

Comunidad: tamizaje universal MUST

PASO 1: IMC	
> 20	0 Puntos
18.5 - 20	1 Punto
< 18.5	2 puntos
PASO 2: PÉRDIDA DE PESO	
Menor a 5%	0 Puntos
5 – 10%	1 Punto
Mayor a 10%	2 puntos
PASO 3: EFECTO DE LA ENFERMEDAD	
Paciente con enfermedad aguda o crónica descompensada, que ha estado o es posible que vaya a estar sin aporte nutricional por más de 5 días	2 puntos

0 puntos: Bajo riesgo nutricional

1 punto: Moderado riesgo nutricional

Más de 2 puntos: Alto riesgo nutricional

Elia M. Screening for malnutrition: A multidisciplinary responsibility. Development and Use of the Malnutrition Universal Screening Tool ('MUST') for Adults. Redditch: BAPEN; 2003.

Plan de intervención



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

BAJO RIESGO

- Recomendaciones básicas
- Repetir el tamizaje
- Hospital: todas las semanas
- Residencias: todos los meses
- Comunidad: cada año

RIESGO MODERADO

- Documentar el aporte dietético durante 3 días
- Si el aporte es *suficiente*: repetir el tamizaje
- Hospital: todas las semanas
- Residencias: todos los meses
- Comunidad: cada 2-3 meses
- Si el aporte es *insuficiente*: mejorar y aumentar el aporte nutricional total, controlar y realizar ajustes

ALTO RIESGO

- Derivar a un profesional en nutrición o a un equipo de apoyo nutricional
- Mejorar y aumentar el aporte nutricional total, controlar y revisar ajustes.
- Repetir el tamizaje
- Hospital: todas las semanas
- Residencias: todos los meses
- Comunidad: todos los meses

Hospitalización: NRS-2002

TAMIZAJE INICIAL	SI	NO
IMC < 20,5		
Pérdida de peso en los últimos 3 meses		
Disminución de la ingesta en la última semana		
Existe una enfermedad grave		

Si la respuesta es **SI** a cualquiera
de las preguntas



Continuar con el tamizaje final

Si la respuesta es **NO** a todas
las preguntas



Reevaluar en una semana

Kondrup J, Rasmussen H H, Hamberg O et al. Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clin Nutr 2003

Hospitalización: NRS-2002



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

TAMIZAJE FINAL

ESTADO NUTRICIONAL		SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD	
Ausente 0 Puntos	Estado nutricional normal	Ausente 0 Puntos	Requerimientos nutricionales normales
Leve 1 Punto	Pérdida de peso >5% en 3 meses ó ingesta 50-75% requerimientos en la última semana	Leve 1 Punto	Fractura cadera, pacientes crónicos (cirrosis, EPOC, hemodiálisis, DM, oncológicos)
Moderado 2 Puntos	Pérdida de peso >5% en 2 meses o IMC 18.5-20.5 + deterioro estado general ó ingesta 25-60% requerimientos en la última semana	Moderado 2 Puntos	Cirugía mayor abdominal, neumonía grave, Neoplasias hematológicas.
Severo 3 Puntos	Pérdida de peso >5% en 1 mes (>15% en 3 meses) o IMC <18.5 + deterioro estado general ó ingesta 0-25% requerimientos en la última semana	Severo 3 Puntos	TCE, Pacientes críticos (UCI)
Edad: Si ≥ 70 años, añadir 1 punto a la suma total			

NRS-2002: plan de intervención



≥ 3 puntos: Riesgo Nutricional

Es necesario implementar soporte nutricional

< 3 puntos: Bajo riesgo

Realizar tamización nutricional semanal

Si el paciente va a ser llevado a cirugía debe recibir aporte nutricional preventivo

Kondrup J, Rasmussen H H, Hamberg O et al. Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clin Nutr 2003; 22: 321–336

Herramientas de Tamización para poblaciones específicas



Abbott

Población geriátrica – MNA - SF



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

PREGUNTA	INTERPRETACIÓN
A) ¿Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución en los últimos 3 meses?	0 = ha comido mucho menos 1 = ha comido menos 2 = ha comido igual
B) Pérdida reciente de peso (<3 meses)	0 = pérdida de peso > 3 kg 1 = no lo sabe 2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg 3 = no ha habido pérdida de peso
C) Movilidad	0 = de la cama al sillón 1 = autonomía en el interior 2 = sale del domicilio
D) Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses	0 = sí 2 = no
E) Problemas neuropsicológicos	0 = demencia o depresión grave 1 = demencia moderada 2 = sin problemas psicológicos
F1) Índice de masa corporal (IMC = peso / (talla) ² en kg/m ²)	0 = IMC <19 1 = IMC 19 – 20.9 2 = IMC 21 – 23 3 = IMC > 23
SI EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL NO ESTÁ DISPONIBLE, POR FAVOR SUSTITUYA LA PREGUNTA F1 CON LA F2. NO CONTESTE LA PREGUNTA F2 SI HA PODIDO CONTESTAR A LA F1.	
F2) Circunferencia de la pantorrilla	0 = CP < 31cm 3 = CP > 31cm




Abbott

Plan de intervención MNA - SF



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™



Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice : Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA- SF). J. Geront 2001

Paciente en cuidado intensivo – NUTRIC SCORE

Variable	Rango	Puntaje
Edad	< 50	0
	50 - 75	1
	> 75	2
APACHE II (Evaluación Fisiológica aguda y crónica)	< 15	0
	15 -19	1
	20 - 28	2
	< 28	3
SOFA (Evaluación de falla orgánica relacionada con la sepsis)	< 6	0
	6 – 10	1
	> 10	2
Número de Comorbilidades	0 - 1	0
	> 2	1
Días en el hospital hasta el ingreso a UCI	0 - 1	0
	> 1	1

Si se tiene disponible IL
6, tenerla en cuenta

0 - < 400	0
≥ 400	1

Incluyendo valores de IL 6		
Puntaje	Categoría	Interpretación
6 - 10	Alto Puntaje	Asociado con peores desenlaces clínicos (mortalidad, ventilación). Paciente que se beneficia de terapia nutricional agresiva
0 - 5	Bajo Puntaje	Paciente con bajo riesgo nutricional
Sin incluir valores de IL 6		
Puntaje	Categoría	Interpretación
5 - 9	Alto Puntaje	Asociado con peores desenlaces clínicos (mortalidad, ventilación). Paciente que se beneficia de terapia nutricional agresiva
0 - 4	Bajo Puntaje	Paciente con bajo riesgo nutricional

Rahman A, Hasan RM, Agarwala R, et al. Identifying critically-ill patients who will benefit most from nutritional therapy: Further validation of the "modified NUTRIC" nutritional risk assessment tool. Clin Nutr. 2015.

PARTE 1		Puntaje
1. Ha tenido pérdida involuntaria de peso en los últimos 3 meses?	No	0
	No estoy seguro	2
2. Si la respuesta es si, cuantos kilos ha perdido?	1 – 5 Kg	1
	6 – 10 Kg	2
	11 – 15	3
	> 15	4
	No está seguro	2
3. Ha estado comiendo menos en la última semana a causa de disminución del apetito?	No	0
	Si	1

Arribas L, Hurtós L et al. NUTRISCORE: A new nutritional screening tool for oncological outpatients. Nutrition (33). January 2017

Parte 2		
Localización/Neoplasia	Riesgo Nutricional	Puntaje
Cabeza y cuello. Tracto gastro intestinal: esófago, estómago, páncreas, intestino. Linfomas que comprometen el tracto gastrointestinal	Alto**	+2
Pulmón. Abdomen y pelvis: hígado, vía biliar, renal, ovario, endometrio	Medio	+1
Mama. Sistema nervioso central. Vejiga, próstata, colorectal, leucemia, otros linfomas	Bajo	+0

** Repetir el tamizaje semanalmente en aquellos pacientes con alto riesgo

Arribas L, Hurtós L et al. NUTRISCORE: A new nutritional screening tool for oncological outpatients. Nutrition (33). January 2017

Parte 3 Tratamiento		
El paciente recibe concomitantemente quimio y radioterapia		
El paciente está recibiendo radioterapia	SI (+2)	NO (+0)
Trasplante de células madres hematopoyéticas		
El paciente está recibiendo quimioterapia		
El paciente solo recibe radioterapia	SI (+1)	NO (+0)
Otros tratamientos o solo tratamiento sintomático	SI (+0)	NO (+0)

Interpretación: ≥ 5 puntos = Paciente está a riesgo nutricional. Remitir a especialista en nutrición



Abbott




*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™

Siguiente Paso: Obtener el Diagnóstico Nutricional

Valoración nutricional




*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™



Valoración nutricional objetiva



*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™



Composición Corporal

Reserva Muscular
(componente proteico)

Reserva Adiposa
(componente calórico)

Desnutrición
Proteico/Calórica)

Cronicidad

Agotamiento
Corto Plazo

Agotamiento
Largo Plazo

Desnutrición
Aguda/Crónica

Severidad

Depleción
Leve

Depleción
Moderada

Depleción
Severa

Leve/Moderada/
Severa

Etiología

Primaria:
Bajo Aporte

Secundaria:
Enfermedad

Mixta

Primaria/Secundaria/
Mixta

- **Ingesta de energía insuficiente:** % de nutrientes consumidos / administrados frente a la necesidades
- **Pérdida de peso no deseada:** puede ocurrir en cualquier índice de masa corporal

Examen físico

- Pérdida de masa muscular
- Pérdida de grasa subcutánea
- Evidencia de acumulación de líquidos

El hallazgo positivo en cualquiera de 2 características indica desnutrición.

Función física disminuida

- Fuerza de agarre de la mano
- SPPB (Batería de rendimiento físico corto) para pacientes de edad avanzada
- Otro

White JV, Guenter P, Jensen G, Malone A, Schofield M. Consensus statement: Academy of Nutrition and Dietetics and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012

1. Tamizaje



2. Valoración Diagnóstica



3. Diagnóstico



4. Grado de Severidad

Riesgo de Malnutrición

- Utilizar herramientas validadas de tamizaje



Criterios de Valoración

• Fenotípicos

- Pérdida de peso involuntaria
- Bajo índice de masa corporal
- Masa muscular disminuida

• Etiológicos

- Reducción en el consumo de alimentos o absorción
- Carga de la enfermedad/Condición inflamatoria



Cumple criterios de diagnóstico de malnutrición

- Se requiere mínimo 1 criterio Fenotípico y 1 Etiológico



Determinar la severidad de la malnutrición

- La severidad se determina según **criterios Fenotípicos**



Abbott

GLIM: Criterios diagnósticos de malnutrición




*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™


Fenotípico			Etiológico	
% de pérdida de peso	Bajo IMC (kg/mts ²)	Baja masa muscular	Ingesta o absorción disminuida	Inflamación
> 5% en los últimos 6 meses	< 20 si < 70 años O < 22 si > 70 años	Baja, según las técnicas validadas para medir composición corporal (DEXA, Bioimpedancia, TAC, Resonancia, Antropometría de brazo o pantorrilla)	< 50% del requerimiento energético > a 1 semana O Cualquier disminución > de 2 semanas O Condición crónica gastrointestinal que afecte la absorción	Aguda Enfermedad/Trauma Crónica Por patología de base
> 10% en más de 6 meses				

Umbrales de severidad – basado en fenotipo

Criterios Fenotípicos			
Etapa	% de pérdida de peso	Bajo IMC (kg/m ²)	Baja masa muscular
1 o malnutrición moderada (Se debe cumplir 1 de estos criterios)	5 - 10% en los últimos 6 meses, o 10 – 20% en más de 6 meses	< 20 si < 70 años, o < 22 si > 70 años	Déficit leve a moderado, según las técnicas validadas para medir composición corporal
2 o malnutrición severa (Se debe cumplir 1 de estos criterios)	> 10% en los últimos 6 meses, o > 20% en más de 6 meses	< 18.5 si < 70 años, o < 20 si > 70 años	Déficit severo, según las técnicas validadas para medir composición corporal



White JV, Guenter P, Jensen G, Malone A, Schofield M. Consensus statement of the Academy of Nutrition and Dietetics/American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition). J Acad Nutr Diet. 2012





Cederholm et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1)

La importancia del examen físico




*** SUPLEMENTACIÓN ***
TERAPIA NUTRICIONAL TOTAL™



Depleción severa



Cleveland Clinic Center for Human Nutrition, Digestive Diseases Institute and Charney P et al, Practice Paper of the Academy of Nutrition and Dietetics: Critical Thinking Skills in Nutrition Assessment and Diagnosis. JAND. 2013



Depleción severa



Abbott

Conclusiones



- ❖ La tamización nutricional permite identificar los individuos a riesgo de desnutrirse y por lo tanto priorizar la intervención
- ❖ Se debe elegir la herramienta de tamización nutricional que se adapte a las necesidades de la población
- ❖ La valoración nutricional objetiva permite obtener diagnósticos nutricionales completos que incuyan composición corporal, cronicidad, severidad y etiología
- ❖ Las herramientas alternativas de valoración nutricional son una opción para agilizar los procesos y establecer el estado nutricional de todos los pacientes independientemente de su condición clínica