

第十五章 多值函数

多值函数的概念源于复分析，它有别于通常意义下的“函数”，将其视为映射是更为恰当的做法。下面给出定义与例子。我们用 2^X 表示集合 X 的所有子集的全体。

称 f 是平面集合 Ω 上的一个多值函数，指的是映射 $f: \Omega \rightarrow 2^{\mathbb{C}} \setminus \{\emptyset\}$ 。即对任意 $z \in \Omega$, $f(z)$ 为平面的一个非空子集。

多值函数的例子：

- 给定平面的两个非空子集 X, Y , 满射 $f: X \rightarrow Y$ 诱导了 Y 上的多值函数 $g: Y \rightarrow 2^X$, 定义为 $g(y) = f^{-1}(y)$ 。
- 辐角 Arg 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的一个多值函数：对任意 $z = re^{i\theta}$, $\text{Arg}(z) = \theta + 2\pi\mathbb{Z}$ 。
- 开方 $\sqrt{\cdot}$ 定义了平面 \mathbb{C} 上的一个多值函数：对任意 $z \in \mathbb{C}$,

$$\sqrt{z} = \{w \in \mathbb{C}; w^2 = z\}.$$

称 $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Ω 上多值函数 f 的单值分支 (或者单值支), 如果对任意 $z \in \Omega$, 指定唯一取值 $g(z) \in f(z)$ 。由定义可见, 单值支是通常意义下的函数。

本章介绍几类重要的多值函数：对数函数，辐角函数，幂函数。从复分析的观点看，先引入对数函数最为自然，辐角函数和幂函数都可由对数函数诱导。

15.1 对数函数

对数函数可视为指数函数的“逆函数”。

任取 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 它的对数 (logarithm) $\text{Log}(z)$ 定义为满足方程 $e^w = z$ 的 w 的集合：

$$\text{Log}(z) = \{w \in \mathbb{C}; e^w = z\}.$$

记 $z = re^{i\theta}, w = u + iv \in \text{Log}(z)$, 由方程 $e^{u+iv} = re^{i\theta}$ 可得 $u = \log r, v = \theta + 2k\mathbb{Z}$, 因此

$$\text{Log}(z) = \log |z| + i(\theta + 2\pi\mathbb{Z}) = \log |z| + i\text{Arg}(z),$$

这里, \log 是通常意义的实对数函数。上式表明, $\text{Log}(z)$ 是一个多值函数, 它的多值性源于辐角函数 Arg 的多值性。

易见, 函数 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 是 $\text{Log}(z)$ 在区域 Ω 上单值支, 如果

$$F(z) \in \text{Log}(z), \forall z \in \Omega \iff e^{F(z)} = z, \forall z \in \Omega.$$

这说明 F 是指数函数 e^w 在像区域 Ω 上的反函数, 因此亦全纯。

一个自然的问题是, “在什么样的区域 Ω 上 $\text{Log}(z)$ 可以取到全纯单值分支?”, 此问题等价于 “在什么样的像区域上指数函数可以取到反函数?” 下面的定理给出了回答。

定理 15.1. 假设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是单连通区域, $0 \notin \Omega$ 。取定 $z_0 \in \Omega$, 指定其一个辐角为 θ_0 。则存在唯一的全纯函数 $F: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, 满足

- (1). $e^{F(z)} = z, \forall z \in \Omega;$
- (2). $F(z_0) = \log |z_0| + i\theta_0.$

我们称 F 是对数函数 Log 满足 $F(z_0) = \log |z_0| + i\theta_0$ 的全纯单值分支。

证明: 基本想法: 如果 F 存在, 对 (1) 两边求导, $F'(z)e^{F(z)} = 1$ 。这说明 $F'(z) = e^{-F(z)} = 1/z$, 即 F 为 $1/z$ 的原函数。

下面通过考虑 $1/z$ 原函数的存在性, 来构造 F 。

假设条件 $0 \notin \Omega$ 保证了 $1/z$ 是 Ω 上的全纯函数, Ω 的单连通性保证 $1/z$ 存在原函数。原函数可定义如下:

$$F(z) = \int_{\gamma_z} \frac{1}{\zeta} d\zeta + \log |z_0| + i\theta_0,$$

其中 γ_z 是连接 z_0 与 z 的一条分段光滑曲线 (积分不依赖于路径的选取)。显然 $F(z_0) = \log |z_0| + i\theta_0$ 。

下面说明 $e^{F(z)} = z$ 。事实上,

$$(e^{-F(z)}z)' = e^{-F(z)} - ze^{-F(z)}F'(z) = e^{-F(z)}(1 - zF'(z)) = 0,$$

这说明 $e^{-F(z)}z$ 是常值函数。由 $e^{-F(z_0)}z_0 = 1$ 知 $e^{F(z)} \equiv z$ 。

最后说明 F 的唯一性。如果 G 也是一个满足要求的单值全纯分支, 则 $e^{F(z)} \equiv e^{G(z)}$ 。这说明 $F(z) - G(z) \in 2\pi i\mathbb{Z}$ 。注意到




图 15.1: 对数函数的两个单值支

$F - G$ 连续, 取值离散, 因此必为常值函数。由 $(F - G)(z_0) = 0$ 可知, $F \equiv G$ 。

注:

1. 如果 $0 \in \Omega$, 结论不成立。因为 0 关于指数函数没有逆像。如果 $0 \notin \Omega$, 但 Ω 非单连通, 结论也可能成立。事实上, 只要 Ω 包含在一个更大且不含原点的单连通区域中即可。
2. 对任意两个不同的全纯单值分支 F, G , 存在 $k \in \mathbb{Z}$,

$$F - G \equiv 2k\pi i.$$

3. 在一些典型区域, 如角域 $\{w \in \mathbb{C} \setminus \{0\}; \arg w \in (\alpha, \beta)\} (\beta - \alpha < 2\pi)$ 上, 对数函数可取到全纯单值分支 F_k , 将角域映为水平带域 $\{\alpha + 2k\pi < \Im z < \beta + 2k\pi\} = \mathbb{R} \times (\alpha + 2k\pi, \beta + 2k\pi)$ 。

对数函数的全纯单值分支 F 的虚部即为辐角函数 Arg 的一个单值连续 (实值, 故不全纯) 分支。利用这个事实, 得

推论 15.1. 假设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是单连通区域, $0 \notin \Omega$ 。取定 $z_0 \in \Omega$, 指定其一个辐角为 θ_0 。存在唯一的连续的辐角函数 $\arg_\Omega : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 满足 $\arg_\Omega(z_0) = \theta_0$ 。

称 \arg_Ω 是辐角函数 Arg 满足 $\arg_\Omega(z_0) = \theta_0$ 的一个连续的单值分支。

证明: 由定理15.1可知, 对数函数存在全纯单值分支 F , 满足 $F(z_0) = \log |z_0| + i\theta_0$. 取 $\arg_{\Omega}(z) = \operatorname{Im} F(z)$ 即可. 唯一性仍由“连续且取值离散的函数必为常数”这一事实可得.

15.2 幂函数

形如 $w = z^{\mu}$ 的函数称为幂函数, 这里 $\mu = a + ib$ 是一个复数. 如果约定 $\operatorname{Log}(z^{\mu}) = \mu \operatorname{Log}(z)$, 幂函数的合理定义为:

$$\begin{aligned} z^{\mu} &= e^{\operatorname{Log}(z^{\mu})} = e^{\mu \operatorname{Log}(z)} \\ &= e^{(a+ib)(\log |z| + i \operatorname{Arg}(z))} \\ &= e^{a \log |z| - b \operatorname{Arg}(z)} e^{i(b \log |z| + a \operatorname{Arg}(z))}. \end{aligned}$$

由此可见, 在一般情况下, z^{μ} 的模长与辐角都为多值函数.

为讨论方便, 给出单叶性区域的概念. 假设 f 是区域 Ω 上的全纯函数, 如果 D 是 Ω 的一个子区域, 且 $f|_D$ 是单射, 则称 D 是 f 的一个单叶性区域. “单叶”的概念源自复分析, 指全纯单射.

下面分情况讨论, 由简入繁, 循序渐进.

(1). $\mu = n$, n 是一个自然数.

此时, 幂函数 $w = z^n$ 在整个复平面上全纯. 求导数得 $(z^n)' = nz^{n-1}$, 说明它在原点之外处处共形.

记 $z = re^{i\theta}$, 则 $w = r^n e^{in\theta}$. 由此知, 它将从原点出发的射线映为从原点出发的射线, 将两条射线的夹角放大到 n 倍, 将圆周 $\{|z| = r\}$ 映为圆周 $\{|z| = r^n\}$. 特别地, 将角域

$$A_k = \left\{ re^{i\theta}; 0 < r < \infty, \frac{2k\pi}{n} < \theta < \frac{2(k+1)\pi}{n} \right\}, 0 \leq k < n$$

映为 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$. 显然, 角域 A_k 是幂函数 $w = z^n$ 的单叶性区域.

(2). $\mu = 1/n$, n 是一个自然数. 此时

$$z^{1/n} = e^{\operatorname{Log}(z)/n} = e^{(\log |z| + i \operatorname{Arg}(z))/n} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \operatorname{Arg}(z)/n}.$$

由此可见, 给定 $z_0 = r_0 e^{i\theta_0} \neq 0$, $z_0^{1/n}$ 有 n 个不同的取值:

$$\sqrt[n]{r_0} e^{i(\theta_0 + 2k\pi)/n}, 0 \leq k \leq n-1.$$

$z^{1/n}$ 的多值性由辐角函数 $\operatorname{Arg}(z)$ 的多值性引起的. 因此, 如果能找到区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 使得 $\operatorname{Arg}(z)$ 能取到连续的单值分支, 则

$z^{1/n}$ 可以取到全纯的单值分支。由上一节的讨论知, 在平面不含原点的单连通区域 (如 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$) 上, $\text{Arg}(z)$ 能取到连续的单值函数, 从而 $z^{1/n}$ 可以取到全纯的单值分支。

$z^{1/n}$ 在 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ 上可以取到 n 个单值的全纯分支

$$\psi_k(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{i \arg_k(z)/n}, \quad 0 \leq k \leq n-1,$$

这里 $\arg_k : \mathbb{C} \setminus [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的辐角函数, 满足 $\arg_k(-1) = (2k+1)\pi$ 。映射 ψ_k 将 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ 双全纯映为角域 $A_k = \{re^{i\theta}; 0 < r < +\infty, 2k\pi/n < \theta < 2(k+1)\pi/n\}$ 。

单值支由多值函数 $z^{1/n}$ 在某一点的取值完全确定。比如, 如果指定 $i^{1/n} = e^{i\pi/(2n)}$, 则确定的单值支为 ψ_1 , 从而区域 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ 上其他点的取值都可以确定。




图 15.2: $w = z^{1/4}$ 的四个单值支

(3). $b = 0, a = p/q \in \mathbb{Q}, (p, q) = 1$ 。此时

$$z^{p/q} = |z|^{p/q} e^{i(p/q)\text{Arg}(z)}.$$

假定 $z \neq 0$, 则 $z^{p/q}$ 有 q 个不同的取值。多值性源于辐角函数的多值性。如前所知, 在不含原点的单连通区域上, 辐角函数 Arg 可取到连续的单值支, 因此 $z^{p/q}$ 可取到 q 个不同的全纯单值分支。每个全纯单值分支将角域映到角域。

(4). $b = 0, a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 。此时

$$z^a = |z|^a e^{ia\text{Arg}(z)},$$

亦为多值函数, 多值性源于辐角函数的多值性。在不含原点的单连通区域 $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ 上, z^a 可以取到全纯单值分支。取定 -1

的一个辐角 $(2k+1)\pi$, 则 z^a 有唯一的分支 ψ_k 满足 $\psi_k(-1) = e^{ia(2k+1)\pi}$. 因 a 是无理数, 故集合

$$\{e^{ia(2k+1)\pi}; k \in \mathbb{Z}\}$$

是无限集. 因此, z^a 有可数无穷多个全纯单值分支.

一个有趣的事实是: 幂函数 z^a 在 $z = re^{i\theta} \neq 0$ 处的所有取值 $\{r^a e^{ia(\theta+2k\pi)}; k \in \mathbb{Z}\}$ 在圆周 $\{|w| = r^a\}$ 上稠密.

(5). $b \neq 0$. 此时

$$z^{a+ib} = e^{a \log |z| - b \operatorname{Arg}(z)} e^{i(b \log |z| + a \operatorname{Arg}(z))}.$$

它的模长是多值函数. 辐角在 $a \neq 0$ 时也是多值函数. 类似前面讨论, 它在不含原点的单连通区域上可取到全纯的单值分支.

例题 15.1. 假设 f 为多值函数 z^i 在区域 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上满足 $f(1) = e^{-4\pi}$ 的单值全纯分支. 求 $f(i)$ 的值.

解: 由 $z^i = e^{i \operatorname{Log}(z)} = e^{-\operatorname{Arg}(z)} \cdot e^{i \log |z|}$ 知, 模长是一个多值函数, 多值性由辐角函数引起. 在区域 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上, z^i 可以取到单值全纯分支, 表示为

$$f(z) = e^{-\theta(z)} \cdot e^{i \log |z|}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0],$$

其中 $\theta: \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续的辐角函数.

如果 $f(1) = e^{-4\pi}$, 则

$$e^{-\theta(1)} \cdot e^{i \log |1|} = e^{-\theta(1)} = e^{-4\pi}.$$

由此得 $\theta(1) = 4\pi$. 由 θ 在区域 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上的连续性可知 $\theta(i) = 4\pi + \pi/2 = 9\pi/2$. 由此可得

$$f(i) = e^{-\theta(i)} \cdot e^{i \log |i|} = e^{-9\pi/2}.$$

15.3 习题

《画廊》-埃舍尔 (Escher, 1898-1972)

这是荷兰版画家埃舍尔最得意的作品之一, 局部可看作在变换 z^α 下的像. 电影《盗梦空间》中弯曲的巴黎街道就受此影响.



埃舍尔想在《画廊》中表现这样一副有趣的场景：画廊中一个人在欣赏一幅城市风景画，风景画里也有家画廊，画廊中有个人也在欣赏一幅城市风景画…。看起来很像我们熟悉的那个永远讲不完的故事：“从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚在讲故事：从前有座山…”

遗憾的是，埃舍尔无法在中心部分表现出这种嵌套，只能将其留白，以签名替代。在他去世后几十年，一位荷兰数学家终于借助计算机，补全了这幅作品。详见此文。

1. (单值分支的存在性，一个有用的结论) 假设 Ω 是平面单连通区域, f 是 Ω 上的全纯函数, 不取零值。证明存在 Ω 上的全纯函数 g , 满足函数方程

$$e^{g(z)} = f(z).$$

这样的 g 唯一吗?

(评注: (a). 此题说明 $\text{Log} f(z)$ 可以取到单值全纯分支, 通常记为 $\log_{\Omega} f(z)$. (b). 如果 g 也不取零值, 则 g 可表示为 $g = e^h$, 其中 h 是 Ω 上的全纯函数. 于是 $f = e^{e^h}$. 由此, 你会想到什么?

套娃?)

2. (取单值分支的一个应用) 如果 f 是不取零值的整函数, 并且存在正数 A, B 以及正整数 m , 满足

$$|f(z)| \leq Ae^{B|z|^m},$$

证明 $f(z) = e^{p(z)}$, 其中 $p(z)$ 是次数不超过 m 的多项式。

3. (对数函数的单值支) 在 $\Omega = \mathbb{C} - \{iy; y \geq 0\}$ 上给出对数函数的单值支为 $\log_{\Omega}(z)$, 满足 $\log_{\Omega}(1) = 2\pi i$. 计算 $\log_{\Omega}(e), \log_{\Omega}(-2), \log_{\Omega}(-i)$.

4. (单值支的存在性) 假设 f 在单位圆 \mathbb{D} 上全纯, 不取零值. 证明存在 \mathbb{D} 上全纯函数 g , 满足

$$g(x) = |f(x)|, x \in (-1, 1).$$

(提示: 考虑函数 $F(z) = f(z)\overline{f(\bar{z})}$, 取 \sqrt{F} 的单值支。)