

数学系课程
定理框架手册

基础拓扑学讲义

尤承业 编著
北京大学出版社

aytony

2024 -- 04 -- 20



目录

1 拓扑空间与连续映射	3
1.1 拓扑空间	3
1.2 连续映射与同胚映射	4
1.3 乘积空间与拓扑基	5
2 几个重要的拓扑性质	6
2.1 分离公理与可数公理	6
2.2 Урысон 引理及其应用	6
2.3 紧致性	7

1 | 拓扑空间与连续映射

1.1 | 拓扑空间

定义 1.1: 设 X 是一个非空集合. X 的一个子集族 τ 称为 X 的一个**拓扑**, 如果它满足

1. X, \emptyset 都包含在 τ 中;
2. τ 中任意多个成员的并集仍在 τ 中;
3. τ 中有限多个成员的交集仍在 τ 中.

集合 X 和它的一个拓扑 τ 一起称为一个**拓扑空间**, 记作 (X, τ) . 称 τ 中的成员为这个拓扑空间的**开集**.

例 1.1.1: 设 X 是无穷集合, $\tau_f = \{A^c \mid A \text{ 是 } X \text{ 的有限子集}\} \cup \{\emptyset\}$, 则不难验证 τ_f 是 X 的一个拓扑, 称为 X 上的**余有限拓扑**.

例 1.1.2: 设 X 是不可数无穷集合, $\tau_c = \{A^c \mid A \text{ 是 } X \text{ 的可数子集}\} \cup \{\emptyset\}$, 则 τ_c 也是 X 的拓扑, 称为**余可数拓扑**.

例 1.1.3: 设 \mathbb{R} 是全体实数的集合, 规定 $\tau_e = \{U \mid U \text{ 是若干各开区间的并集}\}$, 这里“若干”可以是无穷, 有限, 也可以是零, 因此 $\emptyset \in \tau_e$. 则 τ_e 是 \mathbb{R} 上的拓扑, 称为 \mathbb{R} 上的**欧式拓扑**. 记 $E = (\mathbb{R}, \tau_e)$.

例 1.1.4: 记 $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$. 规定 \mathbb{R}^n 上的度量 d 为:

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2},$$

不难验证 d 满足正定性、对称性和三角不等式, 记 $E^n = (\mathbb{R}^n, d)$, 称为 n 维**欧氏空间**.

引理: (X, d) 的任意两个球形邻域的交集是若干球形邻域的并集.

命题 1.1: X 上由度量 d 决定的度量拓扑 τ_d 满足 X 上的拓扑性质.

定义 1.2: 拓扑空间 X 的一个子集 A 称为**闭集**, 如果 A^c 是开集.

命题 1.2: 拓扑空间的闭集满足:

1. X 与 \emptyset 都是闭集;
2. 任意多个闭集的交集是闭集;
3. 有限个闭集的并集是闭集.

定义 1.3: 设 A 是拓扑空间 X 的一个子集, 点 $x \in A$. 如果存在开集 U , 使得 $x \in U \subset A$, 则称 x 是 A 的一个**内点**, A 是 x 的一个**邻域**. A 的所有内点的集合称为 A 的**内部**, 记作 $\overset{\circ}{A}$ (或 A°).

命题 1.3:

1. 若 $A \subset B$, 则 $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$.
2. $\overset{\circ}{A}$ 是包含在 A 中所有开集的并集, 因此是包含在 A 中的最大开集;
3. $\overset{\circ}{A} = A \iff A$ 是开集;
4. $(A \cap B)^\circ = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$;
5. $(A \cup B)^\circ \supset \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$.

定义 1.4: 设 A 是拓扑空间 X 的子集, $x \in X$. 如果 x 的每个邻域都含有 $A \setminus \{x\}$ 中的点, 则称 x 为 A 的**聚点**. A 的所有聚点的集合称为 A 的**导集**, 记作 A' . 称集合 $\bar{A} := A \cup A'$ 为 A 的**闭包**.

命题 1.4: 若拓扑空间 X 的子集 A 和 B 互为余集, 则 \bar{A} 与 $\overset{\circ}{B}$ 互为余集.

命题 1.5:

1. 若 $A \subset B$, 则 $\bar{A} \subset \bar{B}$;
2. \bar{A} 是所有包含 A 的闭集的交集, 所以是包含 A 的最小的闭集;
3. $\bar{A} = A \iff A$ 是闭集;
4. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$;
5. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

定义 1.5: 规定 A 的子集族

$$\tau_A := \{U \cap A \mid U \in \tau\}.$$

容易验证 τ_A 是 A 上的一个拓扑, 称为 τ 导出的 A 上的**子空间拓扑**, 称 (A, τ_A) 为 (X, τ) 的**子空间**.

命题 1.6: 设 X 是拓扑空间, $C \subset A \subset X$, 则 C 是 A 的闭集 $\iff C$ 是 A 与 X 的一个闭集之交.

命题 1.7: 设 X 是拓扑空间, $B \subset A \subset X$, 则

1. 若 B 是 X 的开 (闭) 集, 则 B 也是 A 的开 (闭) 集;
2. 若 A 是 X 的开 (闭) 集, B 是 A 的开 (闭) 集, 则 B 也是 X 的开 (闭) 集.

1.2 | 连续映射与同胚映射

定义 1.6: 设 X 和 Y 都是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, $x \in X$. 如果对于 Y 中 $f(x)$ 的任一邻域 V , $f^{-1}(V)$ 总是 x 的邻域, 则称 f 在 x 处**连续**.

命题 1.8: 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一映射, A 是 X 的子集, $x \in A$. 记 $f_A = f|_A: A \rightarrow Y$ 是 f 在 A 上的限制, 则

1. 如果 f 在 x 连续, 则 f_A 在 x 也连续;
2. 若 A 是 x 的邻域, 则当 f_A 在 x 连续时, f 在 x 也连续.

定义 1.7: 如果映射 $f: X \rightarrow Y$ 在任一点 $x \in X$ 处都连续, 则说 f 是**连续映射**.

定理 1.1: 设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射, 下列各条件互相等价:

1. f 是连续映射;
2. Y 的任一开集在 f 的原象是 X 的开集;
3. Y 的任一闭集在 f 的原象是 X 的闭集.

命题 1.9: 设 X, Y 和 Z 都是拓扑空间, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 在 x 处连续, $g: Y \rightarrow Z$ 在 $f(x)$ 处连续, 则复合映射 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 在 x 处连续.

定理 1.2 (粘接定理): 设 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 X 的一个有限闭覆盖. 如果映射 $f: X \rightarrow Y$ 在每个 A_i 上的限制都是连续的, 则 f 是连续映射.

定义 1.8: 如果 $f: X \rightarrow Y$ 是一一对应, 并且 f 及其逆 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 都是连续的, 则称 f 是一个**同胚映射**, 或称**拓扑变换**, 或简称**同胚**. 当存在 X 到 Y 的同胚映射时, 就称 X 与 Y 同胚, 记作 $X \cong Y$.

例 1.2.1: 开区间 (作为 E^1 的子区间) 同胚于 E^1 .

例 1.2.2: E^n 中的单位球体 $D^n := \{x \in E^n \mid \|x\| \leq 1\}$ 的内部 $\overset{\circ}{D}^n$ 同胚于 E^n . 同胚映射 $f: \overset{\circ}{D}^n \Rightarrow E^n$ 可规定为: $f(x) = \frac{x}{1-\|x\|}, \forall x \in \overset{\circ}{D}^n$. 它的逆映射为:

$$f^{-1}(y) = \frac{y}{1 + \|y\|}, \quad \forall y \in E^n.$$

例 1.2.3: $E^n \setminus \{O\} \cong E^n \setminus D^n$ (O 为原点) .

例 1.2.4: 球面 S^2 去掉一点后与 E^2 同胚.

例 1.2.5: 任何凸多边形 (包含内部) 都互相同胚.

例 1.2.6: 凸多边形与 D^2 同胚.

定义 1.9: 拓扑空间的在同胚映射下保持不变的概念成为**拓扑概念**, 在同胚映射下保持不变的性质叫**拓扑性质**.

1.3 | 乘积空间与拓扑基

命题 1.10: $\overline{\mathcal{B}}$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的一个拓扑.

定义 1.10: 称 $\overline{\mathcal{B}}$ 为 $X_1 \times X_2$ 上的**乘积拓扑**, 称 $(X_1 \times X_2, \overline{\mathcal{B}})$ 为 (X_1, τ_1) 和 (X_2, τ_2) 的**乘积空间**, 简记为 $X_1 \times X_2$.

定理 1.3: 对于任何拓扑空间 Y 和映射 $f: Y \rightarrow X_1 \times X_2$, f 连续 $\iff f$ 的分量都连续.

推论: $\forall b \in X_2$, 由 $x \mapsto (x, b)$ 规定的映射 $j_b: X_1 \rightarrow X_1 \times X_2$ 是嵌入映射.

定义 1.11: 称集合 X 的子集族 \mathcal{B} 为**集合 X 的拓扑基**, 如果 $\overline{\mathcal{B}}$ 是 X 的一个拓扑; 称拓扑空间 (X, τ) 的子集族 \mathcal{B} 为这个**拓扑空间的拓扑基**, 如果 $\overline{\mathcal{B}} = \tau$.

命题 1.11: \mathcal{B} 是集合 X 的拓扑基的充分必要条件是:

1. $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$;
2. 若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, 则 $B_1 \cap B_2 \in \overline{\mathcal{B}}$ (也就是 $\forall x \in B_1 \cap B_2$, 存在 $B \in \mathcal{B}$, 使得 $x \in B \subset B_1 \cap B_2$) .

例 1.3.1: 规定 \mathbb{R} 的子集族 $\mathcal{B} = \{[a, b) \mid a < b\}$. 显然 \mathcal{B} 满足 命题 1.11 中条件 1. 任取 $[a_1, b_1), [a_2, b_2)$, 若 $x \in [a_1, b_1) \cap [a_2, b_2)$, 记 $a = \max\{a_1, a_2\}, b = \min\{b_1, b_2\}$, 于是 $a \leq x < b$. 则 $[a, b) \in \mathcal{B}$, 并且 $x \in [a, b) \subset [a_1, b_1) \cap [a_2, b_2)$. 因此 命题 1.11 中条件 2 也满足. 这样, \mathcal{B} 是 \mathbb{R} 上的一个拓扑基.

命题 1.12: \mathcal{B} 是拓扑空间 (X, τ) 的拓扑基的充分必要条件为:

1. $\mathcal{B} \subset \tau$ (即 \mathcal{B} 的成员是开集);
2. $\tau \subset \overline{\mathcal{B}}$ (即每个开集都是 \mathcal{B} 中一些成员的并集) .

例 1.3.2: 若 \mathcal{B} 是 (X, τ) 的拓扑基, $A \subset X$. 规定 $\mathcal{B}_A := \{A \cap B \mid B \in \mathcal{B}\}$. 它是 A 的子集族. 显然 命题 1.12 的条件 1 成立. 设 V 是 A 的开集, 则有 $U \in \tau$, 使 $V = A \cap U$. 设 $U = \bigcup_{\alpha} B_{\alpha}, B_{\alpha} \in \mathcal{B}$, 则 $V = \bigcup_{\alpha} A \cap B_{\alpha} \in \overline{\mathcal{B}}_A$. 于是 $\overline{\mathcal{B}}_A$ 满足 命题 1.12 条件 2. 因此 $\overline{\mathcal{B}}_A$ 是 (A, τ_A) 的拓扑基.

例 1.3.3: 设 \mathbb{R} 的子集族 $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a < b, a, b \text{ 为有理数}\}$. 则 \mathcal{B} 是 E^1 的拓扑基.

2 | 几个重要的拓扑性质

2.1 | 分离公理与可数公理

T_1 公理: 任何两个不同点 x 与 y , x 有邻域不含 y , y 有邻域不含 x .

T_2 公理: 任何两个不同点有不相交的邻域.

命题 2.1: X 满足 T_1 公理 $\iff X$ 的有限子集是闭集.

推论: 若 X 满足 T_1 公理, $A \subset X$, 点 x 是 A 的聚点, 则 x 的任一邻域与 A 的交是无穷集.

命题 2.2: Hausdorff 空间中, 一个序列不会收敛到两个以上的点.

T_3 公理: 任意一点与不含它的任一闭集有不相交的 (开) 邻域.

T_4 公理: 任意两个不相交的闭集有不相交的 (开) 邻域.

命题 2.3: 度量空间 (X, d) 满足 T_i 公理 ($i = 1, 2, 3, 4$).

命题 2.4:

- 满足 T_3 公理 \iff 任意点 x 和它的开邻域 W , 存在 x 的开邻域 U , 使得 $\bar{U} \subset W$.
- 满足 T_4 公理 \iff 任意闭集 A 和它的开邻域 W , 有 A 的开邻域 U , 使得 $\bar{U} \subset W$.

C_1 公理: 任一点都有可数的邻域基.

命题 2.5: 如果 X 在 x 处有可数邻域基, 则 x 有可数邻域基 $\{V_n\}$, 使得 $m > n$ 时, $V_m \subset V_n$.

命题 2.6: 若 X 是 C_1 空间, $A \subset X, x \in \bar{A}$, 则 A 中存在收敛到 x 的序列.

推论: 若 X 是 C_1 空间, $x_0 \in X$, 映射 $f: X \rightarrow Y$ 满足: 当 $x_n \rightarrow x_0$ 时, $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, 则 f 在 x_0 连续.

C_2 公理: 有可数拓扑基.

命题 2.7: 可分度量空间是 C_2 空间.

例 2.1.1: Hilbert 空间 E^ω 是一个度量空间. 在所有平方收敛的实数序列构成的线性空间中, 规定内积

$$(\{x_n\}, \{y_n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n,$$

它决定度量 ρ :

$$\rho(\{x_n\}, \{y_n\}) = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} (x_n - y_n)^2},$$

得到的度量空间就是 E_ω .

定理 2.1 (Lindelöf 定理): 若拓扑空间 X 满足 C_2, T_3 公理, 则它也满足 T_4 公理.

2.2 | Урысон 引理及其应用

定理 2.2 (Урысон 引理): 如果拓扑空间 X 满足 T_4 公理, 则对于 X 的任意两个不相交闭集 A 和 B , 存在 X 上的连续函数 f , 它在 A 和 B 上分别取值为 0 和 1.

定理 2.3 (Tietze 扩张定理): 如果 X 满足 T_4 公理, 则定义在 X 的闭子集 F 上的连续函数可连续地扩张到 X 上.

命题 2.8: 拓扑空间 X 可度量化 \iff 存在从 X 到一个度量空间的嵌入映射.

定理 2.4 (Урысон 度量化定理): 拓扑空间 X 如果满足 T_1, T_4 和 C_2 公理, 则 X 可以嵌入到 Hilbert 空间 E^ω 中.

2.3 | 紧致性

定义 2.1: 拓扑空间称为**列紧的**, 如果它的每个序列有收敛 (即有极限点) 的子序列.

命题 2.9: 定义在列紧拓扑空间 X 上的连续函数 $f: X \rightarrow E^1$ 有界, 并达到最大、最小值.

定义 2.2: 拓扑空间称为**紧致的**, 如果它的每个开覆盖有有限的子覆盖.

命题 2.10: 紧致 C_1 空间是列紧的.

命题 2.11: 对任给 $\delta > 0$, 列紧度量空间存在有限的 δ -网.

定义 2.3: 设 \mathcal{U} 是列紧度量空间 (X, d) 的一个开覆盖, $X \notin \mathcal{U}$. 称函数 $\varphi_{\mathcal{U}}$ 的最小值为 \mathcal{U} 的**Lebesgue 数**, 记作 $L(\mathcal{U})$.

命题 2.12: $L(\mathcal{U})$ 是正数; 并且当 $0 < \delta < L(\mathcal{U})$ 时, $\forall x \in X, B(x, \delta)$ 必包含在 \mathcal{U} 的某个开集 U 中.

命题 2.13: 列紧度量空间是紧致的.

定理 2.5: 若 X 是度量空间, 则 X 列紧 $\iff X$ 紧致.

命题 2.14: A 是 X 的紧致子集 $\iff A$ 是 X 的任一开覆盖有有限子覆盖.

命题 2.15: 紧致空间的闭子集紧致.

命题 2.16: 紧致空间在连续映射下的像也紧致.

推论: 定义在紧致空间上的连续函数有界, 并且达到最大、最小值.

命题 2.17: 若 A 是 Hausdorff 空间 X 的紧致子集, $x \notin A$, 则 x 与 A 有不相交的邻域.

推论: Hausdorff 空间的紧致子集是闭集.

定理 2.6: 设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续的一一对应, 其中 X 紧致, Y 是 Hausdorff 空间, 则 f 是同胚.

命题 2.18: Hausdorff 空间的不相交紧致子集有不相交的邻域.

命题 2.19: 紧致 Hausdorff 空间满足 T_3, T_4 公理.

引理: 设 A 是 X 的紧致子集, y 是 Y 的一点, 在乘积空间 $X \times Y$ 中, W 是 $A \times \{y\}$ 的邻域. 则存在 A 和 y 的开邻域 U 和 V , 使得 $U \times V \subset W$.

定理 2.7: 若 X 和 Y 都紧致, 则 $X \times Y$ 也紧致.

定义 2.4: 拓扑空间 X 称为**局部紧致的**, 如果 $\forall x \in X$ 都有紧致的邻域.

命题 2.20: 设 X 是局部紧致的 Hausdorff 空间, 则

- X 满足 T_3 公理;
- $\forall x \in X$, x 的紧致邻域构成它的邻域基;
- X 的开子集也是局部紧致的.

定义 2.5: 拓扑空间 X 称为**仿紧的**, 如果 X 的每个开覆盖都有局部有限的开加细.