

- $tasa = \frac{\text{Cantidad promedio de eventos en un período } t}{\text{Población a mitad del período } t}$
- $tasa^* = \frac{\text{Cantidad promedio de eventos en un período } t}{\text{Población expuesta al riesgo durante el período } t} * \text{Multip}$
- $q_0^{cohorte X} = \frac{D_0^{cohorte X}}{B^{cohorte X}} = \frac{\text{Defunciones antes de cumplir 1 año de la cohorte nacida año } X}{\text{Nacimientos de la cohorte nacida en año } X}$
- Tasa bruta de natalidad: $TBN = \frac{\text{Nacimientos promedio del período } t}{\text{Población a mitad del período } t} * 1000$
- Tasa bruta de mortalidad: $TBM = \frac{\text{Defunciones promedio del período } t}{\text{Población a mitad del período } t} * 1000$
- $m_x = \frac{\text{Defunciones a la edad } x \text{ en el período } t}{\text{Población a la edad } x \text{ a mitad del período } t}$
- $TBM.est = \sum_{x=0}^{\omega} (f_x * m_x)$
- $Y_i^{st} = \bar{Y} + \hat{e}_i$

- $N^{t+k} = N^t + B^{t,t+k} - D^{t,t+k} + I^{t,t+k} - E^{t,t+k}$
- $N^{t+k} = N^t + B^{t,t+k} - D^{t,t+k} + SNM^{t,t+k}$

- $r_a = \frac{1}{t} * \left(\frac{N_F}{N_0} - 1 \right)$

- $N_{t'} = N_{pivote} * (1 + r_a * (t'))$

- $r_g = \left(\frac{N_F}{N_0} \right)^{1/t} - 1$

- $N_{t'} = N_{pivote} * (1 + r_a)^{(t')}$

- $r_e = \frac{1}{t} * \ln \left(\frac{N_F}{N_0} \right)$

- $N_{t'} = N_{pivote} * \exp(r_e * (t'))$

- $N_t = N_I + \frac{N_F}{1 + \exp\left(\frac{(t_I - t)}{\phi}\right)}$

- Tasa bruta de mortalidad:

- $$TBM = \frac{\text{Defunciones promedio del período } t}{\text{Población a mitad del período } t} * 1000$$

- Tasa de mortalidad para la edad x:

- $$m_x = \frac{\text{Defunciones promedio a la edad } x \text{ en el período } t}{\text{Población a la edad } x \text{ a mitad del período } t}$$

- Tasa de mortalidad para la edad x por causa k:

- $$m_x^k = \frac{\text{Defunciones promedio a la edad } x \text{ por la causa } k \text{ en el período } t}{\text{Población a la edad } x \text{ a mitad del período } t}$$

- $$TMI = \frac{{}_1D_0(t)}{B(t)} * 1000$$

- $$TMN = \frac{\text{Defunciones entre las edades 0 y 4 en el período } t}{\text{Población en edades entre 0 y 4 años a mitad del período } t} * 10$$

- $$\text{Tasa Mortalidad Materna} = \frac{DF^{MM}(t)}{B(t)} * 100.000$$

- $$\text{Prevalencia puntual de enfermedad o condición } k = \frac{Can}{N}$$

- $$\text{Prevalencia de período de enfermedad o condición } k = \frac{Can}{N}$$

- $$\text{Proporción de incidencia de enfermedad o condición } k = \frac{\text{Casos nuevos con } k \text{ durante el período } t}{\text{Población expuesta al riesgo durante el período } t}$$

- $$\text{Tasa de incidencia de enfermedad o condición } k = \frac{\text{Promedio de casos nuevos con } k \text{ durante el período } t}{\text{Total de población a mitad del período } t}$$

$$\frac{\text{Prevalencia de incidencia } G2}{\text{Población expuesta al riesgo}} = \frac{P(Y=1|X=2)}{P(X=2)} = \frac{P(Y=1|X=2)}{P(X=2)}$$

- $OR_{21} = \frac{1-(Preval\ o\ incid\ G2)}{Preval\ o\ incidencia\ G1} = \frac{1-P(Y=1|X=2)}{P(Y=1|X=1)} = \frac{P(Y=0|X=2)}{P(Y=0|X=1)}$

- $RR_{21} = \frac{Preval\ o\ incidencia\ G2}{Preval\ o\ incidencia\ G1} = \frac{P(Y=1|X=2)}{P(Y=1|X=1)}$

- $AR = i_e - i_{ne}$

- $FAR = \frac{AR}{i_e} * 100\% =$

- $PAR = \frac{i_t - i_{ne}}{i_t}$

- $PAR = \frac{i_t - i_{ne}}{i_t}$