MINISTERIO DE SALUD | GOBIERNO DE COSTA RICA

Boletín epidemiológico mensual

03-2025

Contáctanos
+506 4003 5000
epidemiologia.correspondencia@misalud.go.cr

Miasis por Gusano Barrenador en Humanos

Es una enfermedad parasitaria causada por la fase de larva o gusano de la mosca Cochliomyia hominivorax. La mosca deposita los huevecillos en heridas y/o mucosas de los orificios corporales, invadiendo los tejidos vivos como la piel, la cavidad ocular, oral, nasal, genital y otras; provocando lesiones graves, la pérdida de la función del órgano parasitado y la muerte en casos más severos de la enfermedad.

La lista de huéspedes es muy amplia, va desde los seres humanos a todos los animales de sangre caliente, donde destacan las vacas, caballos, ovejas, cabras, cerdos, aves (gallinas, pavos, gansos), gatos, perros, animales silvestres y otros.

La miasis por gusano barrenador en humanos es un evento de notificación obligatoria según se establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S. Se cuenta con el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos, el cual establece el abordaje epidemiológico de casos confirmados por esta enfermedad, por lo que la vigilancia ha permitido realizar una detección y diagnóstico oportuno en las personas en los centros de salud públicos y privados.

Del 29 de diciembre del 2024 al 03 de mayo de 2025 se han notificaron **38** casos confirmados en humanos



Larva de gusano barrenador

La miasis es una enfermedad parasitaria causada por larvas de *Cochliomyia hominivorax*, que invaden tejidos vivos a través de heridas u orificios, generando lesiones graves e incluso la muerte en casos severos.

FUENTE: LANASEVE. (2025). GUSANO BARRENADOR [FOTOGRAFÍA]

Generalidades de prevención y control:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida
- Reforzar la vigilancia en aquellas personas con condiciones de vida pobre en hábitos higiénicos, así como, ante una disfunción psíquica o motora, alcoholismo, toxicomanías y enfermedades como la Diabetes mellitus
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales de producción o domésticos con gusaneras


Es de suma importancia mantener la prevención y control de esta enfermedad, dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382-MAG (Cochliomyia hominivorax).





FUENTE: LANASEVE. (2025). GUSANO BARRENADOR [FOTOGRAFÍA]

Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según provincia de procedencia, de la semana epidemiológica 01 a 18, 2025 (del 29 de diciembre del 2024 al 03 de mayo del 2025):



FUENTE: SUBÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CCSS / DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD, MS, 2025

Las intoxicaciones agudas accidentales por plaguicidas en Costa Rica.

Problema grave de salud

Las intoxicaciones agudas accidentales por plaguicidas es un problema grave de salud por razones como un mal manejo del producto, almacenamiento o aplicación inadecuados, así como falta de medidas de protección por parte de los aplicadores y otras personas expuestas. No menos importante son los casos de las personas que se afectan por el uso de terceros de estos productos o por actos de negligencia en el hogar.

Es de suponer, que las estadísticas sobre las intoxicaciones accidentales no son del todo precisas, ya que habrá casos en que este tipo de accidentes son tratados con “remedios caseros” lo que provoca la sub-notificación de estos eventos y que por lo tanto no podemos obtener un panorama real de lo que sucede con las intoxicaciones por productos plaguicidas, principalmente cuando se tratan de intoxicaciones leves.

En el año 2024 se reportaron 44 intoxicaciones accidentales con plaguicidas:

12 MUJERES — Cuyas edades fueron de los 9 a los 69 años, incluyendo dos menores de edad de 9 y 13 años.

32 HOMBRES — En edades que van desde los 2 a los 68 años, incluyendo a dos menores de 2 y 16 años.

FUENTE: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD, MS, 2025

Sobre este tema, surge la importancia de la adecuada notificación, tanto en tiempo como en calidad de parte de los entes públicos y privados de servicios de salud, para así conocer la situación del país y tomar las acciones necesarias a fin de evitar la aparición o muertes de casos en donde se vea involucrado un plaguicida.

Las buenas prácticas del uso, manipulación y aplicación de plaguicidas no están hechas para sectores en específico, sino que se deben practicar en cualquier ámbito donde esté presente un plaguicida, independientemente de si este es líquido, solido o gaseoso, ya que todo plaguicida es peligroso desde su formulación.

De estos 44 casos reportados, 21 fueron en labores no remuneradas, es decir que estaban trabajando en lo propio, 16 fueron en el ámbito laboral y 7 casos fueron por negligencia en el hogar, lo que nos indica que el problema principal está en los hogares y no en las empresas.

Las provincias que más casos presentaron fueron Puntarenas y Limón, ambas con 15 casos y las que menos casos presentaron fueron San José y Heredia con solo dos casos cada una.

Incremento en la mortalidad materna en Costa Rica

¿Qué es una muerte materna?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la muerte materna como la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días después del parto, independientemente de la duración o lugar del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por él, pero no por causas accidentales.

¿Por qué vigilar la mortalidad materna?

El embarazo constituye un estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y concluye con el parto y nacimiento del bebé. Sin embargo, dentro del proceso de embarazo la mujer puede presentar algunas condiciones que pueden generar un riesgo en la culminación adecuada de éste. Por esta razón, vigilar la mortalidad materna es importante porque permite identificar problemas en la atención de la salud durante el embarazo, parto y posparto.

A través de esta vigilancia se pueden:

1. Detectar fallas en el sistema de salud, como falta de acceso a servicios, personal capacitado o infraestructura.
2. Prevenir muertes evitables, al identificar causas comunes y aplicar intervenciones efectivas.
3. Reducir desigualdades, ya que la mortalidad materna suele afectar más a mujeres pobres, rurales o marginadas.
4. Mejorar políticas públicas, orientando recursos y estrategias hacia donde más se necesitan.

¿Qué puede causar una muerte materna?

Entre las causas mas frecuentes de muerte materna están:

Hemorragia: es la causa principal de muerte materna, seguida **hipertensión arterial e infecciones.** También pueden ocurrir muertes maternas debido a **aborto, embolia pulmonar y otras complicaciones.**




¿Cuántas muertes maternas se registraron en Costa Rica en el 2024?

En Costa Rica durante el 2024 se registraron un total de 15 defunciones maternas lo que corresponde a 3 muertes por cada mil nacidos vivos, mientras que para el año 2023 se reportaron 5 defunciones durante todo el año, correspondiendo a una muerte por cada mil nacidos vivos. Este incremento de muertes maternas genera una gran preocupación debido al impacto que suscita en los indicadores nacionales este salto en la cantidad de muertes maternas.


Las mujeres fallecidas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, presentándose una mayor cantidad de fallecidas entre los 30 y 34 años con 5 muertes.

Con respecto al lugar de residencia de las mujeres fallecidas tenemos en orden descendente a San José (5 muertes), Cartago, Heredia, Puntarenas y Limón reportaron 2 muertes cada provincia, mientras que Alajuela y Guanacaste reportaron un caso cada provincia.

Costa Rica: Defunciones maternas años 2023 y 2024



Costa Rica: porcentaje de defunciones maternas años 2023 y 2024 por provincia







¿Cómo se pueden evitar las muertes maternas?

La mayoría de las muertes maternas son evitables si se proporciona acceso a cuidados de calidad y se atienden las necesidades de salud de las mujeres.

- Mejorar el acceso a la atención de salud, lo que incluye el acceso a servicios de salud reproductiva, atención prenatal y postnatal de calidad.
- Fortalecer la atención obstétrica de emergencia, es importante tener personal capacitado y equipos disponibles para atender complicaciones obstétricas graves.
- Luchar contra las desigualdades, por lo cual es necesario garantizar que todas las mujeres, independientemente de su nivel socioeconómico o ubicación geográfica, tengan acceso a los servicios de salud que necesitan.
- Promover la educación y la sensibilización, es importante que las mujeres y sus familias estén informadas sobre los riesgos del embarazo y el parto, y que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud.

FUENTE: DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD, MS, 2025

