MINISTERIO DE SALUD | GOBIERNO DE COSTA RICA

Boletín epidemiológico mensual

04-2025

Contáctanos

+506 4003 5000

epidemiologia.correspondencia@misalud.go.cr

Infecciones de Transmisión Sexual

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son enfermedades que pueden afectar la salud de las personas, por lo que su vigilancia es fundamental para la salud pública del país. Se presentarán cuatro ITS, notificadas en las primeras 21 semanas del 2025 (enero al 24 mayo).

La sífilis, en todas sus formas, es una enfermedad causada por una bacteria espiroqueta Treponema pallidum. Su transmisión ocurre principalmente a través del contacto sexual y, en algunos casos, de manera transplacentaria.


Principales síntomas:

Sífilis primaria: a las tres semanas de exposición con la bacteria, se produce una úlcera endurada no dolorosa en genitales, (chancro). Las localizaciones extra genitales en ambos sexos son a nivel de labios y mucosa oral.

Sífilis secundaria:

- Puede estar aún el chancro no doloroso
- Inflamación en ganglios
- Puede prestar un sarpullido, sin comezón en diferentes partes del cuerpo (espalda, pelvis, a nivel abdominal)
- Pérdida de peso, cansancio, dolor de garganta

Costa Rica: La notificación de casos de Sífilis en todas sus formas durante el año 2025, son 1078 casos.



FUENTE: SUBÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CCSS. / DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD, MS, 2025.



Sífilis talente:

conocida como sífilis oculta no presenta algún síntoma, sin tratamiento puede producir complicaciones en la salud de las personas.

Sífilis terciaria o sífilis tardía: estos síntomas pueden presentarse años después de la infección original no tratada y puede presentar daños:

- Cerebro, nervios, ojos, corazón, vasos sanguíneos, hígado, huesos y articulaciones

Prevención


Debes hacerte la prueba de detección de sífilis en los siguientes casos:

- Si has tenido contacto sexual con alguien que podría tener la enfermedad.
- Si tienes otra enfermedad de trasmisión sexual, como el VIH.
- Estás embarazada.
- Si tienes relaciones sexuales frecuentes con más de una pareja.
- Si tienes relaciones sexuales sin protección, es decir, sin usar preservativo.
- Asistir a un centro de salud para ser valorado (Mayo, 2024)

Gonorrea

La gonorrea es otra infección de transmisión sexual (ITS) que se propaga a través de cualquier tipo de actividad sexual, incluyendo el contacto oral y genital, o de la madre al bebé durante el embarazo o parto, la cual es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Suele afectar con mayor frecuencia a los hombres, manifestándose en la uretra, el recto o la garganta. En las mujeres, también afecta la uretra y puede infectar el cuello del útero.

Costa Rica: Notificación de casos de gonorrea durante el año 2025, son 544 casos.



FUENTE: SUBÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CCSS. / DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD, MS, 2025.

Síntomas en:

- Dolor al orinar en ambos sexos
- Secreción similar a pus a nivel vaginal y el pene
- Dolor o hinchazón en testículos
- Aumento del flujo vaginal
- Sangrado vaginal entre períodos, o después de una relación sexual vaginal
- Dolor abdominal o pélvico
- Inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello
- Dolor articular a una o más articulaciones se pueden afectar, presenta calor, enrojecidas, inflamación y dolor
- Los bebés pueden presentar problemas oculares como: enrojecimiento, dolor, úlceras. (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2024).


Prevención:

- Usar preservativo si tienes relaciones sexuales.
- Limita el número de parejas sexuales.
- Consulta al centro de salud si presentas síntomas junto a tu pareja

Herpes

El virus del herpes es otra infección de transmisión sexual (ITS), es causado por el virus del herpes simple durante las relaciones sexuales sin protección, es una infección tratable.

Costa Rica: Notificación de casos de virus de herpes durante el año 2025, son 335 casos.



FUENTE: SUBÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CCSS. / DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD, MS, 2025.

Síntomas:

- Ampollas que al romperse se convierten en llagas dolorosas, a nivel de la boca y genitales
- Fiebre, ganglios inflamados, dolor corporal
- Secreciones a nivel de genitales,
- Ardor al orinar
- Sangrados entre periodos menstruales

Prevención:


- Usar preservativos durante las relaciones sexuales
- Tener una pareja sexual por largo tiempo, sin la infección del virus del herpes simple
- Si tu pareja presenta lesiones de virus del herpes evita tener relaciones sexuales
- Si presentas lesiones o tu pareje a nivel de boca o genitales debes consultar en un centro de salud
- Debes iniciar el tratamiento enviado por el médico (Center of Disease Control and Prevention, CDC, 2024)



Virus del Papiloma Humano

VPH), es una infección que se transmite por contacto directo con la piel o a través de relaciones sexuales sin protección.

Costa Rica: Durante las primeras 21 semanas de 2025, se notificaron 217 casos de VPH.



FUENTE: SUBÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CCSS. / DIRECCIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD, MS, 2025.

Síntomas:

- Verrugas genitales
- Cáncer a nivel de cuellos uterino, pene, garganta y ano

Prevención:

- Usar condón correctamente
- No tener relaciones sexuales con muchas parejas en especial si no las conoces sin preservativos
- No tener relaciones sexuales y a la vez consumir alcohol y drogas
- Aplicar vacuna contra el VPH (HIVinfo.NIH.gov, 2024)

Bibliografía

Center of Disease Control and Prevention, CDC. (22 de abril de 2024). Obtenido de https://www.cdc.gov/herpes/es/about/acerca-del-herpes-genital.html

HIVinfo.NIH.gov. (4 de noviembre de 2024). Afecciones relacionadas con el VIH/SIDA. Obtenido de https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/el-vih-y-virus-del-papiloma-humano

Mayo, C. (10 de setiembre de 2024). Sífilis. Obtenido de https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/syphilis/symptoms-causes/syc-20351756

Organización Mundial de la Salud, OMS. (4 de julio de 2024). Gonorrea (infección por Neisseria gonorrhoeae). Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gonorrhoea-(neisseria-gonorrhoeae-infection)#:~:text=La%20gonorrea%20es%20una%20infecci%C3%B3n,adultos%20en%20todo%20el%20mundo.

Vacunación contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS)

Dentro de la sintomatología se incluyen: mocos, congestión nasal, tos, fiebre, estornudos, pérdida del apetito y silbidos al respirar.
En los bebés se puede manifestar también como irritabilidad, menor actividad y dificultad para respirar.
Es una enfermedad que se puede complicar con bronquiolitis, bronquitis, asma a mayor edad, entre otras.



Esta enfermedad puede variar de sintomatología leve a grave y puede parecerse a un resfriado común.

La población vulnerable para esta enfermedad incluye:

- Bebés prematuros o recién nacidos.
- Niños con enfermedades cardíacas congénitas o pulmonares crónicas.
- Adultos mayores, personas con enfermedades del sistema inmune, o personas con enfermedades crónicas.

Es una enfermedad que se puede prevenir con vacunación.

Recientemente dio inicio la vacunación dirigida a embarazadas, por lo que se recomienda que quienes se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación acudan a su Ebais, clínica u hospital correspondiente para recibir la vacuna. Esta medida busca proteger a las personas recién nacidas contra un virus que ha provocado numerosos casos de infecciones graves en menores de edad, muchos de los cuales han requerido hospitalización en unidades de cuidados intensivos e incluso han fallecido a causa de complicaciones relacionadas con esta enfermedad.

Infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS)

La Infección Respiratoria Aguda (IRA),

constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en nuestro país.La mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías.

Costa Rica: Número de casos acumulados al 31 de mayo 2025. Número de casos acumulados: 668963.

PROVINCIA	CASOS
Guanacaste	54526
Cartago	56770
Limón	61426
Heredia	69280
Puntarenas	97767
Alajuela	141127
San José	188067

Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS

Síntomas

- Fiebre mayor a 38°C.
- Dolor de garganta.
- Tos.
- Secreción o congestión nasal.

Formas de prevención.

- Lactancia exclusiva en menores de seis meses.
- Lavarse las manos frecuentemente.
- Si no hay agua disponible, se puede utilizar el alcohol en gel para limpiar las manos.
- Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca.
- Mantener ventiladas la habitación de los niños.
- Mantener una alimentación adecuada.
- Tener esquema de vacunación al día.
- Vacunación anual contra influenza estacional.

