

Efeito do tipo de filmes na condutância da pele

Adriano Simões¹, David Panão¹, Henrique Cruz¹, Cilínia Godinho¹, Fátima Machado^{2,4}, Inês Almeida^{2,3}, Marta Lapo Pais²

¹Agrupamento de Escolas Martim de Freitas; ²CIBIT, Institute of Nuclear Sciences Applied to Health (ICNAS), University of Coimbra; ³Faculty of Medicine, University of Coimbra; ⁴CISUC, Centre for Informatics and Systems of the University of Coimbra, University of Coimbra;

INTRODUCÃO

A condutância da pele reflete a actividade das glândulas sudoríparas (que produzem suor), e relaciona-se com a activação do sistema nervoso autonómico simpático (SNAsim)^[1]. Em situações de maior activação fisiológica (maior actividade do SNAsim), produzimos mais suor. Se aplicarmos uma corrente eléctrica a passar pela pele, verificamos que existe maior condutância de electricidade quando produzimos mais suor. A isso chamamos condutância da pele.

Ao observar pessoas relaxadas e mais ansiosas, gerou-se a seguinte questão de investigação:


- Qual será o nível de condutância da pele numa situação tensa e numa situação relaxada?

Hipóteses:


- H1: O nível de condutância da pele é alterado pelo tipo de vídeo que estamos a ver (há diferenças no nível de condutância da pele (SCL) quando vemos vídeos "tensos" e vídeos "relaxados")
- H0: O nível de condutância da pele não é alterada pelo tipo de vídeo que estamos a ver (não há diferenças no SCL quando vemos vídeos "tensos" e vídeos "relaxados")

RESULTADOS

A resposta galvânica, diferentes participantes mas mesmo filme



Distribuição dos dados para diferentes métricas





Condições comparadas	p-value
Aborrecido vs Assustador	0.0215
Aborrecido vs Divertido	0.9
Assustador vs Divertido	0.0522

O teste estatístico permite-nos afirmar que existem diferenças entre "Assustador" e "Aborrecido" apenas quando considerarmos 5% de erro.



Condições comparadas	p-value
Aborrecido vs Assustador	>0.001
Aborrecido vs Divertido	0.5715
Assustador vs Divertido	>0.001

O teste estatístico permite-nos afirmar que existem diferenças entre "Assustador" e "Aborrecido" e entre "Assustador" e "Divertido" com 1% de erro.



CONCLUSÕES

Após inspecção visual dos dados, e uso de testes estatísticos, podemos verificar que:

- A condutância da pele varia entre participantes;
- A média da condutância da pele apenas é diferente entre os tipos de filme "Aborrecido" e "Assustador";
- O aumento da condutância da pele em relação ao nível basal (diferença) é superior num filme "Assustador" do que num filme "Divertido" ou "Aborrecido". Ou seja, as pessoas suam mais a ver um filme "Assustador";
- Rejeitou-se H0, isto é, verificaram-se diferenças na condutância da pele tendo em conta o tipo de filme visualizado, e que as pessoas têm maiores valores de condutância da pele (suam mais) quando vêem o filme "Assustador";

Adicionalmente, a nível exploratório, verificou-se que:

- Os participantes do sexo masculino têm maiores valores médios condutância da pele;
- Os grupos de idade 35-39 têm valores médios mais elevados de condutância da pele, ao passo que os participantes de idades 30-34 têm valores médios mais baixos de condutância da pele.

REFERÊNCIAS

[1] Dawson, M. E., Schell, A. M., & Filion, D. L. (2007). The electrodermal system. In J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary, & G. G. Berntson (Eds.), *Handbook of psychophysiology* (p. 159–181). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511546396.007>

[2] Sharma, K., Castellini, C., van den Broek, E.L. et al. A dataset of continuous affect annotations and physiological signals for emotion analysis. *Sci Data* 6, 196 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0209-0>