

第一章 数值分析与科学计算引论

记 *x** 为准确值， *x* 为 *x** 的一个近似值

绝对误差 *e*_{*p*} = |*x* − *x**|
相对误差 *e*_{*r*} =

|

x
−

x

∗

|

x

{\displaystyle \left|{\frac {x-x^{*}}{x}}\right|}

相对误差限

ε

r

=

ε

|
x
|

⩾

|

x
−

x

∗

|

e
∗

r

{\displaystyle \varepsilon _{r}={\frac {\varepsilon }{|x|}}\geqslant {\frac {|x-x^{*}|}{e^{*}_{r}}}}

条件数 *C*_{*p*} =

|

f
(
x
)
−
f
(
x
¯
)

f
(
x
)

|

/

|

Δ
x

x

|

≈

|

x
f
′
(
x
)

f
(
x
)

|

{\displaystyle C_{p}={\frac {\left|f(x)-f({\bar {x}})\right|}{\left|f(x)\right|}}/{\frac {\left|\Delta x\right|}{x}}\approx \left|{\frac {xf'(x)}{f(x)}}\right|}

*C*_{*p*} ≥ 10 就认为问题是病态的

四则运算误差限

ε(*p*₁ + *p*₂) <= ε(*p*₁) + ε(*p*₂)

ε(*p*₁*p*₂) ≈ |*p*₁|ε(*p*₂) + |*p*₂|ε(*p*₁)

ε (

p
1

p
2

{\displaystyle {\frac {p_{1}}{p_{2}}}}

) ≈

|

p
1

|
ε
(

p
2

)
+
|

p
2

|
ε
(

p
1

)

|

p
2

|

{\displaystyle {\frac {|p_{1}|\varepsilon (p_{2})+|p_{2}|\varepsilon (p_{1})}{|p_{2}|}}}

函数误差限 ε(*f*(*p̂*)) ≈ |*f*'(*p̂*)|ε(*p̂*)

若近似数有 *n* 位有效数字， 则可以写为 *p̂* = ±10^{*m*} × (*a*₁ + *a*₂ × 10^{−1} + ... + *a*_{*i*} × 10^{−(*n*−1)})

其绝对误差限为 |*x* − *x**| ≤

1
2

×

10

m
−
n
+
1

{\displaystyle \leqslant {\frac {1}{2}}\times 10^{m-n+1}}

其相对误差限

|

x
−

x

∗

|

x

|

≤

ε

r

≤

10

1
−
n

2

a

1

{\displaystyle \left|{\frac {x-x^{*}}{x}}\right|\leqslant \varepsilon _{r}\leqslant {\frac {10^{1-n}}{2a_{1}}}}

秦九韶算法

p(*x*) = *a*₀*x*^{*n*} + *a*₁*x*^{*n*−1} + ... + *a*_{*n*−1}*x* + *a*_{*n*} = (... (*a*₀*x* + *a*₁)*x* + ... +

*a*_{*n*−1})*x* + *a*_{*n*} *a*₀ ≠ 0

{

b

0

=

a

0

,

b

i

=

b

i
−
1

x

∗

+

a

i

,

i
=
1,
2
,
⋯
,
n
,

{\displaystyle \left\{b_{0}=a_{0},\,b_{i}=b_{i-1}x^{*}+a_{i},\,\,\,i=1,2,\cdots ,n,\right.}

*b*_{*n*} = *p*(*x**) 为所求

第二章 插值

多项式插值： *P*(*x*) = *a*₀ + *a*₁*x* + ... + *a*_{*n*}*x*^{*n*}

其系数由以下线性方程组确定：

[

1

x

0

x

0

2

⋯

x

0

n

1

x

1

x

1

2

⋯

x

1

n

⋮

⋮

⋮

⋱

⋮

1

x

n

x

n

2

⋯

x

n

n

]

[

a

0

a

1

a

2

⋮

⋮

a

n

]

=

[

f
(

x

0

)

f
(

x

1

)

f
(

x

2

)

⋮

⋮

f
(

x

n

)

]

{\displaystyle \left[{\begin{matrix}1&x_{0}&x_{0}^{2}&\cdots &x_{0}^{n}\\1&x_{1}&x_{1}^{2}&\cdots &x_{1}^{n}\\\vdots &\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\1&x_{n}&x_{n}^{2}&\cdots &x_{n}^{n}\end{matrix}}\right]\left[{\begin{matrix}a_{0}\\a_{1}\\a_{2}\\\vdots \\\vdots \\a_{n}\end{matrix}}\right]=\left[{\begin{matrix}f(x_{0})\\f(x_{1})\\f(x_{2})\\\vdots \\\vdots \\f(x_{n})\end{matrix}}\right]}

x_i 互异 ⇒ det***A*** ≠ 0 ⇒ 线性方程唯一 ⇒ *P*(*x*) 存在则唯一

拉格朗日插值： *L_n*(*x*) =

∑

k
=
0

n

y

k

l

k

(
x
)

{\displaystyle L_{n}(x)=\sum _{k=0}^{n}y_{k}l_{k}(x)}

其中

l

k

(
x
)
=

ω

n
+
1

(
x
)

(
x
−

x

k

)

ω

′

n
+
1

(

x

k

)

{\displaystyle l_{k}(x)={\frac {\omega _{n+1}(x)}{(x-x_{k})\omega _{n+1}'(x_{k})}}

ω_{*n* + 1}(*x*) = (*x* − *x*₀)(*x* − *x*₁) ... (*x* − *x_n*)
ω_{*n* + 1}(*x_k*) = (*x_k* − *x*₀)(*x_k* − *x*₁) ... (*x_k* − *x_k*_{−1})(*x_k* − *x_k* _{+ 1}) ... (*x_k* − *x_n*)

余项：

R

n

(
x
)
=

f

(
n
+
1
)

(
ξ
)

(
n
+
1
)
!

ω

n
+
1

(
x
)
,
ξ
∈
(
a
,
b
)

{\displaystyle R_{n}(x)={\frac {f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}}\omega _{n+1}(x),\xi \in (a,b)}

截断误差限：

|

R

n

(
x
)
|
≤

M

n
+
1

(
n
+
1
)
!

|

ω

n
+
1

(
x
)
|
,
其
中

M

n
+
1

=

max

a
≤
x
≤
b

|

f

(
n
+
1
)

(
x
)
|

{\displaystyle |R_{n}(x)|\leqslant {\frac {M_{n+1}}{(n+1)!}}|\omega _{n+1}(x)|,\,其中M_{n+1}=\max _{a\leqslant x\leqslant b}\left|f^{(n+1)}(x)\right|}

一阶均差：

f
[

x

0

,

x

1

]
=

f
(

x

1

)
−
f
(

x

0

)

x

1

−

x

0

{\displaystyle f[x_{0},x_{1}]={\frac {f(x_{1})-f(x_{0})}{x_{1}-x_{0}}}

二阶均差：

f
[

x

0

,

x

1

,

x

2

]
=

f
[

x

1

,

x

2

x

1

−

x

0

]
−
f
[

x

0

,

x

1

]

x

2

−

x

0

{\displaystyle f[x_{0},x_{1},x_{2}]={\frac {f[{\frac {x_{1}}{x_{1}-x_{0}}},x_{2}]-f[x_{0},x_{1}]}{x_{2}-x_{0}}}

k 阶均差：

f
[

x

0

,

x

1

,
.
.
.
,

x

k

]
=

f
[

x

1

,

x

2

,
.
.
.
,

x

k

]
−
f
[

x

0

,
.
.
.
,

x

k
−
1

]

x

k

−

x

0

{\displaystyle f[x_{0},x_{1},\ldots ,x_{k}]={\frac {f[x_{1},x_{2},\ldots ,x_{k}]-f[x_{0},\ldots ,x_{k-1}]}{x_{k}-x_{0}}}

f
[

x

0

,

x

1

,
.
.
.
,

x

k

]
=

f
(

x

j

)

(

x

j

−

x

0

)
.
.
.
(

x

j

−

x

j
−
1

)
(

x

j

−

x

j
+
1

)
.
.
.
(

x

j

−

x

k

)

{\displaystyle f[x_{0},x_{1},\ldots ,x_{k}]={\frac {f(x_{j})}{(x_{j}-x_{0})\ldots (x_{j}-x_{j-1})(x_{j}-x_{j+1})\ldots (x_{j}-x_{k})}}

f
[

x

0

,

x

1

,
.
.
.
,

x

n

]
=

f

(
n
)

(
ξ
)

n
!

,
ξ
∈
[
a
,
b
]

{\displaystyle f[x_{0},x_{1},\ldots ,x_{n}]={\frac {f^{(n)}(\xi)}{n!}},\xi \in [a,b]}

牛顿插值公式： *N_n*(*x*) = *a*₀ + *a*₁(*x* − *x*₀) + *a*₂(*x* − *x*₀)(*x* − *x*₁) + ... + *a_n*(*x* − *x*₀) ... (*x* − *x_n*_{−1})

其中 *a_i* = *f*[*x*₀, *x*₁, ..., *x_i*]

余项： *R_n*(*x*) = *f*[*x*, *x*₀, ..., *x_n*] · (*x* − *x*₀) ... (*x* − *x_n*)

重节点均差：

f
[

x

0

,

x

0

]
=

lim

x

1

→

x

0

[

x

0

,

x

1

]
=

f
′
(

x

0

)

{\displaystyle f[x_{0},x_{0}]=\lim _{x_{1}\rightarrow x_{0}}[x_{0},x_{1}]=f'(x_{0})}

n 阶重节点均差：

f
[

x

0

,

x

0

,
.
.
.
,

x

0

]
=

lim

x

i

→

x

0

f
[

x

0

,

x

1

,
.
.
.
,

x

n

]
=

1
n
!

f

(
n
)

(

x

0

)

{\displaystyle n\,阶重节点均差：f[x_{0},x_{0},\ldots ,x_{0}]=\lim _{x_{i}\rightarrow x_{0}}f[x_{0},x_{1},\ldots ,x_{n}]={\frac {1}{n!}}f^{(n)}(x_{0})}

泰勒插值多项式： *P_n*(*x*) = *f*(*x*₀) + *f*'(*x*₀)(*x* − *x*₀) + ... +

f

(
n
)

(

x

0

)

n
!

(
x
−

x

0

)

n

{\displaystyle {\frac {f^{(n)}(x_{0})}{n!}}(x-x_{0})^{n}}

余项：

R

n

(
x
)
=

f

(
n
+
1
)

(
ξ
)

(
n
+
1
)
!

(
x
−

x

0

)

n
+
1

,
ξ
∈
(
a
,
b
)
,

也
与
之
前
余
项
在

x

i

→

x

0

时
的
结
果
一
致
。

{\displaystyle R_{n}(x)={\frac {f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}}(x-x_{0})^{n+1},\xi \in (a,b),\,也与之前余项在x_{i}\rightarrow x_{0}时的结果一致。}

三次埃尔米特插值多项式：
已知 *f*(*x*₀), *f*(*x*₁), *f*(*x*₂), *f*'(*x*₁)

则 *P*(*x*) = *f*(*x*₀) + *f*[*x*₀, *x*₁] · (*x* − *x*₀) + *f*[*x*₀, *x*₁, *x*₂] · (*x* − *x*₀)(*x* − *x*₁) + *A*(*x* − *x*₀)(*x* − *x*₁)(*x* − *x*₂)

其中

A
=

f
′
(

x

1

)
−
f
[

x

0

,

x

1

]
−
(

x

1

−

x

0

)
f
[

x

0

,

x

1

,

x

2

]

(

x

1

−

x

0

)
(

x

1

−

x

2

)

{\displaystyle A={\frac {f'(x_{1})-f[x_{0},x_{1}]-{(x_{1}-x_{0})f[x_{0},x_{1},x_{2}]}{(x_{1}-x_{0})(x_{1}-x_{2})}}

余项：

R
(
x
)
=

1
4
!

f

(4)

(
ξ
)
(
x
−

x

0

)
(
x
−

x

1

)

2

(
x
−

x

2

)
,

ξ
在

x

0

,

x

1

,

x

2

限
定
的
范
围
内

{\displaystyle R(x)={\frac {1}{4!}}f^{(4)}(\xi)(x-x_{0})(x-x_{1})^{2}(x-x_{2}),\,\xi 在x_{0},x_{1},x_{2}\,限定的范围内}

两点三次埃尔米特插值多项式
已知 *f*(*x*₀), *f*(*x*₁), *f*'(*x*₀), *f*'(*x*₁)

则

P
(
x
)
=

(
1
+
2

x
−

x

0

x

1

−

x

0

)

(

x
−

x

1

x

0

−

x

1

)

2

f
(

x

0

)
+

(
1
+
2

x
−

x

1

x

0

−

x

1

)

(

x
−

x

0

x

1

−

x

0

)

2

f
(

x

1

)
+
(
x
−

x

0

)

(

x
−

x

1

x

0

−

x

1

)

2

f
′
(

x

0

)
+
(
x
−

x

1

)

(

x
−

x

0

x

1

−

x

0

)

2

f
′
(

x

1

)

{\displaystyle P(x)={\bigg(}1+2{\frac {x-x_{0}}{x_{1}-x_{0}}}{\bigg(}{\frac {x-x_{1}}{x_{0}-x_{1}}}{\bigg)}^{2}f(x_{0})+{\bigg(}1+2{\frac {x-x_{1}}{x_{0}-x_{1}}}{\bigg(}{\frac {x-x_{0}}{x_{1}-x_{0}}}{\bigg)}^{2}f(x_{1})+(x-x_{0}){\bigg(}{\frac {x-x_{1}}{x_{0}-x_{1}}}{\bigg)}^{2}f'(x_{0})+(x-x_{1}){\bigg(}{\frac {x-x_{0}}{x_{1}-x_{0}}}{\bigg)}^{2}f'(x_{1}){\bigg)}

（1 + 2

x
−

x

1

x

0

−

x

1

{\displaystyle {\frac {x-x_{1}}{x_{0}-x_{1}}}

）² *f*(*x*₀) + （1 + 2

x
−

x

1

x

0

−

x

1

{\displaystyle {\frac {x-x_{0}}{x_{1}-x_{0}}}

）² *f*'(*x*₀) + (*x* − *x*₀)（

x
−

x

1

x

0

−

x

1

{\displaystyle {\frac {x-x_{1}}{x_{0}-x_{1}}}

）² *f*'(*x*₁)

余项：

R
(
x
)
=

1
4
!

f

(4)

(
ξ
)
(
x
−

x

0

)

2

(
x
−

x

1

)

2

,
ξ
∈
(

x

0

,

x

1

)

{\displaystyle R(x)={\frac {1}{4!}}f^{(4)}(\xi)(x-x_{0})^{2}(x-x_{1})^{2},\xi \in (x_{0},x_{1})}

分段线性插值：

I

h

(
x
)
=

x
−

x

k
+
1

x

k

−

x

k
+
1

f
(

x

k

)
+

x
−

x

k

x

k
+
1

−

x

k

f
(

x

k
+
1

)
,
其
中

x

k

≤
x
≤

x

k
+
1

,
k
=
0,
1
,
.
.
.
,
n
−
1

{\displaystyle I_{h}(x)={\frac {x-x_{k+1}}{x_{k}-x_{k+1}}}f(x_{k})+{\frac {x-x_{k}}{x_{k+1}-x_{k}}}f(x_{k+1}),\,其中x_{k}\leqslant x\leqslant x_{k+1},k=0,1,\ldots ,n-1}

x ≤ *x_k* _{+ 1}, *k* = 0, 1, ..., *n* − 1

三次样条插值函数： *S_i*(*x*) = *a_i*(*x* − *x_i*)³ + *b_i*(*x* − *x_i*)² + *c_i*(*x* − *x_i*) + *d_i*, *x* ∈ [*x_i*, *x_i* _{+ 1}]

记 *h* 为小区间长度， *M_i* = *S*''(*x_i*), *y_i* = *f*(*x_i*) , 在区间 [*x_i*, *x_i* _{+ 1}] 上的 *S*(*x*) 为

a

i

=

M

i
+
1

−

M

i

6
h

,

b

i

=

M

i

2

{\displaystyle a_{i}={\frac {M_{i+1}-M_{i}}{6h}},\,\,b_{i}={\frac {M_{i}}{2}}}

c

i

=

y

i
+
1

−

y

i

h

−

(

M

i
+
1

+
2

M

i

)
h
6

,

d

i

=

y

i

{\displaystyle c_{i}={\frac {y_{i+1}-y_{i}}{h}}-{\frac {(M_{i+1}+2M_{i})h}{6}},\,\,d_{i}=y_{i}}

其中 *M_i* 根据条件解线性方程组得到： *M_i* + 4*M_i* _{+ 1} + *M_i* _{+ 2} =

6
(

y

i

−
2

y

i
+
1

+

y

i
+
2

)

h

2

,
1
≤
i
≤
n
−
2

{\displaystyle M_{i}+4M_{i+1}+M_{i+2}={\frac {6(y_{i}-2y_{i+1}+y_{i+2})}{h^{2}}},1\leqslant i\leqslant n-2}

第三章 逼近与拟合

范数： 设 *S* 是实数域上的线性空间， *x* ∈ *S* , 如果存在值为为实数域的函数

|| · || , 满足：

正定性： ||*x*|| ≥ 0 ; ||*x*|| = 0 当且仅当 *x* = 0

齐次性： ||α*x*|| = |α| ||*x*||, α ∈ *R*

三角不等式： ||*x* + *y*|| ≤ ||*x*|| + ||*y*||, *x*, *y* ∈ *S*

就称 || · || 是线性空间 *S* 上的范数， *S* 与 || · || 一起称为**赋范线性空间**， 记为 *X*

对于 *Rⁿ* 上的向量 **x** = (*x*₁, ... , *x_n*)^{*T*} , 三种常用范数：

无穷范数 ||**x**||_∞ = max

1
≤
i
≤
n

|

x

i

|

{\displaystyle \|\mathbf {x} \|_{\infty }=\max _{1\leqslant i\leqslant n}|x_{i}|}

1-范数 ||**x**||₁ =

∑

i
=
1

n

|

x

i

|

{\displaystyle \|\mathbf {x} \|_{1}=\sum _{i=1}^{n}|x_{i}|}

2-范数： ||**x**||₂ =

√

∑

i
=
1

n

x

i

2

{\displaystyle \|\mathbf {x} \|_{2}={\sqrt {\sum _{i=1}^{n}x_{i}^{2}}}

内积： 设 *X* 是数域 *K* 上的线性空间， ∀*u*, *v* ∈ *X* 。有 *K* 中的一个数与其对应， 记为 (*u*, *v*) , 其满足：

(*u*, *v*) =

(
v
,
u
)

{\displaystyle (u,v)=(v,u)}

(α*u*, *v*) = α(*u*, *v*), ∀α ∈ *K*

(*u* + *v*, *w*) = (*u*, *w*) + (*v*, *w*), ∀*w* ∈ *X*

(*u*, *u*) ≥ 0 ; (*u*, *u*) = 0 当且仅当 *u* = 0

则称 (*u*, *v*) 是 *X* 上 *u*, *v* 的内积。定义了内积的线性空间称为**内积空间**

带权内积： (**x**, **y**) =

∑

i
=
1

n

ρ

i

x

i

y

i

,

ρ

i

>
0

{\displaystyle (\mathbf {x} ,\mathbf {y})=\sum _{i=1}^{n}\rho _{i}x_{i}y_{i},\rho _{i}>0}

带权范数： ||**x**||₂ =

√

∑

i
=
1

n

ρ

i

x

i

2

,

ρ

i

>
0

{\displaystyle \|\mathbf {x} \|_{2}={\sqrt {\sum _{i=1}^{n}\rho _{i}x_{i}^{2}}},\rho _{i}>0}

函数内积： (*f*, *g*) =

∫

a

b

ρ
(
x
)
f
(
x
)
g
(
x
)
d
x

{\displaystyle (f,g)={\int _{a}^{b}\rho (x)f(x)g(x)dx}

函数范数： ||*f*||₂ =

√

∫

a

b

ρ
(
x
)

f

2

(
x
)
d
x

{\displaystyle \|f\|_{2}={\sqrt {\int _{a}^{b}\rho (x)f^{2}(x)dx}}

若 *X* 是一个内积空间， *u_i* ∈ *X* , 称**Gram 矩阵**为：

G
=

[

(

u

1

,

u

1

)

(

u

2

,

u

1

)

⋯

(

u

n

,

u

1

)

(

u

1

,

u

2

)

(

u

2

,

u

2

)

⋯

(

u

n

,

u

2

)

⋮

⋮

⋱

⋮

(

u

1

,

u

n

)

(

u

2

,

u

n

)

⋯

(

u

n

,

u

n

)

]

{\displaystyle \mathbf {G} =\left[{\begin{matrix}(u_{1},u_{1})&(u_{2},u_{1})&\cdots &(u_{n},u_{1})\\(u_{1},u_{2})&(u_{2},u_{2})&\cdots &(u_{n},u_{2})\\\vdots &\vdots &\ddots &\vdots \\(u_{1},u_{n})&(u_{2},u_{n})&\cdots &(u_{n},u_{n})\end{matrix}}\right]}

| | | | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| <i>n</i> | <i>x</i> _{<i>k</i>} | <i>A</i> _{<i>k</i>} | <i>n</i> | <i>x</i> _{<i>k</i>} | <i>A</i> _{<i>k</i>} |
| 3 | 0.4157746 | 0.7110930 | | 7.0858100 | 0.0036118 |
| | 2.2942804 | 0.2785177 | | 12.6408008 | 0.0002337 |
| | 602899450829 | 0.0103893 | 6 | 0.2228466 | 0.4589647 |
| 4 | 0.3225477 | 0.6031541 | | 1.1889321 | 0.4170008 |
| | 1.7457611 | 0.3574187 | | 2.9927363 | 0.1133734 |
| | 4.5366203 | 0.0388879 | | 5.7751436 | 0.0103992 |
| | 9.3950709 | 0.0005393 | | 9.8374674 | 0.0002610 |
| 5 | 0.2635603 | 0.5217556 | | 15.9828740 | 0.0000090 |

高斯-赫尔米特求积公式

∫

−
∞

∞

e

−

x

2

∗
f
(
x
)
d
x
≈

∑

k
=
0

n

A

k

f

(

x

k

)

.

其中*x*_{*k*}为赫尔米特多项式的零点

| | | | | | |
|----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|
| <i>n</i> | <i>x</i> _{<i>k</i>} | <i>A</i> _{<i>k</i>} | <i>n</i> | <i>x</i> _{<i>k</i>} | <i>A</i> _{<i>k</i>} |
| 2 | ±0.7071068 | 0.8862269 | 6 | ±0.4360774 | 0.7246296 |
| 3 | ±1.2247449 | 0.2954090 | | ±1.3358491 | 0.1570673 |
| | 0 | 1.8163590 | | ±2.3506050 | 0.0045300 |
| 4 | ±0.5246476 | 0.8049141 | 7 | ±0.8162879 | 0.4256073 |
| | ±1.6506801 | 0.0813128 | | ±1.6735516 | 0.0545156 |
| 5 | ±0.9585725 | 0.3936193 | | ±2.6519614 | 0.0009172 |
| | ±2.0201829 | 0.0199532 | 0 | | 0.8102646 |
| | 0 | 0.9453087 | | | |

数值微分
向前差商公式

f
′
(
x
)
≈

f
(
x
+
h
)
−
f
(
x
)

h

误差：

−

h
2

f
″
(
ξ
)

向后差商公式

f
′
(
x
)
≈

f
(
x
)
−
f
(
x
−
h
)

h

误差：

h
2

f
″
(
ξ
)

中心差商公式

f
′
(
x
)
≈

f
(
x
+
h
)
−
f
(
x
−
h
)

2
h

误差：

−

h

2

f
″
(
ξ
)

舍入误差上界

δ
(

f
′
(
a
)
)
=

f
′
(
a
)
−
G
(
a
)
≤

|

ε

1

|
+
|

ε

2

|

2
h

≤

ε

h

,
ε
=
max
{
|

ε

1

|
,
|

ε

2

|
}

其中ε₁,ε₂分别是f(a+h),f(a−h)的舍入误差
插值型求导公式:

f
′
(
x
)
=

L

n

′
(
x
)

余项

R
[

f
′
]

|

x

=

x

k

=

f

(
n
+
1
)

(
ξ
)

(
n
+
1
)
!

ω

n
+
1

′
(

x

k

)

第五章 线性方程组——直接法

高斯消元法：通过基本变换，将增广矩阵转化为阶梯型矩阵：

[
A
:
b
]
=
[

a

11

(1)

a

12

(1)

a

13

(1)

⋯

a

1
n

(1)

b

1

(1)

0

a

22

(2)

a

23

(2)

⋯

a

2
n

(2)

b

2

(2)

0

0

a

33

(3)

⋯

a

3
n

(3)

b

2

(3)

⋮

⋮

⋮

⋱

⋮

⋮

0

0

0

⋯

a

n
n

(
n
)

b

n

(
n
)

]

若*a*_{*kk*}^(*k*)≠0，则*x*_{*n*}=(*b*_{*k*}^(*k*)−

∑

j
=
k
+
1

n

a

k
j

(
k
)

x

j

/
(

a

k
k

(
k
)

)

)

LU分解：(Doolittle)高斯消元法的每一步初等变换相当于一个初等矩阵左乘原矩阵，最终得到一个上三角阵**L**_{*n*−1}...**L**₂**L**₁**A**=**U**

所以**A**=**L**₁^{−1}**L**₂^{−1}...**L**_{*n*−1}^{−1}**U**=**LU**，其中**L**是下三角阵：

L
=
[

1

0

0

⋯

0

m

21

1

0

⋯

0

m

31

m

32

1

⋯

0

⋮

⋮

⋮

⋱

⋮

m

n
1

m

n
2

m

n
3

⋯

1

]

则原方程组等价于**Ux**=**y**,**Ly**=**b**，这个方程组可按下述过程解出：

y

i

=

b

i

−

∑

k
=
1

i
−
1

l

i
k

y

k

,

x

i

=
(

y

i

−

∑

k
=
i
+
1

n

u

i
k

x

k

)
/
(

u

i
i

)

平方根法：设**A**是对称正定矩阵，则一定有唯一分解**A**=**LU**，且*u*_{*kk*}>0 则有 Cholesky 分解**A**=**LU**=**LDL**^T=**LD**^{1/2}**D**^{1/2}**L**^T=**G****G**^T，其中

D

1

/
2

=
[

√

u

11

0

0

⋯

0

0

√

u

22

0

⋯

0

0

0

√

u

33

⋯

0

⋮

⋮

⋮

⋱

⋮

0

0

0

⋯

√

u

n
n

]

Cholesky 分解后，类似 LU 分解的过程得到最终解

矩阵范数：如果矩阵**A**∈*R*^{*n*×*n*}与某个非负の実值函数*N*(**A**)=‖**A**‖满足正定性、齐次性、三角不等式以及相容性，则称*N*(**A**)是一个矩阵范数

相容性：‖**Ax**‖≤‖**A**‖‖**x**‖。其中‖**A**‖矩阵范数，‖**Ax**‖,‖**x**‖是向量范数。只有满足这个不等式，才说这个矩阵范数和这个向量范数是相容的。

算子范数（从属矩阵范数）：‖**A**‖=max_{‖**x**‖=1}{‖**Ax**‖}=max_{**x**≠0}

‖

A
x

‖

‖
x
‖

，其中

‖**Ax**‖是某个向量范数。算子范数度量了矩阵**A**将向量**x**映射到新向量**Ax**的"放大"程度。

由不同的向量范数可以导出不同的算子范数：

1-范数：又称列范数，每一列中元素的绝对值之和的最大值 ‖**A**‖₁=

max

1
≤
j
≤
n

{

∑

i
=
1

n

|

a

i
j

|

}

2-范数：又称谱范数 ‖**A**‖₂=

√

λ

m
a
x

，其中λ_{*max*}是矩阵**A**^T**A**最大特征值

无穷范数：又称行范数，每一行中元素的绝对值之和的最大值 ‖**A**‖_∞=

max

1
≤
i
≤
n

{

∑

j
=
1

n

|

a

i
j

|

}

其他种类的范数：
F-范数：‖**A**‖*F*=

√

∑

i
=
1

n

∑

j
=
1

n

a

i
j

2

谱半径ρ(**A**)=max|λ_{*i*}|，其中λ_{*i*}是**A**的特征值

对矩阵的任何一种相容范数都有ρ(**A**)≤‖**A**‖

第六章 线性方程组——迭代法

定常迭代法

对于线性方程组**Ax**=**b**（**A**是非奇异矩阵），对**A**进行矩阵分裂：

A=**M**−**N**，其中**M**是可选择的非奇异矩阵

于是得到迭代式**x**=**M**^{−1}**Nx**+**M**^{−1}**b**=**Bx**+**f**⇒**x**^(*k*+1)=**Bx**^(*k*)+**f**

一阶线性定常迭代法

即取**M**=**I**

雅可比迭代法

采用矩阵分裂：**A**=**M**−**N**=**D**−(**L**+**U**)

其中**D**就是单独提出**A**的对角线，**L**,**U**是**A**除去对角线后的下三角和上三角取负

则**x**^(*k*+1)=**D**^{−1}(**L**+**U**)**x**^(*k*)+**D**^{−1}**b**=**B_Jx**+**f**

x^(*k*+1)可由以下公式得到：

x

i

(
k
+
1
)
=

1

a

i
i

(

b

i

−

∑

j
=
1,
j
≠
i

n

a

i
j

x

j

(
k
)

)

高斯-赛格尔迭代法

采用矩阵分裂：**A**=**M**−**N**=(**D**−**L**)−**U**

则**Dx**^(*k*+1)=**Lx**^(*k*+1)+**Ux**^(*k*)+**b**

x^(*k*+1)可由以下公式得到：

x

i

(
k
+
1
)
=

−
1

a

i
i

(

∑

j
=
1

i
−
1

a

i
j

x

j

(
k
+
1
)

+

∑

j
=
i
+
1

n

a

i
j

x

j

(
k
)

−

b

i

)

逐次超松弛迭代法（SOR）

引入松弛因子ω,0<ω<2 采用矩阵分裂：**A**=**M**−**N**=

1
ω

(

D
−
ω
L

)

−

ω

ω

(

D
−
ω
L

)

U则**Dx**^(*k*+1)=**Dx**^(*k*)+ω(**b**+**Lx**^(*k*+1)+**Ux**^(*k*)−**Dx**^(*k*))**x**^(*k*+1)=(**D**−ω**L**)^{−1}{(1−ω)**D**+ω**U**}**x**^(*k*)+ω(**D**−ω**L**)^{−1}**b****x**^(*k*+1)可由以下公式得到：

x

i

(
k
+
1
)
=

x

i

(
k
)

+
ω
⎡

b

i

−

∑

j
=
1

i
−
1

a

i
j

x

j

(
k
+
1
)

−

∑

j
=
i

n

a

i
j

x

j

(
k
)

⎤

/

a

i
i

严格对角占优矩阵

满足条件

|

a

i
i

|

>

∑

j
=
1,
j
≠
i

n

|

a

i
j

|

,

i
=
1,
2,
⋯
,
n
,

，则称矩阵A是严格对角占优矩阵。

雅可比迭代法和高斯-赛格尔迭代法都收敛

收敛性

迭代法收敛充要条件：ρ(**B**)<1，此时对任意初始向量**x**⁽⁰⁾=(*x*₁⁽⁰⁾,*x*₂⁽⁰⁾,...,*x*_{*n*}⁽⁰⁾)^T，会收敛到真实解

用到矩阵分裂时，还要求**D**非奇异

另一个充分条件：对于迭代法**x**^(*k*+1)=**Bx**^(*k*)+**f**如果有**B**的某种算子范数

‖**B**‖=*q*<1,则迭代法全局收敛，且有

‖*x*^{*}−*x*^(*k*)‖≤*q*^{*k*}‖*x*^{*}−*x*⁽⁰⁾‖

‖*x*^{*}−*x*^(*k*)‖≤

q

1
−
q

‖

x

(
k
)

−

x

(
k
−
1

)

‖

‖*x*^{*}−*x*^(*k*)‖≤

q

k

1
−
q

‖

x

(
1
)

−

x

(
0
)

‖

第七章 非线性方程组求根

二分法的误差：

|*x*_{*k*}−*x*^{*}|≤(b_{*k*}−*a*_{*k*})/2=(b−*a*)/2^{*k*+1}（*k*=0,1,2...）

不动点的存在性

设迭代函数φ(*x*)∈*C*[*a*,*b*],并且

(1)∀*x*∈[*a*,*b*],都有φ(*x*)∈[*a*,*b*]

(2)∃0≤*L*<1,使得∀*x*,*y*∈[*a*,*b*],都有|φ(*x*)−φ(*y*)|≤*L*|*x*−*y*|

那么φ(*x*)在[*a*,*b*]上存在唯一的不动点*x*^{*}

上述定理的第二个条件可用|φ′(*x*)|≤*L*<1代替。

误差估计：

|*x*_{*k*}−*x*^{*}|≤

L

k

1
−
L

|

x

1

−

x

0

|

或|*x*_{*k*}−*x*^{*}|≤

L

1
−
L

|

x

k

−

x

k
−
1

|

局部收敛性

若φ′(*x*)*在*x*^{*}的某邻域内连续，且|φ′(*x*^{*})|<1*,则迭代法是局部收敛的.

收敛阶

误差*c*_{*k*}=*x*_{*k*}−*x*^{*}，若

lim

k
→
∞

e

k
+
1

e

k

=
C
,
C
≠
0
,

则迭代过程*p*阶收敛

如果迭代函数在不动点*x*^{*}附近有*p*阶连续导数且φ′(*x*^{*})=φ″(*x*^{*})=...=φ^(*p*−1)(*x*^{*})=0，φ^(*p*)(*x*^{*})≠0,那么迭代过程在*x*^{*}附近*p*阶收敛

斯特芬森迭代法:

x

k
+
1

=
ψ

(

x

k

)
,
ψ
(
x
)
=
x
−

[
φ
(
x
)
]

2

−
f
(
x
k
)

f
′
(

x

k

)

牛顿法:

x

k
+
1

=

x

k

−

f
(

x

k

)

f
′
(

x

k

)

简化牛顿法:

x

k
+
1

=

x

k

−

f
(

x

k

)

f
′
(

x

0

)

牛顿下山法:

x

k
+
1

=

x

k

−
λ

f
(

x

k

)

f
′
(

x

k

)

每一次迭代从λ=1开始试算，不断令λ

减半直到满足|f(*x*_{*k*+1})|<|f(*x*_{*k*})|

重根情形下的牛顿法：若*f*(*x*)=(*x*−*x*^{*})^{*m*}*h*(*x*)改为

x

k
+
1

=

x

k

−
m

f
(

x

k

)

f
′
(

x

k

)

，仍然是平方收敛的

令μ(*x*)=*f*(*x*)/*f*′(*x*)对其用牛顿法得：

x

k
+
1

=

x

k

−

f
(

x

k

)

f
′
(

x

k

)

[

f
′
(

x

k

)

]

2

−
f
(

x

k

)

f
′
(

x

k

)

单点弦截法（割线法）:

x

k
+
1

=

x

k

−

f
(

x

k

)

f
(

x

k

)
−
f
(

x

0

)

(

x

k

−

x

0

)

两点弦截法:

x

k
+
1

=

x

k

−

f
(

x

k

)

f
(

x

k

)
−
f
(

x

k
−
1

)

(

x

k

−

x

k
−
1

)

可取两端点为初始值

第九章 常微分方程

一阶常微分方程初值问题

{

y
′
=
f
(
x
,
y
)
,
x
∈
[

x

0

,
b
]

y
(

x

0

)
=

y

0

利普希兹条件:|f(*x*,*y*₁)−f(*x*,*y*₂)|≤|*y*₁−*y*₂|,*L*>0

前向欧拉法:

y

n
+
1

=

y

n

+
h
f
(

x

n

,

y

n

)
,

局部截断误差

T

n
+
1

=

h

2

y
″
(

x

n

)
+

O

(

h

3

)

后向欧拉法:

y

n
+
1

=

y

n

+
h
f
(

x

n
+
1

,

y

n
+
1

)
,

局部截断误差

T

n
+
1

=

h

2

y
″
(

x

n

)
+

O

(

h

3

)

梯形方法:

y

n
+
1

=

y

n

+

h
2

[
f
(

x

n

,

y

n

)
+
f
(

x

n
+
1

,

y

n
+
1

)
]
,

局部截断误差

T

n
+
1

=
−

h

3

12

y
″″
(

x

n

)
+

O

(

h

4

)

改进欧拉法（Heun 法）

{

y

p

=

y

n

+
h
f
(

x

n

,

y

n

)

y

c

=

y

n

+
h
f
(

x

n
+
1

,

y

p

)

y

n
+
1

=

y

p

+

y

c

2

r级显式龙格-库塔公式

{

y

n
+
1

=

y

n

+
h
ϕ
(

x

n

,

y

n

,
h
)
=

y

n

+
h

∑

i
=
1

r

c

i

K

i

K

1

=
f
(

x

n

,

y

n

)

K

i

=
f
(

x

n

+

λ

i

h
,

y

n

+
h

∑

j
=
1

i
−
1

μ

i
j

K

j

)
,

i
=
2
,
⋯
,
r

二阶 R-K 公式（中点公式）

{

y

n
+
1

=

y

n

+
h

K

2

K

1

=
f
(

x

n

,

y

n

)

K

2

=
f
(

x

n

+

h
2

,

y

n

+

h
2

K

1

)

三阶 R-K 公式（库塔公式）