Reacciones de enderezamiento y equilibrio

Semana 09

Crecimiento y Desarrollo

Presente.

Saberes previos:

¿Cómo mantenemos el equilibrio?

Extraído de:https://elnoroestedigital.com/importancia-del-control-postural-y-equilibrio-en-la-realizacion-de-las-actividades-motrices/:

Visualicemos el video



https://www.youtube.com/watch?v=e0Qm_ANXif0

Después de visualizar la imagen, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital o el chat/audio

¿Para qué nos sirve el equilibrio?¿Cuándo se pierde el equilibrio?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las reacciones de enderezamiento y equilibrio para una valoración e intervención fisioterapéutica oportuna.

Temario:

1. Definición
2. Importancia
3. Precauciones
4. Aplicación

1. Definición

Las reacciones de enderezamiento son consideradas reacciones automáticas que permiten que la persona adopte la posición erguida normal y mantenga el equilibrio al cambiar de posición.

1. Definición

Sus acciones combinadas permiten que el niño ruede, se siente, se apoye sobre sus manos y rodillas, hasta que adopte una posición cuadrúpeda.

1. Definición

Las reacciones de equilibrio son reacciones automáticas que permiten mantener y restablecer el equilibrio durante toda la actividad motora.
Las reacciones de equilibrio involucran a las reacciones de enderezamiento.

2. Importancia

Necesarios para poder lograr una adecuada reacción de postura y equilibrio.

Lograr una transformación de los movimientos masivos.

Lograr una adecuada formación del tono muscular de variación gradual para resistir la fuerza de gravedad.

3. Precauciones

- Tener cuidado con las tomas y contratomas del FT.
- Evitar su aplicación en pacientes con enfermedades agudas que cursan fiebre y/o inflamación .
- Evitar su aplicación en pacientes con enfermedades cardiacas
- Evitar su aplicación en pacientes con enfermedades de huesos del cristal.
- Esperar la respuesta del infante en cada aplicación de las reacciones de enderezamiento y equilibrio.

4. Aplicación

La evaluación de los reflejos y las reacciones es importante para comparar la edad motora vs la edad neurológica, con aquellos reflejos que perduran dentro de cada hito del desarrollo (control cefálico, rolado, balanceo) los cuales dependen del desarrollo del SNC.

4. Aplicación

Las reacciones son conductas motrices de protección o defensa, pueden ser voluntarias o involuntarias, y surgen por aprendizaje de la interacción con el medio. Ellas se integran y forman parte de nuestros movimientos normales, y si se mantienen ausentes se considera patológico.

Reacciones de enderezamiento

Reacción de enderezamiento del cuello

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
- Paciente en decúbito supino - Cabeza en posición media - Brazos y piernas extendidos	Rotar la cabeza del paciente hacia un lado, de forma activa o pasiva	El cuerpo no rota	El cuerpo rota como un todo en dirección hacia la cabeza

Reacción de enderezamiento del cuello



Reacción negativa



Reacción positiva

Reacción de enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
- Paciente en decúbito supino - Cabeza en posición media - Brazos y piernas extendidos	Rotar la cabeza hacia un lado, activa o pasivamente	El cuerpo rota hacia un lado como un todo (enderezamiento del cuello) y no segmentariamente	Rotación segmentada del cuerpo entre los hombros y la pelvis, por ejemplo primero se voltea la cabeza, luego los hombros y finalmente la pelvis

Reacción de enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo



Reacción negativa



Reacción positiva

Reacciones de enderezamiento laberintico, actuando sobre la cabeza

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
Sostenga al paciente en el aire con los ojos vendados. Posición prona	Posición prona en el aire, por si misma	No endereza la cabeza automáticamente a la posición normal	La cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal

Reacciones de enderezamiento laberintico, actuando sobre la cabeza



Reacción negativa

Reacción positiva

Reacciones de enderezamiento óptico

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
Sostenga al paciente en el aire posición prona	Posición prona en el aire, por si misma	La cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal	La cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal

Reacciones de enderezamiento óptico



Reacción negativa

Reacción positiva

Reacciones de enderezamiento anfibia

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
Paciente en decúbito prono Cabeza en posición media Piernas y brazos extendidos encima de la cabeza	Levante la pelvis de una lado	No se produce flexión del brazo, cadera y rodilla	Flexión automática del brazo, cadera y rodilla del mismo lado

Reacciones de enderezamiento anfibia



Reacción negativa



Reacción positiva

4. Aplicación

Reacciones de equilibrio

Reacciones de equilibrio – posición prona

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
Paciente en decúbito prono, pero sobre una superficie inestable Brazos y piernas extendidas	Incline la plancha o superficie hacia un lado	La cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente, no hay reacciones de equilibrio ni de defensa.	Enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y dela pierna del lado elevado (reacción de equilibrio) La reacción es positiva a los 6 meses y se continua a lo largo de la vida

Reacciones de equilibrio – posición prona



Reacción negativa



Reacción positiva

Reacciones de equilibrio – posición supina

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
Paciente en decúbito supino, sobre una superficie inestable Brazos y piernas extendidas	Incline la plancha o superficie hacia un lado	La cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente, no hay reacciones de equilibrio ni de defensa.	Enderezamiento cabeza y tórax, abducción y extensión del brazo y dela pierna del lado elevado (reacción de equilibrio) La reacción es positiva a los 6 meses y dura toda la vida

Reacciones de equilibrio – posición supina



Reacción negativa



Reacción positiva

Reacciones de equilibrio – posición cuadrúpeda

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
Paciente en decúbito cuadrúpeda	Incline la plancha o superficie hacia un lado	La cabeza, el tórax y extremidades no se enderezan espontáneamente, no hay reacciones de equilibrio ni de defensa.	Abducción y extensión del brazo y pierna del lado elevado y reacción de defensa del lado inclinado. Aparece a los 8 mese y perdura toda la vida.

Reacciones de equilibrio – posición cuadrúpeda



Reacción negativa



Reacción positiva

Reacciones de equilibrio – posición sedente

Posición de prueba	Estímulo de prueba	Reacción negativa	Reacción positiva
Paciente en posición sedente	Incline la silla hacia un lado	La cabeza, el tórax y extremidades no se enderezan espontáneamente, no hay reacciones de equilibrio ni de defensa.	Abducción, extensión del brazo y pierna del lado elevado y reacción de defensa de lado inclinado. Aparece desde los 10 – 12 meses y perdura toda la vida.

Reacciones de equilibrio – posición sedente



Reacción negativa

Reacción positiva

Actividad sincrónica

Realiza una infografía sobre las reacciones de enderezamiento y equilibrio, señalando el tiempo de inicio y desaparición de los reflejos.

Extraído de: https://images.app.goo.gl/SKJc5JRe4wJXBW8X7

Conclusiones

Aportes

- Las reacciones de enderezamiento y equilibrio son importantes ya que nos permiten corregir nuestra postura o posición en respuesta a la fuerza de gravedad.

Aportes

Aportes

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Consultas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.