

REHABILITACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y DEPORTE

SEMANA 6

LESIONES Y FRACTURAS DEL MMII III



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

TIBIA Y PERONÉ


FRACTURA DE TIBIA Y PERONE

Lesión traumática grave, que suele producirse por un fuerte golpe directo sobre la zona ya se en un partido de fútbol o practicando esquí, o por un mecanismo de rotación forzada



SÍNTOMAS

- Dolor muy fuerte.
- Imposibilidad de caminar, soportar peso o mover la extremidad afectada.
- En caso de roturas cerradas (no sobresale ningún fragmento de hueso a través de la piel) puede detectarse una deformidad significativa en la zona de la lesión.
- Hinchazón.
- Hemorragia interna.
- Pérdida de sensibilidad en la zona afectada y por debajo de esta (si se ha lesionado algún nervio a consecuencia de la fractura).



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Favorecer la consolidación

- Irrigación, compresión, inmovilización, magnetoterapia.

Tratar la afectación de las partes blandas

- Favorecer que el riego sanguíneo, elevación de la extremidad y drenaje circulatorio. Ejercicios isométricos en la musculatura afectada, ejercicios activos del resto de la extremidad. Elongación controlada de la musculatura.

Disminuir los efectos de la inmovilización

- Electroestimulación, ejercicios isométricos de la musculatura afectada, irradiados y facilitación neuromuscular propioceptiva (FNP). Ejercicio de propiocepción.

Tratamiento Fractura

Tibia y peroné


 **fisioonline**

Fisio

PIE

FRACTURA DE CALCÁNEO

- En casos de caídas verticales importantes puede llegar a fracturarse, como resultado de dos mecanismos: cizallamiento y aplastamiento.
- Puede clasificarse en 3 grados, basada en la gravedad del hundimiento del talón, siendo la más grave aquella en la que el astrágalo, el hueso que se sitúa justo por encima, se hunde y penetra en el calcáneo, y en la planta del pie desaparece la curva típica que forma una bóveda. Aunque esto no es lo más común, sólo ocurre en casos de caídas a mucha altura y fuerte impactación.



SÍNTOMAS

- Dolor intenso en la zona del talón.
- Inflamación en el talón.
- Dolor al mover pie y tobillo.



TRATAMIENTO

- Drenaje linfático
- Movilizaciones pasivas
- Movilizaciones pasivas asistidas
- Movilizaciones activas
- Ventaje de contención
- Fortalecimiento muscular
- Ejercicios de propiocepción




TRATAMIENTO



FRACTURA DEL V METATARSO

- La fractura de este metatarsiano es bastante frecuente en el ámbito deportivo, más aún en deportes que requieren cambios de dirección y saltos.
- Lo más frecuente es que la fractura se produzca en la base, la denominada Fractura de Jones.



SÍNTOMAS

Los síntomas son:

- Dolor agudo
- Sensación de pinchazo en la zona de la fractura
- Inflamación
- Dificultad o incapacidad para caminar.



TRATAMIENTO

Objetivos a corto plazo	Objetivos a mediano plazo	Objetivos a largo plazo
Reducir el dolor	Mejorar todo lo anterior	Reforzamiento muscular a través de ejercicios excéntricos
Mejorar la amplitud de movimiento articular	Reeducación de la marcha	Tener una buena propiocepción
Reducir la inflamación	Reforzamiento muscular a través de ejercicios isométricos	Correcta deambulación de la marcha sin necesidad de ayudas parciales
Puesta en carga de forma progresiva para la reeducación de la marcha		
Relajar la musculatura de la extremidad inferior		

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

