

Procedimientos de Ortopedia

SEMANA 9


Deformidades de Miembro superior

Presente.

Lic.TF Wendy Pacompia Bustincio


Deformidades de Miembro superior

Son alteraciones en el desarrollo o la estructura del brazo y la mano.



CONGÉNITO

Ocurren durante el desarrollo fetal, a menudo sin causa clara, aunque pueden estar asociadas a síndromes genéticos.



ADQUIRIDO

Pueden ser resultado de fracturas mal curadas, infecciones o condiciones degenerativas.



Ausencia congénita del pie y los dedos del pie



Defecto por reducción longitudinal del radio


DEFECTOS POR REDUCCIÓN DE EXTREMIDADES

Cuando no se forma completamente una parte del brazo o el brazo entero (extremidad superior) o una parte de la pierna o la pierna entera (extremidad inferior) del feto durante el embarazo.

¿Qué desafío tendrá un niño con defecto por reducción?

POLIDACTILIA

Donde una persona nace con más de cinco dedos en una mano o pie, pudiendo ser un pequeño bulto de tejido o un dedo completamente formado.



SINDACTILIA

Donde dos o más dedos de las manos o pies están fusionados, comúnmente por piel, pero a veces también por huesos, tendones y vasos sanguíneos (compleja).



MANO HENDIDA

Cuando faltan uno o más dedos centrales, creando una hendidura en forma de "V" o "U" en la palma.




ARTROGRIPOSIS

Múltiples contracturas articulares congénitas.



DEFORMIDAD DE SPRENGEL

Malformación congénita del hombro donde la escápula (omóplato) no desciende a su posición normal durante el desarrollo fetal, quedando elevada y anormalmente pequeña



TRATAMIENTO

QUIRÚRGICO

Transferencia de Tendones: Para mejorar la movilidad y función.

Reconstrucción: Reparar uniones entre dedos (sindactilia), alargar huesos (alargamiento de extremidades), o resecar elementos sobrantes.

ORTESIS/PRÓTESIS

Férulas/Órtesis: Soportes para corregir deformidades en desarrollo o post-quirúrgicas.

Prótesis: Extremidades artificiales (ganchos, manos, brazos) adaptadas desde edades tempranas para integrar su uso.

REHABILITACIÓN

Fisioterapia y Terapia ocupacional: Para mejora del movimiento y función del MS.

DEFORMIDADES ADQUIRIDAS

Osteoartritis



Traumático




Amputación
específica



Fracturas
mal
alineadas







Watch video on YouTube

Error 153

Video player configuration error



Ortesis estáticas (posicionales): Dispositivos que no permiten movimiento, pero mantienen una determinada postura. Se utilizan como un soporte rígido en fracturas, condiciones inflamatorias de tendones y partes blandas e injurias nerviosas.



- Ortesis dinámicas (funcionales o cinéticas): En contraste con las ortesis estáticas, estos dispositivos permiten o facilitan el movimiento. Este tipo de ortéticos es utilizado primariamente para asistir al movimiento de músculos debilitados.



ANATOMICAL SITE

SPLINT


MUÑECA

Functional wrist splint



MANO

Resting hand splint



Finger ring splint



PULGAR

Thumb post splint







Muchas gracias

Presente.