

EJERCICIOS DE BUERGWER ALLEN



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

DEFINICIÓN


- Son ejercicios indicados en problemas circulatorios periféricos, como arterioesclerosis y trombosis venosa, fundamentalmente.
- Se basan en la inducción y aprovechamiento terapéutico de las reacciones de hiperemia local que se obtienen al realizar los ejercicios propuestos, para favorecer la circulación colateral por medio de la gravedad.
- Los debe realizar el paciente en su cama entre 3 y 5 veces diarias.
- Consiguen aumentar el flujo sanguíneo en los miembros inferiores.

INDICACIONES

ALTERACIONES VENOSAS	ALTERACIONES ARTERIALES	TRASTORNOS ARTERIOVENOSOS
Coágulos sanguíneos	Arterioesclerosis	Tromboangeitis obliterante
Flebitis	Enfermedad de Buerger	Fistulas arteriovenosas
Varices	Fenómeno de Raynaud	
	Embolia	
	Trombosis	

FASE 1: ELEVACIÓN

- En la primera fase el paciente se encuentra tumbado boca arriba con las piernas flexionadas por la cadera, en un ángulo de 60° a 90° aproximadamente.
- A la vez se realizan flexiones plantares y dorsales de los pies. Esto se mantiene entre medio minuto y tres minutos , lo que provocará palidez en la piel.





FASE 2: DESCENSO

- En la segunda fase el paciente se encuentra sentado en la camilla con los pies colgando a ser posible sin tocar el suelo.
- Va a realizar entonces circunducciones de los tobillos por espacio de 2 a 5 minutos hasta que se produzca una hiperemia (coloración rojiza) que se producirá por la llegada masiva de sangre a la zona después del palidecimiento anterior.





FASE 3: REPOSO

- En esta última fase el paciente se coloca en decúbito supino (boca arriba) y realiza flexiones dorsales y plantares de tobillo durante tres a cinco minutos.



Los ejercicios de Buerger Allen se repiten de 3 a 5 veces, con una frecuencia de 3 a 5 veces al día.





GRACIAS POR SU ATENCIÓN