

EJERCICIO TERAPÉUTICO DE RISSER



Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

EJERCICIOS DE RISSE

Son ejercicios especiales para personas con patología de pie plano o cualquier afección en el pie donde se encuentren:

- Limitación de articulaciones falángicas
- Falta de fuerza en la musculatura y debilidad
- Falta de elasticidad en los ligamentos

¿EN QUÉ CASOS SE APLICAN?

1. Lesiones en los pies (fracturas, tendinopatías)
2. Enfermedades que causan desequilibrio muscular, tales como la parálisis cerebral, espina bífida o distrofia muscular.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

1. Restituir el pie a su estado normal, corrigiendo las deformidades presentes, tomando en consideración la sintomatología y el grado de severidad.
2. Cuando el pie plano persiste hasta la edad adulta, muchas veces es imposible controlar las deformidades. El tratamiento solamente aliviará los síntomas.

GRADOS DEL PIE PLANO

- 1 Aumenta apoyo externo del pie
- 2 Contacto del borde interno del pie pero se mantiene la bóveda
- 3 Desaparece completamente la bóveda plantar
- 4 La anchura del pie es mayor en el centro y menor en la parte anterior y posterior



Pie Normal

Pie Plano
1º Grado

Pie Plano
2º Grado


Pie Plano
3º Grado

PUNTOS A CONSIDERAR

1. Los ejercicios deberán realizarse de forma lenta y controlada.
2. Cada ejercicio deberá realizarse al menos 2 veces al día, realizando 2 series de 10 a 15 repeticiones, los que podrán ser modificados por el fisioterapeuta según la evolución del paciente.
3. En el caso que alguno de los ejercicios aumentara, produjera dolor o inflamación excesiva, deberá suspenderse y preguntar al fisioterapeuta.
4. La aplicación de frío o calor local sobre el tobillo deberá ser valorado por el fisioterapeuta, dependiendo de la patología que posea el paciente, siendo como norma de aplicación más normal entre 7 – 10 minutos al finalizar los ejercicios y en periodos de inflamación o dolor.

MATERIALES

1. Una (01) toalla delgada de manos
2. Diez (10) canicas medianas
3. Un (01) rodillo de amasar o una botella
4. Una (01) pelota mediana





EJERCICIO 1

- Extender la toalla en el piso
- Colocar la punta de los pies al borde de la toalla
- Recoger (arrugar) la toalla con los dedos de los pies
- Una vez recogida toda la toalla, extenderla con los dedos de los pies

Músculos que realizan este ejercicio:

- Flexor largo del primer dedo
- Flexor largo de los dedos
- Tibial posterior
- Tibial anterior
- Extensor largo de los dedos
- Extensor largo del primer dedo



EJERCICIO 2

- Colocar las canicas en el suelo, separadas
- Pedir al paciente que recoja una canica con los dedos de los pies y colocarlas en un frasco de boca ancha
- Repetir hasta acabar con todas las canicas



Músculos que realizan este ejercicio:

- Flexor largo y corto de los dedos



EJERCICIO 3

- Colocar el rodillo o botella en el suelo
- Colocar la planta del pie sobre el rodillo, moverla hacia adelante y atrás, procurando apoyar el borde de afuera del pie
- Recorrer toda la planta del pie, doblando los dedos del pie

Músculos que realizan este ejercicio:

- Flexor largo del primer dedo
- Flexor largo de los dedos
- Tibial posterior
- Tibial anterior
- Extensor largo de los dedos
- Extensor largo del primer dedo
- Tríceps sural
- Flexor corto de los dedos
- Flexor corto del primer dedo
- Extensor corto de los dedos
- Extensor corto del primer dedo



EJERCICIO 4

- Colocar la pelota en el suelo
- Pedir que tome la pelota con el borde de afuera del pie
- Pedir que levante de 20 – 25 cm del suelo

EJERCICIO 5

- Paciente de pie
- Pedirle que se pare en los bordes laterales de ambos pies, doblando los dedos al mismo tiempo

Músculos que realizan este ejercicio

- Tríceps sural
- Tibial posterior
- Flexor largo del primer dedo
- Flexor largo de los dedos
- Tibial anterior



EJERCICIO 6

- Se le pide al paciente que se pare en los bordes laterales de los pies
- Doblar los dedos al mismo tiempo
- Se pide que camine de puntas

Músculos que realizan este ejercicio:

- Peroneos laterales largo y corto
- Tríceps sural
- Flexor largo del primer dedo
- Flexor largo común de los dedos del pie
- Tibial posterior




EJERCICIO 7

- El paciente debe estar de pie
- Se pide que se apoye solamente en los talones
- Debe realizar marcha apoyado en talones
- Con este ejercicio conseguimos contraer la mayoría de músculos que generan arco plantar.
- La forma de realizarlos será variando la posición de los pies, para conseguir que el paciente trabaje todos los grupos musculares que nos interesan.

Músculos que realizan este ejercicio:

- Tibial anterior
- Extensor del primer dedo
- Extensor común de los dedos



EJERCICIOS DE MOVILIZACIÓN ACTIVA







GRACIAS POR SU ATENCIÓN