

# ***Procedimientos de Ortopedia***

## **SEMANA 7**

**Cervicobraquialgia**


**Lumbociatalgia**

**Compresión radiculomedular**

## **CERVICOBRAQUIALGIA**

La cervicobraquialgia es un trastorno físico que se caracteriza por un dolor crónico que se origina en la región cervical, es decir, el cuello, y se expande a lo largo del brazo.

Este dolor a menudo es acompañado por una sensación de adormecimiento, debilidad o “pinchazos” en las extremidades superiores.



La cervicobraquialgia es una afección común que puede ser causada por varias razones clave, todas relacionadas con las estructuras de la columna cervical y de los hombros.

## **PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN LA COLUMNA CERVICAL**

### **COLUMNA CERVICAL**



**vista anterior**



**vista lateral**



**vista posterior**

Vértebras o los discos intervertebrales, son una de las principales causas de la cervicobraquialgia. Procesos degenerativos, como la artrosis, hernias de disco, o traumas ocasionados por accidentes o malas posturas continuadas.


## **TENSIÓN MUSCULAR**


La tensión muscular en la zona del cuello y de los hombros es también un factor común que puede generar cervicobraquialgia. La tensión puede acumularse debido al estrés, la ansiedad o el mantenimiento de posturas inadecuadas durante largos períodos de tiempo, sobre todo en personas que trabajan muchas horas frente a una computadora.



## COMPRESIÓN NERVIOSA

Que puede resultar de traumas, inflamación o la presencia de hernias discales. Esta compresión puede provocar dolor, hormigueo y debilidad en el brazo y la mano, síntomas típicos de la cervicobraquialgia.






**DOLOR EN CUELLO  
Y BRAZOS**

**DOLOR IRRADIADO**

**RESTRICCIÓN DEL  
MOVIMIENTO**




**TERAPIA MANUAL**

**ELECTROTERAPIA**

**CONTROL  
POSTURAL**


**TERMOTERAPIA**

**KINESIOTERAPIA**





## **LUMBOCIATALGIA**

Es un cuadro clínico caracterizado por la presencia simultánea de dolor lumbar (zona baja de la espalda) y dolor irradiado a lo largo del trayecto del nervio ciático, que puede extenderse desde la nalga, pasando por la parte posterior del muslo, la pierna e incluso llegar hasta el pie.




*Este dolor suele ser de carácter punzante, eléctrico o urente, y frecuentemente se acompaña de otros síntomas neurológicos como hormigueo (parestesias), entumecimiento, debilidad muscular o sensación de calambres en el territorio inervado por el nervio ciático.*







El dolor de ciático se irradia desde los glúteos bajando por la pierna y puede viajar incluso hasta los pies y los dedos de los pies

- Traumatismos
- Enfermedades reumáticas
- Sobreesfuerzos
- Malas posturas mantenidas
- Enfermedades de origen vírico
- Debilidad o exceso de tono de la musculatura lumbar
- Hernia discal



Origen: Nace de las raíces nerviosas L4, L5, S1, S2 y S3 en la columna lumbar.





Dolor localizado en  
la región lumbar.

Dificultad o  
incapacidad para  
agacharse.

Sensación de  
rigidez en el torso y  
el tren inferior.

Parestesias y  
debilidad en una o  
ambas piernas




**TERAPIA MANUAL**

**ELECTROTERAPIA**

**CONTROL  
POSTURAL**


**TERMOTERAPIA**

**KINESIOTERAPIA**



## COMPRESIÓN RADICULOMEDULAR

Ocurre cuando una raíz nerviosa o la médula espinal son presionadas, comúnmente por una **hernia de disco, hueso o tumor, causando dolor, debilidad, entumecimiento y hormigueo** que se irradia desde la columna hacia brazos o piernas, requiriendo diagnóstico (RM) y tratamiento que puede incluir fisioterapia, corticoides, o cirugía, siendo una urgencia si es severa para evitar daño neurológico permanente.



DOLOR

CLAUDICACIÓN

DEBILIDAD  
MUSCULAR

DISFUNCIÓN DE  
ESFÍNTERES

PARESTESIAS

**Muchas gracias**

**Presente.**