


REHABILITACION NEUROLOGICA

T.M. Terapia física y rehabilitación
Lic. Yasmin del Rosario Bruno Phowell

Semana 8:

- Definición del tema
- Características clínicas
- Tratamiento
- Videos complementarios

Nervio facial



Generalidades


- Comienza su desarrollo en el embarazo a finales del primer mes.
- Brinda inicio del nervio facial y acústico.
- Aparece junto al oído interno.
- Se encuentra por debajo de la piel al nacimiento.



Generalidades

- Es el séptimo par craneal.
- Es un nervio mixto.
 - Estimulación sensitiva.
 - Estimulación motora
 - Estimulación parasimpática.
- Sal del tronco del encéfalo.
- Entra por el conducto auditivo interno.









Fuente: Anil K. Lalwani, MD: *Diagnóstico y tratamiento en otorrinolaringología. Cirugía de cabeza y cuello*, 3e


Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.



Fuente: Anil K. Lalwani, MD: *Diagnóstico y tratamiento en otorrinolaringología. Cirugía de cabeza y cuello*, 3e
Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.




Funciones



- Permite la expresión facial.
- Brinda estímulo a los músculos estilohioideo.
- Estimula la salivación.
- Brinda estímulo sensitivo auditivo.
- Brinda estímulo a las glándulas.
- Brinda impulsos del sentido del gusto.

Generalidades

- El nervio facial puede degenerarse.
- Presenta varios grados de lesión.
- Es el nervio que más se lesiona.
- Siendo el mas común la lesión de la parálisis facial.
- Impide los movimientos de:
 - Movimientos de la frente.
 - Movimientos del parpado.
 - Movimientos de la boca.
 - Movimientos de expresiones.



Generalidades

- Las personas con lesión facial presentan:
 - Asimetría de cara.
 - Problemas psicológicos.
 - Problemas emocionales.
- Las lesiones pueden ser de tipo central o periférico.




Lesiones del nervio facial

- **Lesión central :**
 - Causada por afección de la neurona motora superior.
 - Se acompaña de hemiplejias.
 - Suelen ser normales los movimientos faciales.
- **Lesión periférica:**
 - Puede ser unilateral.
 - Puede ser bilateral.
 - También llamada parálisis de Bells.
 - Afecta directamente al nervio facial.
 - Pérdida voluntaria de los músculos de la cara.

Signos y síntomas

- La hemicara afectada se ven caídos los músculos, los ojos no cierran con normalidad.
- Problemas visuales.
- Ausencia de pliegues del rostro.
- Salivación excesiva.
- Problemas de deglución.



Causas

- Idiopática, cuando es primaria.
- Parálisis secundaria:
 - Traumatismo.
 - Problemas vasculares.
 - Tumores.
 - Drogas.



Diagnostico

- Electromiografía
- Electroencefalograma
- Audiometría.



Tratamiento

- Tratamiento rehabilitador.
- Tratamiento quirúrgico.



**MUCHAS
GRACIAS**

Presente.