carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 12

EJERCICIO TERAPÉUTICO DE WILSON



Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

CONTENIDO DE LA SESIÓN

Concepto

Objetivos

Etapas

Ejercicios

Contraindicaciones

MÉTODO DE WILSON

- Wilson nos habla de un programa de ejercicios aplicados a pacientes con dolores a nivel cervical alta de origen mecánico.
- Él desarrolló ejercicios que ayuden a mantener la flexibilidad y el rango de movimiento de la columna cervicodorsal.

- Los ejercicios de Wilson constan de tres momentos:
  - ✓ Depresión de la mandíbula-alineamiento.
  - ✓ Tracción de los segmentos cervicales.
  - ✓ Movilización cervical respetando el dolor

OBJETIVOS

- Buscar equilibrar la cabeza
- Disminuir tensiones musculares
- Iniciar depresión de la mandíbula
- Tracción en posición alineada
- Movilizaciones pasiva (tracción flexión, extensión, rotación, inclinación)
- Fortalecimiento (resistencia manual)

FASES DE LOS EJERCICIOS DE WILSON

Fase de relajación

- Es una fase en la que se va a buscar la relajación de la musculatura contracturada en base a una postura que debe de adoptar el paciente.
- Es una postura completamente antagonista al de la contractura o al de la zona del dolor.
- La técnica se puede aplicar en supino pero preferentemente se utiliza en la posición sentada. La silla debe ser completamente recta todo el raquis debe de estar apoyado sobre el espaldar de la silla y los pies deben estar completamente apoyados sobre el piso.
- En la fase de relajación los contactos manuales y los movimientos deben de ejecutarse con mucha precaución considerando la presencia de un dolor intenso no debe buscarse el estiramiento del músculo.
- Solo se adopta la postura buscando algún grado de distribución y relajación de la zona a tratar.

Fase de elongación o estiramiento

- En esta fase se ejecutan los estiramientos de los diferentes músculos comprometidos también se aplica la tracción axial que nos permite aumentar el espacio intervertebral.
- Los estiramientos requieren una técnica específica dependiendo del músculo que estamos tratando, por lo general los movimientos que se realizan son:
  - ✓ Flexión
  - ✓ Extensión
  - ✓ Lateralización
  - ✓ Rotación

Ejercicio 1

OBJETIVO	Alineamiento, extensión de articulación atlantoaxoidea
P. PARTIDA	Decúbito supino con las piernas flexionadas
EJECUCIÓN	Una mano realiza la depresión mandibular y la otra mano en la zona occipital ayuda a completar el desplazamiento. Mantener por 5 segundos y repose 5 segundos.
REPETICIONES	5 repeticiones
SERIES	2 series (2 veces al día)
FRECUENCIA	3 o 4 veces por semanas

Ejercicio 2

OBJETIVO	Alineamiento, separación de carillas articulares, relajación de grupos musculares.
P. PARTIDA	Decúbito supino con las piernas flexionadas
EJECUCIÓN	Una mano realiza la depresión mandibular y la otra mano en la zona occipital realiza una pequeña tracción. Mantener por 5 segundos y repose 5 segundos.
REPETICIONES	5 repeticiones
SERIES	1 serie
FRECUENCIA	3 o 4 veces por semanas

Ejercicio 3

OBJETIVO	Movilización propioceptiva, elongación de músculos contracturados.
P. PARTIDA	Decúbito supino con las piernas flexionadas
EJECUCIÓN	Una mano realiza la depresión mandibular y la otra mano en la zona occipital realiza un tracción con flexión. Mantener por 5 segundos
REPETICIONES	5 repeticiones
SERIES	1 serie
FRECUENCIA	3 o 4 veces por semanas

Ejercicio 4

OBJETIVO	Información propioceptiva, elongación de músculos contracturados
P. PARTIDA	Decúbito supino con las piernas flexionadas
EJECUCIÓN	Una mano realiza la depresión mandibular y la otra mano en la zona occipital realiza una tracción con extensión. Mantener por 5 segundos
REPETICIONES	5 repeticiones
SERIES	1 series
FRECUENCIA	3 o 4 veces por semanas

Ejercicio 5

OBJETIVO	Información propioceptiva, elongación de músculos contracturados
P. PARTIDA	Decúbito supino con las piernas flexionadas
EJECUCIÓN	Una mano realiza la depresión mandibular y la otra mano en la zona occipital realiza tracción con rotación. Mantener por 5 segundos
REPETICIONES	5 repeticiones
SERIES	1 serie
FRECUENCIA	3 o 4 veces por semanas

Ejercicio 6

OBJETIVO	Información propioceptiva, elongación de músculos contracturados
P. PARTIDA	Decúbito supino con las piernas flexionadas
EJECUCIÓN	Una mano realiza la depresión mandibular y la otra mano en la zona occipital realiza tracción con rotación y flexión. Mantener por 5 segundos
REPETICIONES	5 repeticiones
SERIES	1 serie
FRECUENCIA	3 o 4 veces por semanas

Ejercicio 7

OBJETIVO	Información propioceptiva, elongación de músculos contracturados
P. PARTIDA	Decúbito supino con las piernas flexionadas
EJECUCIÓN	Una mano realiza la depresión mandibular y la otra mano en la zona occipital realiza tracción con rotación y extensión. Mantener por 5 segundos
REPETICIONES	5 repeticiones
SERIES	1 serie
FRECUENCIA	3 o 4 veces por semanas

Fase de fortalecimiento

Son los ejercicios que el mismo paciente realiza en todos los ejes y planos.



Dejar caer la cabeza hacia adelante, con la barbilla tocando el pecho (boca cerrada) después dejar caer la cabeza hacia atrás

Repetir 10 veces en ambos sentidos.

Inclinar alternativamente la cabeza hacia la izquierda, después hacia la derecha (sin girarla, con la vista al frente durante todo el tiempo).

Repetir 10 veces en ambos sentidos.

Girar alternativamente la cabeza hacia la izquierda, después hacia la derecha (mirar hacia atrás por encima del hombro).

Repetir 10 veces en ambos sentidos.



Ejecutar un circulo muy lentamente con la cabeza en ambos sentidos.

Repetir 5 veces en ambos sentidos, hacer una pausa entre un sentido y otro.



Balancear los brazos hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás, efectuando círculos, los círculos se efectúan en sentido de las manillas del reloj y, luego, al contrario.

Repetir 10 veces en ambos sentidos.



Ambos brazos elevados lateralmente, a la altura de los hombros.

Desplazar enérgicamente los brazos extendidos hacia arriba y luego volver otra vez a brazos verticales.

Repetir este ejercicio 10 veces.

Contraindicaciones

- Circunducción cuello-hiperextensión
  - ✓ Compresión de discos intervertebrales
  - ✓ Estiramiento músculos flexores de cuello
- Evitar siempre flexiones o extensiones cervicales extremas
- Movimientos que comprimen las vértebras cervicales.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN