

EJERCICIOS DE FRENKEL



Presente.

Lic. TM. FT. Kevin Tejada
Cuadros

DEFINICIÓN

- Son una serie de ejercicios que van a pretender mejorar el control propioceptivo de las extremidades.
- Estos ejercicios se van a utilizar principalmente en los casos de edema cerebral secundario a un ACV, traumatismo craneal.

OBJETIVO

- Lograr la regulación del movimiento, de forma que el paciente sea capaz de realizarlo y adquiera confianza en la práctica de aquellas actividades que son esenciales para su independencia en la vida diaria.

UTILIZACIÓN

- Se utilizan para la enseñanza del movimiento suave y de la precisión

EJERCICIO EN DECÚBITO SUPINO

- Flexión y extensión de cada pierna en las articulaciones de la rodilla y cadera
- Flexión y extensión de una rodilla a la vez. Con el talón levantado de la cama.
- Flexión y extensión de una rodilla a la vez, deslizando el talón sobre la cama.
- Rodilla flexionada y talón colocado sobre alguna parte definida de la pierna, por ejemplo, la rótula, mitad de la pierna, tobillo y los dedos del pie



EJERCICIOS EN SEDENTE

- El paciente tratará de colocar su pie de forma segura en la mano del terapeuta mientras este cambia la posición de la mano constantemente
- El paciente mantiene la posición sedente fundamentalmente durante pocos minutos cada vez
- Elevar alternadamente cada rodilla y colocar el pie firme sobre el suelo. Pisando una marca trazada previamente
- Se enseña al paciente a levantarse y sentarse de nuevo, manteniendo juntas las rodillas
- Colocación de los pies hacia adelante y hacia atrás sobre una línea recta



EJERCICIOS EN BIPEDESTACIÓN

- Caminar entre 2 líneas paralelas.
- Caminar, colocando cada pie sobre una marca en el piso, que debe estar señalada en una posición bastante cercana a la ADD, marchando en línea recta (NO con los dedos hacia afuera).
- El paciente debe caminar hacia los costados, iniciando los pasos hacia el lado derecho. Este ejercicio debe realizarse enumerando los siguientes pasos
- Descansar el peso del cuerpo sobre el pie izquierdo
- Colocar el pie derecho a unos 30cm hacia ese mismo lado
- Descansar el peso del cuerpo sobre el pie derecho
- Colocar el pie izquierdo delante del pie derecho & finalmente el paciente debe caminar en zigzag o sobre marcas de curvas cerradas





GRACIAS POR SU ATENCIÓN