

计算物理 A——Homework 5

何金铭 PB21020660

1 题目描述

对于球面上均匀分布的随机坐标点, 给出它们在 (x, y) 平面上投影的几率分布函数。并由此验证 Marsaglia 抽样方法 $x = 2u\sqrt{1-r^2}, y = 2v\sqrt{1-r^2}, z = 1-2r^2$ 确为球面上均匀分布的随机抽样。

2 实现方法

2.1 投影的几率分布函数

利用抽样变换法来解球面上均匀点于 (x, y) 平面上的投影的几率分布函数
设点的面密度为 λ , 利用几何关系可得:

$$dN = \lambda dS = \lambda \rho^2 \sin \theta d\theta d\varphi = p(\theta, \varphi) d\theta d\varphi, (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0, 2\pi]) \quad (1)$$

当样本点足够大时, 可认为是连续分布, 有

$$\int_0^\theta \int_0^\varphi p(\theta, \varphi) d\theta d\varphi = \xi(\theta, \varphi) \quad (2)$$

进行归一化之后得:

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta d\varphi = \xi(\theta, \varphi) \quad (3)$$

利用 *Jacobi* 行列式法进行变量替换:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \sin \theta \cos \varphi \\ y = \sin \theta \sin \varphi \\ z = \cos \theta \\ \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} \right| = \sin \theta \cos \theta \end{array} \right. \quad (4)$$

则有:

$$g(x, y) dx dy = p(\theta, \varphi) \left| \frac{\partial(\theta, \varphi)}{\partial(x, y)} \right| dx dy \quad (5)$$

$$\begin{aligned} g(x, y) &= p(\theta, \varphi) \left| \frac{\partial(\theta, \varphi)}{\partial(x, y)} \right| \\ &= \frac{1}{4\pi} \sin \theta \cdot \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} \\ &= \frac{1}{\cos \theta} \\ &= \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{1-(x^2+y^2)}} \end{aligned} \quad (6)$$

所以得球面上均匀点于 (x, y) 平面上的投影的几率分布函数:

$$p(x, y) = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}} \quad (7)$$

2.2 验证 Marsaglia 抽样方法

再球面上的 Marsaglia 抽样方法为:

$$\begin{cases} x = 2u\sqrt{1-r^2} \\ y = 2v\sqrt{1-r^2} \\ z = 1-2r^2 \\ u^2 + v^2 = r^2 \end{cases} \quad u, v \in [-1, 1] \quad (8)$$

由于 u, v 随机均匀分布, 所以有 $g(u, v) = \frac{1}{4}$
利用等概率性, 我们有

$$\begin{aligned} p(x, y) dx dy &= Cg(u, v) du dv = g(u, v) \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| dx dy \\ &= Cg(u, v) \frac{1}{\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|} dx dy \\ &= Cg(u, v) \frac{1}{4(1-2r^2)} dx dy \\ &= C \frac{1}{16\sqrt{1-(x^2+y^2)}} dx dy \end{aligned} \quad (9)$$

其中 C 为归一化常数.

需要加一个归一化常数的原因是积分的区域发生了改变, 由于在抽样时实际上取的面积比值为 $\frac{\pi}{4}$, 所以 $C = \frac{4}{\pi}$

最终可得:

$$p(x, y) = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 + y^2)}} \quad (10)$$

发现结果与直接抽样法的结果相同.

当然, 我们所验证的只是必要条件而已 (仅仅是 Marsaglia 方法在 α - xy 平面上的正确性) 若要完全验证, 还需严格的证明, 这里就不详细给出了.

2.3 算法思路

2.3.1 直接抽样法

利用直接抽样的方法解得 (ρ, θ, φ)

设点的面密度为 λ , 利用几何关系可得:

$$dN = \lambda dS = \lambda \rho^2 \sin \theta d\theta d\varphi = p(\theta, \varphi) d\theta d\varphi, (\theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]) \quad (11)$$

当样本点足够大时, 可认为是连续分布, 有

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^\theta \int_0^\varphi p(\theta, \varphi) d\theta d\varphi = \xi(\theta, \varphi) \quad (12)$$

积分可得:

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^\theta \int_0^\varphi \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = \frac{1}{4\pi} \int_1^{\cos \theta} \int_0^\varphi d \cos \theta \, d\varphi = \frac{1}{4\pi} \varphi \cdot (1 - \cos \theta) = \xi(\theta, \varphi) \quad (13)$$

进行变量替换:

$$\begin{cases} u = \cos \theta & u \in [-1, 1] \\ 2\pi v = \varphi & v \in [0, 1] \\ g(u, v) = 1 \end{cases} \quad (14)$$

抽样方法如下:

1. 产生随机数 $\xi, \eta \in [0, 1]$
2. 做变换 $\xi' = 2\xi - 1$
3. 直接抽样得 $\theta = \arccos \xi', \varphi = 2\pi\eta$

2.3.2 MarsagliaSampling

抽样方法如下:

1. 先生成随机数 $\xi, \eta \in [0, 1]$
2. 记 $w = \xi^2 + \eta^2$
3. 若 $w \leq 1$, 则取样本点 $x = 2\xi\sqrt{1-w}, y = 2\eta\sqrt{1-w}$; 若不成立, 则重新操作 1.

3 程序说明

3.1 主要程序

schrage.c 16807 随机数生成器的代码

xy.py 利用直接抽样法和 Marsaglia 法产生球面上均匀点于 xy 平面上的随机投影坐标, 写入文件 './out1.csv', './Marsaglia.csv', 并作图

3.2 程序结果

schrage.exe 16807 PRNG

16807.csv 一个种子数为"23942907" 的样本随机数文件

./out 文件夹路径, 里面存放了用两种方法求得的随机点坐标文件, 在上文有提及.

./pic 文件夹路径, 里面存放了均匀点于 xy 平面上的投影的图像.

3.3 其他说明

1. 数据都写于 CSV 文件中
2. 其中 Python 程序用到的库有:

- matplotlib.pyplot : 用于作图
- numpy : 用于数据处理
- csv : 用于读写 CSV 文件

4 结果分析

4.1 随机点坐标

直接抽样法的结果为 './out/out1.csv', Marsaglia 抽样法的结果为 './out/marsaglia.csv'

4.2 随机点图像




图 1: Direct Sampling




图 2: Marsaglia Sampling

通过观察可以发现利用两种不同方法产生的随机点于 xy 平面上的分布类似, 直观的说明了结论的正确性.

5 进一步讨论

之后还可以在此基础上来讨论两种方法的运算速度

6 总结

1. 三维球面上随机点于 xy 平面上的投影概率密度分布函数为 $p(x, y) = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{1-(x^2+y^2)}}$
2. 成功检验 Marsaglia 抽样方法为球面上的均匀分布的随机抽样