

Bolalarda valgus oyoq deformatsiyasi

<u>Sabablari</u> <u>Valgus deformatsiyasi belgilari</u> <u>Diagnostika</u> <u>Davolash</u> <u>Xavf</u> <u>Xavf guruhi</u> <u>Oldini olish</u> <u>Shifokor qabuliga yozilish</u>	<i>Bolalarda valgus oyoq deformatsiyasi</i> - bu to'piqlarning ichki tomonlari orasidagi masofa 4-5 sm dan oshadigan patologiya. Tovon va barmoqlar tashqariga egiladi, oyoq panjasining ichki gumbazlari esa ichkariga botib ketadi.
--	--

Bolalarda valgus oyoq deformatsiyasi - bu to'piqlarning ichki tomonlari orasidagi masofa 4-5 sm dan oshadigan patologiya. Tovon va barmoqlar tashqariga egiladi, oyoq panjasining ichki gumbazlari esa ichkariga botib ketadi. Bu deformatsiya varusli deformatsiyadagi O-simon deformatsiyadan farqli ravishda X-simon deformatsiyalanish deb ham ataladi. Oyoq panjasi gumbazlari balandligining pasayishi bilan birgalikda tekis-valgusli qiyshayish yuzaga keladi.

Sabablari

Oyoq panjasining valgus deformatsiyasi tug'ma yoki orttirilgan bo'lishi mumkin:

Tug'ma: bachadonda suyaklar shakllanishining buzilishi bilan bog'liq.

Orttirilgan: pay-bog'lam apparati yetarli darajada rivojlanmaganligi va boshqa muammolar tufayli, ko'pincha zaif bolalarda paydo bo'ladi.

Sabablari:

Chala tug'ilganlik

Bachadon ichi gipotrofiyasi

Tez-tez uchraydigan respirator kasalliklar

Raxit

Jarohatlar

Gipsda uzoq vaqt qolish

Semizlik

Erta oyoqqa turish

Sifatsiz poyabzal

Qo'shimcha sabablar:

DSF

Polineyropatiya

Osteoporoz

Displaziya

Endokrin kasalliklar

Sonning tug'ma chiqishi

Poliomiyelit

Miodistrofiya

Valgus deformatsiyasi belgilari

Bolalarda oyoq kafti valgus deformatsiyasi belgilari:

Oyoqlar og'rig'i

Belda og'riq

Tebranish bilan qo'pol yurish

Oyoqlarning x-simon shakli

Shuningdek:

Oyoq panjasining ichki chetiga bosish (oyoqlarni ichkariga "cho'ktirish").

Oyoq panjalarining shishi va kechqurunlari talvasalar.

Poyabzalning notekis yuvilishi, asosan tagcharmning ichki tomonida.

Diagnostika

Oyoq panjasining valgusli deformatsiyasini tashhishlash uchun shifokor-ortoped ko'rik o'tkazadi va quyidagi tekshiruvlarni buyuradi:

Podometriya (oyoq panjasiga tushadigan yuklama taqsimotini baholash).

Kompyuter plantografiyasi (tovonning morfologik parametrlarini hisoblash).

Rentgenografiya (tovonlarning bir-biriga nisbatan holatini o'rganish).

Ayrim hollarda bo'g'imlarning ultratovush tekshiruvi o'tkaziladi. Shuningdek, asab tizimi kasalliklarini istisno qilish uchun bolalar nevrologining maslahati talab qilinishi mumkin.

Davolash

Davolash oyoq kaftining shaklini normallashtirishga, ularning funksiyalarini tiklashga hamda paylar va mushaklarni mustahkamlashga qaratilgan.

Konservativ davolash

Oyoq vannalari: 10 l iliq suvga 1/3 stakan dengiz tuzi. Har kuni 20 daqiqadan seanslar, 15 ta muolaja kursi, har 4 oyda takrorlanadi.

Massaj: Mutaxassis tomonidan bajariladi.

Loy va ozotokerit applikatsiyalari.

Parafinoterapiya: qon aylanishini va boylamlar egiluvchanligini yaxshilash uchun o‘ramlar.

Ignali refleksoterapiya.

Oyoq va boldir mushaklarining elektrostimulyatsiyasi.

Diadinamoterapiya, elektroforez, magnitoterapiya.

LFK: Bog‘lamlar egiluvchanligi va mushaklar kuchini yaxshilash uchun kundalik mashqlar.

Maxsus poyabzal

Oyoq va tovonlari qattiq mahkamlangan, supinator va individual pataklar bilan poyabzal kiyish. Velosiped va suzish tavsiya etiladi.

Jarrohlik davolash

Favqulodda holatlarda (7%):

Arthrodezlovchi operatsiyalar: tovon va tos suyagi o‘rtasidagi qo‘zg‘almas bo‘g‘imni ta‘minlaydi.

Dobbs usuli: Oyoq panjasini manual korreksiya qilish va keyin gips qo‘yish.

Kichik invaziv operatsiyalar: Paylarni mustahkamlash uchun oyoq panjasi suyaklari orasidagi burchak o‘zgartiriladi.

Xavf

Yengil daraja

O‘z vaqtida davolanganda to‘liq sog‘ayish mumkin.

Og‘ir daraja

Bu funksional buzilishlarga va nogironlik xavfiga olib keladigan jiddiy kasallikdir.

*Davolashning yoʻqligi oqibatlarini Davolashsiz valgus deformatsiyasi
quyidagilarga olib kelishi mumkin:*

Yassi oyoqlik

Doimiy oyoqlar ogʻrigʻi

Osteoxondroz

artroz

Qoʻl-oyoqlar kaltaligi

skolioz

Chanoq, boldir-tovon va tizza boʻgʻimlarining deformatsiyalari


Xavf guruhi

Agar ota-ona bolani erta (9 oygacha) oyoqqa turgʻizsa, unga sifatsiz poyabzal sotib olsa yoki oʻlchamini notoʻgʻri tanlasa, valgus deformatsiyasi bilan kasallanish xavfi yuqori boʻladi. Patologiyaga, shuningdek, raxit bilan ogʻrigan goʻdaklar va bu kasallikka irsiy moyil boʻlgan bolalar ham moyil boʻladi.

Oldini olish

Valgus deformatsiyasining oldini olish quyidagilarni oʻz ichiga oladi: 9 oygacha bolani oyoqqa qoʻymaslik, D vitamini yordamida raxitning oldini olish, ortopedik pataklar va supinatorli poyabzal sotib olish, oyoqlarni uqalash. Ortoped, jarroh va nevrolog koʻrigidan muntazam oʻtish muhimdir.

Davolash natijalari kamida yarim yildan keyin koʻrinadi.



@grijaa

Foydali mashqlar
va maslahatlar
kanali

Вид сзади



Вид сбоку

Th12-L1

L1-L2

L2-L3

L3-L4

L4-L5

L5-S1

