

Kurt Bizarre Contact I: Fast TPI and DI Exposition

English/Español

Juan Carlos Caso Alonso

2 de julio de 2023

Abstract English

Contact letter and exchange of opinions with the account Kurt Bizarre (Samuel). He asks me to define DI and TPI and also to indicate the errors in the demonstrations of the Theorems:

$$|A| < |P(A)|$$

$$|P(N)| = |R|$$

The second one does not pose any problems since if all infinite cardinals are equal, it is compatible with my statement. And I myself proved it to myself by applying LJA Constructions and the Naive Theorem CA (patience, it's not the time for that today)

Expected delivery date is April 18, 2023, as always, I think it will be two pages... and it will be done soon...

If you are wondering why this has an abstract, it's because I have a Latex skeleton that I don't know how to change hahahaha, and in English by ChatGPT because I have an American friend to whom I'm going to pass it on, who has been asking me for translated material for a while.

Abstract Español

Carta de contacto e intercambio de pareceres con la cuenta Kurt Bizarre (Samuel). Me pide que le defina la DI y la TPI, y que de paso le indique los fallos en las demostraciones de los Teoremas:

1) $|A| < |P(A)|$

2) $|P(N)| = |R|$

El segundo no da problemas puesto que si todos los cardinales infinitos son iguales, es compatible con mi afirmación. Y yo mismo me lo demostré a mi mismo aplicando Construcciones LJA y el Naive Theorem CA (paciencia, hoy no toca eso)

Fecha de supuesta entrega 18 Abril 2023, como siempre, pienso que son dos páginas... y que se hacen pronto...

Si te preguntas por qué tiene abstract esto es porque tengo un esqueleto de Latex que no se cambiar jajajajaja, y en inglés de chatGPT pq tengo un amigo americano al que se lo voy a pasar, que lleva tiempo pidiéndome material traducido.

Índice general

Capítulos	Página
I Part I: English	6
1. Introduction	7
2. Fast and simple analogy about the fail in the logic of the proofs	8
2.1. The Table	8
3. Try of Minimum Previous Context	9
4. Di, TPI and the actual phenomenon that is happening right now	10
4.1. DI	10
4.2. TPI	10
4.3. Incredible result	10
II Parte II: Español	11
5. Introducción	12
6. Analogía rápida del fallo lógico de las demostraciones	14
6.1. La Tabla	14
6.2. Explicación de la tabla	14
6.2.1. Punto 1	15
6.2.2. Punto 2	15
6.2.3. Punto 3	18
7. Intento de Contexto Previo Mínimo	20
7.1. Relaciones no aplicación	20
7.2. NAIVE CA theorem, sin demostración	21
7.2.1. Apreciaciones	21

7.3. Definición de 'resolver'	22
8. DI, TPI, y el fenómeno actual que me está sucediendo	24
8.1. DI:variante pelea de colegio	24
8.1.1. Observaciones de la DI	27
8.2. TPI	29
8.2.1. Definiciones previas para entender la TPI	29
8.2.2. TPI, definición	33
8.2.3. Observaciones de la TPI	33
8.3. Resultado increíble	35

Parte I

Part I: English

C.- 1

Introduction

C.- 2

Fast and simple analogy about the fail in the logic of the proofs

2.1. The Table

$O_{-o}!!$	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
A	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
1	{1}	{1}	{1}	{1}	{1}
2	{2}	{2}	{2}	{2}	{2}
3	{3}	{3}	{3}	{3}	{3}
4	\emptyset	{4}	{5, 6}	{4, 5, 6}	$b = \{a \in A a \notin R_5(a)\}$
5	{6}	{6}	{6}	{6}	{6}
6	{5}	{5}	{5}	{5}	{5}

C.- 3

Try of Minimum Previous Context

Text

C.- 4

**Di, TPI and the actual phenomenon
that is happening right now**

Text

4.1. DI

Text

4.2. TPI

4.3. Incredible result

Parte II

Parte II: Español

C.- 5

Introducción

Lo que me pides... ¿Cuáles serían las palabras: 'No es justo'? No solo me ha costado 25 años desarrollar el contraejemplo, con cada punto chequeado por otra gente y con referencias de dos matemáticos. Encima me pides que te diga el fallo de la demostración, cuando el teorema 1, ($|A| < |P(A)|$), no admite excepciones del tipo $|\mathbb{N}| = |P(\mathbb{N})|$.

Es una trampa circular por varios motivos:

1) Tengo que resumir y descartar material, MUCHO, porque tengo una ventana de atención por tu parte muy reducida respecto a lo que necesito en realidad. No puedo hacerlo en el formato que me resulta más... 'eficiente'. Y no puedo cometer ni el más mínimo fallo. Y es un campo de minas, y te pido perdón de antemano, porque también debo evitar que 'cortocircuite'. Pensarás que soy un flipado, que soy un ignorante y que digo eso porque no entiendo las críticas que me hacen, pero no es el caso. Como dudo de todo, hasta de mi mismo, suelo usar el feedback que me dan, y descubro 'reacciones curiosas' cuando unos matemáticos me dicen lo que piensan sinceramente, sobre lo que me dicen OTROS matemáticos... pensando que son ideas mías. Tengo muchísimas anécdotas, de diferente índole.

2) Necesito el contraejemplo para que entiendas el fallo de la lógica. Como ya te dije, tengo tiempo reducido y NO puedo explicarte TODO lo que tengo, y no me vas a creer si solo te menciono la existencia de lo que es una 'paradoja híbrida'... :D... Me la voy a jugar, pero... ¿A que te estás preguntado que coño es una paradoja híbrida? :D... Tienes que verlas 'actuar' para creer que existen. PERO no me dejas usar el contraejemplo completo (4 horas y media delante de una pizarra), y como muchos antes, me pides que te explique el fallo de la demostración, que es, **PRECISAMENTE**, el contraejemplo (entre otros, pero que tampoco sirve de nada decírtelos si no ves como falla el teorema con tus propios ojos).

3) El contraejemplo SÉ que lo tengo más que doblemente chequeado. La explicación del fallo no. No paro de pedir ayuda y no la consigo, a pesar de los resultados que ofrezco. VOY A INTENTAR crearte una 'analogía' más sencilla y rápida del caso real, PERO RECUERDA, el fallo en la lógica de la demostración, y el contraejemplo, están relacionados, **PERO NO SON LO MISMO**. Puedo construirte relaciones, pero igual meto la pata en terminología de lógica.

Te pido que no olvides que me dejo mogollón de cosas en el tintero. La TPI tiene mogollón de propiedades, pero no te las voy a decir porque el documento donde me explayé tiene 60 páginas. A Don Pepe Mendez, tardé hora y media delante de una pizarra en explicársela:

<https://vixra.org/abs/2209.0120>

No me hagas lo que me hizo una persona anteriormente. Primero alucinó con que se pudiesen construir.

Luego vino a los dos días y me dijo: mira, puedo construir una entre \mathbb{Q} y \mathbb{R} , y como sabemos que ambos tienen cardinal diferente, es irrelevante que existan las TPIs... Lo primero es que YO acepto que se puedan aplicar a \mathbb{Q} y \mathbb{R} , ya que tienen el mismo cardinal y es una técnica que nace con intención de generalidad. Básicamente me dice que puede replicar mis resultados y que eso está mal :D. SEGUNDO, no sé si lo has visto pero eso es un argumento circular. Usa el Teorema, para negar un contraejemplo del teorema, para evitar juzgar las repercusiones y las propiedades de las TPIs... por eso te digo que la gente 'cortocircuita'. Si pudiésemos usar un teorema, para negar cualquier contraejemplo, sin más argumentos, se podría demostrar cualquier cosa, pues siempre te puedo decir que lo tuyo es irrelevante ya que el Teorema es cierto.

Te puedo decir que soy el hombre más guapo del mundo. Th :D. Y tú me puedes enseñar una foto de Brad Pitt. Así que te respondo: ¿Sabes qué, como ya sabemos que soy el hombre más guapo del mundo, ni siquiera le vamos a enseñar esa foto a mi novia, y la vamos a quemar, okey?

Vamos con la analogía rápida de un caso más sencillo que el real.

C.- 6

Analogía rápida del fallo lógico de las demostraciones

6.1. La Tabla

$O_o!!$	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
A	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
1	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$	$\{1\}$
2	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2\}$	$\{2\}$
3	$\{3\}$	$\{3\}$	$\{3\}$	$\{3\}$	$\{3\}$
4	\emptyset	$\{4\}$	$\{5, 6\}$	$\{4, 5, 6\}$	$b = \{a \in A a \notin R_5(a)\}$
5	$\{6\}$	$\{6\}$	$\{6\}$	$\{6\}$	$\{6\}$
6	$\{5\}$	$\{5\}$	$\{5\}$	$\{5\}$	$\{5\}$

6.2. Explicación de la tabla

La tabla representa un 'asedio' a una paradoja híbrida, muy simple. Son cinco relaciones¹. De R_1 a R_5 son relaciones entre A , que tiene cardinal 6, y conjuntos de subconjuntos de A , los B_i , con cardinal 6, también. Cada columna, después de la doble línea, representa los elementos de cada conjunto. La tabla indica que el elemento del conjunto B_i , está relacionado mediante R_i , con el elemento de A que está en la misma fila.

No sé por qué la gente reacciona airadamente al ver este ejemplo, pero necesito que sea simple para que se vea muy claro varias cosas. Sé de sobras que los conjuntos implicados sólo tienen cardinal 6, y que no son \mathbb{N} ni $P(\mathbb{N})$. Te dije que sería una analogía con un caso más simple.

Podríamos demostrar que R_5 NO es sobreyectiva, si 'confiamos' en la técnica de Cantor. Al crear el par $(4, b)$ en R_5 creamos la doble contradicción que es núcleo de su demostración (junto con la definición de 'b'). Y a la misma vez, sabemos, gracias a que es muy simple el ejemplo, que A y B_5 tienen el mismo cardinal. Finito, pero el mismo cardinal.

¹RARAMENTE voy a usar la palabra 'función', primero porque es correcto llamarlas también relaciones, antes de ser función debes ser relación. Segundo porque mi trabajo se basa en relaciones que NO son aplicación (recuerda, todo está chequeado, lo hago de forma correcta hasta los puntos débiles que te mencioné en el documento de tres páginas): *Documento*

La demostración habla de 'cualquier relación/función posible entre A y $P(A)$ ', y aquí tenemos un caso EXTREMADAMENTE particular, donde la conclusión de la demostración, cojea. Okey, no son esos conjuntos, pero tienen el mismo cardinal, permiten definir 'b' y generar la doble contradicción.

No solo eso. Y esta es la parte del 'asedio'. B_5 es uno de los otros B_i por narices: o es B_1 , o B_2 , o B_3 , o B_4 . Ya que la definición de 'b' DEBERÍA coincidir con 'alguno' de los elementos que están en su misma fila, el resto de elementos son idénticos. Eso **SI** 'b' EXISTIESE y fuese un subconjunto de A . Esto implica que R_5 , en realidad, es una de las otras R_i ... que no generan dobles contradicciones y sí son biyectivas.

Fíjate lo curioso que es: al cambiar la definición del subconjunto hemos desactivado la doble contradicción, pero usando EL MISMO subconjunto. No pasa nada por crear los pares:

$(4, \emptyset)$,
 $(4, \{4\})$,
 $(4, \{5, 6\})$ y
 $(4, \{4, 5, 6\})$

Lo malo es que no sabemos exactamente CUAL de ellos es 'b', y a la misma vez, debe ser alguno de ellos. YO, no lo tengo claro, al menos :D. Pero gracias a que el ejemplo es tremendamente sencillo, sabemos con certeza que de R_1 a R_4 son todas relaciones, funciones, biyectivas.

¿Lo experimentas? Este es el sabor de boca que te deja un asedio para atacar una paradoja híbrida. Claro, en su versión light. Yo estuve sin dormir tres días... pero igual tú te libras. Otra gente se cabrea. O cortocircuita.

6.2.1. Punto 1

No sé como expresar esto de forma 'formal': las diagonalizaciones son IRRELEVANTES, pq se pueden construir sobre conjuntos con el mismo cardinal. Pero esa afirmación no me la he sacado de la manga, como me hicieron con la TPI, que SI busca poder crearse entre conjuntos con... 'el mismo cardinal infinito'. Con una simple observación de la tabla puedes coincidir conmigo: los elementos de cada conjunto se pueden contar a ojo, si hubiese dudas :D.

6.2.2. Punto 2

2) Me dirás que me queda la de \mathbb{N} vs \mathbb{R} (o cadenas binarias infinitas representando el conjunto de Cantor), que no me la has pedido. El Teorema 2 de tu lista:

$$|P(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$$

No contradice mis afirmaciones. Y este que te sugiero lo tengo analizado en estas dos horas de vídeos de youtube:

Lista de videos

TE ADVIERTO, mi material es caótico. Solo te lo pongo para que veas como 'tengo algo para eso'. He aprendido a ordenarlo un poco todo y lo estoy reescribiendo. Esos vídeos necesitan unos pequeños apaños. Es una rama no chequeada todavía. Se repiten montón de cosas porque hay que explicar las definiciones y propiedades comunes en cada rama, si empiezo de cero con alguien... Te vas a quedar a cuadros, pero básicamente puedo PREDECIR cualquier elemento externo, creado con cualquier técnica de diagonalización, CUALQUIERA, para cualquier intento de biyección POSIBLE entre \mathbb{N} y $P(\mathbb{N})$, con relaciones PREVIA-

MENTE establecidas. ¿Qué apaños? ¿Qué significa 'predecir'? ¿Cómo que uso más de una relación?... :D. Por eso sólo quiero decirte que "existe".

NOTA: perdona que me ponga quizás prepotente. Sé que hay más demostraciones... YO NO SOY matemático. UN SOLO contraejemplo las invalida TODAS. Mencionarlo es indigno de un matemático de carrera. Es mucho morro pedirme que arregle TODAS. YO SOLO. Ni siquiera las conozco. He visto alguna y 'creo' saber por dónde van los tiros del error... pero una vez más, no paro de pedir ayuda, y como no soy nadie... pues eso.

Salta aquí al punto 3, el resto de esta subsección solo lo escribo para dejar constancia. Necesitas mogollón de contexto para entender los apaños, aunque, por si los lees, trataré de explicarte 'algo'.

Añadido ignorable solo para dejar constancia

Este punto me está retrasando así que voy a ser muy informal con él (recuerda que es ignorable):

1) Simplemente que en los vídeos cuando dice "universo", a veces quiere decir r_{θ_k} . Sobre todo en las tablas de la flja_abstracta y cuando dice "resuelve".

2) Para comprender uno de los puntos de desescalado de \aleph_1 a \aleph_0 hay que mirar en el documento de la TPI QUÉ son las Familias de parejas de D-pares (que se crean clasificándolos por su valor γ).

3) Pensar que las relaciones en paralelo PREDEFINIDAS son lo mismo que intentar una biyección, montar un elemento externo y luego crear otra relación que añada ese nuevo elemento externo.. y así sucesivamente, es de una vagancia intelectual brutal. No sólo están PREDEFINIDAS, hace años... sino que al tener cada una un pedacito de LCF_{2p} diferente y disjuntos con los demás pedacitos... es el buscador QUIEN DEBE ahora encontrar un elemento externo a TODAS las relaciones, no solo a algunas relaciones. Y AHORA SI, se entiende el juego del vídeo, pues NO EXISTE un elemento externo que no esté cubierto por el sistema de relaciones r_{θ_k} . Sería una vergüenza, QUE SUCEDE, no poder encontrar un elemento externo que no pueda escapar de un sistema de subconjuntos con cardinal $\aleph_0 \times \aleph_0$. Y al ser paralelas, existir todas al mismo tiempo, y tener conjuntos Imagen disjuntos, podemos disponer de ellas como queramos "en paralelo". De ahí lo de poder asignar varios Packs. También los podemos seleccionar porque el elemento externo debe serlo A TODO el sistema... ya que es una mera partición de un conjunto con cardinal \aleph_0 . Como debe ser EXTERNO A TODO, puedo escoger a capricho las relaciones INAMOVIBLES y PREDEFINIDAS que más me gusten. Es como... una red que atrapa al elemento externo y no le deja escapar... solo que en "multiversos". NO ESCAPAR en uno solo... lo convierte en un caso predecido previamente, incluso antes de que se te ocurriese empezar a crearlo. Uses la técnica que uses. En el vídeo me permito predecir dos técnicas diferentes a la vez, porque en realidad me da igual como se crean... si un SNEI existe, tiene un valor γ con ABSOLUTAMENTE todos los demás SNEIs. YA ESO, desactiva todas las demostraciones de Cantor y sus técnicas y me permite predecirlo, como demuestro en el juego de los vídeos Y NADIE me ha dicho que sea incorrecto. Incluso hay gente que le ha sorprendido el resultado... pero... acaban confundiendo el caso de ir cambiando la definición completa de la relación para adaptarse al elemento externo... con la opción de tener un sistema PREDEFINIDO de relaciones que no alteran el cardinal del conjunto y que predicen TODOS los elementos externos. Cuando digo TODOS es TODOS. Solo por existir, ya se puede predecir... gracias a su propiedad γ . Al nacer, está condenado al fracaso :D. Si NO existe, no debo preocuparme por él. Si NO EXISTE, no es un SNEI jajajaja, me da igual que no tenga propiedad γ .

Lo malo de los escritos es que me llevan mucho tiempo. Perdona. Me quedan largos porque me cuesta explicarme de forma concisa y no puedo verte la cara para ver si es suficiente con lo que he dicho o no. Por ejemplo, lo siguiente, lo diría o no dependiendo de tu cara. Esto lo estoy escribiendo al final, recuerdo haberlo escrito, así que no te extrañe que lo haya escrito dos veces y esté repetido en alguna parte del documento.

Imagina las batallas cardinales, como batallas que se ganan por número de soldados. Y las estrategias son relaciones (funciones o no). Un soldado cuando mata a otro, el también desaparece. El Naive CA theorem busca relaciones 1:X. El elemento del dominio tiene varios candidatos que le pueden hacer desaparecer, pero los soldados del conjunto Imagen solo tienen un candidato cada uno, desde su punto de vista.

Ahora imagina que defiendes una ciudad. El ejército enemigo debe cruzar unas montañas, que tienen diferentes pasos de montaña posibles. Como no quieres que lleguen a los muros de tu ciudad, divides tu ejército en divisiones, y mandas a cada una a defender cada paso. Deseas librar la batalla lejos de tu ciudad. “Pueden haber” varias batallas diferentes, cada una con su estrategia; cada una con su relación; cada una con su r_{θ_k} ... Todo depende del paso de montaña que escoja el enemigo. Da igual si la que sucede de verdad, la pierdes o la ganas: lo importante aquí es que hacer divisiones de tu ejército y plantear una estrategia diferente para cada división, no es hacer trampas con el cardinal de tu ejército. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Por ESO, el sistema de relaciones es diferente a ir cambiando la relación según te van creando un elemento externo nuevo cada vez.

Ahora imagina, que en vez de tener el escenario de varios pasos de montaña, el enemigo está enfrente de las puertas de tu ciudad, y sacas a tu ejército a pelear. No quieres que la batalla sea dentro. AHORA, puedes crear divisiones, o mejor dicho en este escenario, “líneas de defensa”. YA hemos dicho que es legal crear divisiones, lo único que hacemos es usar TODAS las divisiones a la vez. SI EL ENEMIGO, quiere decir que te ha derrotado, DEBE derrotar TODAS tus divisiones. Se supone que tus divisiones son una partición de tu ejército original. Si quiere poder decir que ha derrotado a TODO tu ejército, debe poder derrotar a TODAS tus líneas de defensa.. A TODAS, sin dejarse ni una.

Y aquí tenemos OTRA FORMA en la que falla la diagonalización. Aparte de la tabla inicial de este documento que deja al descubierto la paradoja híbrida. Si vieses esas dos horas de vídeos... aparte de no necesitar que te explique el contexto de los dos juegos, pq ya conocerías el contexto que tienen en común... descubrirás una forma de PREDECIR todos los elementos externos. TODOS, para TODO posible intento de biyección. Pero no tenemos UNA biyección, tenemos un sistema de relaciones no aplicación PREVIAMENTE DEFINIDAS (las r_{θ_k}). Y da igual COMO intentes crear CUALQUIER elemento externo... ninguno sobrevive a todas las filas de defensa... :D. En el último vídeo se explica que Packs son los que derrotan a cualquier elemento externo, para cualquier intento de biyección. PUEDO ELEGIR, pq me he molestado PREVIAMENTE en tener MÁS DE UNA OPCIÓN de relación.

El juego de intentar definir una biyección, crear un elemento externo, volver a crear otra que lo añada, crear otro elemento externo, crear OTRA biyección... en nuestro escenario sería el equivalente a tener UNA SOLA línea de defensa: una sola relación. Y cada vez que nos derrotan, un nigromante resucita a todo nuestro ejército, solo para volver a ser derrotado. Una y otra vez. Y encima es adaptativo, no predictivo... vamos definiendo cada nueva relación, según nos van proponiendo nuevos elementos externos no cubiertos. Mi técnica usa relaciones, tan previamente definidas... que no les he cambiado una sola coma desde hace años. :D... ni la cambiaré, como explico en el vídeo, para cualquier elemento externo que se te ocurra mencionar. Si la biyección que intentaste tenía el formato:

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow P(\mathbb{N}) \text{ (O } LCF_{2p} \text{ vs SNEIs)}$$

Y llamamos a cualquier elemento que se te ocurra crear X.

Para la unión del conjunto Imagen de esa biyección, UNIÓN, X, mi sistema de relaciones ofrecen Packs disjuntos de números naturales de cardinal infinito... PARA TODOS LOS MIEMBROS DE ESA UNIÓN, incluido X... incluso antes de saber que X ibas a crear. INCLUSO, si alguien decide crear OTRA biyección que añada X, y crear a su vez, un nuevo elemento externo, mi sistema TAMBIÉN lo predice.

RESUMEN: los elementos externos son PREDECIBLES solo con \aleph_0 elementos. Solo hay que saber jugar nuestras cartas MEJOR que como se les ha ocurrido a otra gente antes. RECUERDA... usar relaciones no aplicación va en contra de la definición de cardinalidad... pero ESPERO que estuvieses de acuerdo con las propiedades de las batallas cardinales y sobre la legalidad de crear divisiones y tener más de una opción de batalla. PARA COMPRENDER POR QUÉ se pueden asignar Packs disjuntos, sin conocer X previamente, necesitas ver las dos horas de vídeo. De todas formas... entra dentro de las 4 horas de exposición de los dos juegos. No explicar la predicción... sino las condiciones que lo permiten. Pq permiten también crear los dos juegos.

6.2.3. Punto 3

Ya sé, ya sé... el ejemplo es demasiado sencillo. PERO, si ya se da en UN caso ¿Sucederá en más? Y la gracia es que sucede para \mathbb{N} vs $P(\mathbb{N})$.

En este ejemplo se vé fácil porque los conjuntos son muy sencillos. El asedio sólo consiste en crear todas las alternativas posibles a la función característica de 'b', con descripciones que solo listan directamente los elementos. Cambiamos su función característica, SIN CAMBIAR el subconjunto final: 'alguna de ellas' es una función característica² equivalente a la de 'b'. Las dos generan el mismo subconjunto de A. Si existiese de verdad.

En el caso real, no solo vamos a cambiar TODAS las funciones características de TODOS los elementos de $P(\mathbb{N})$. Vamos a crear alternativas al concepto de "función" (relaciones no aplicación que van a ser "útiles"); al concepto de inyectividad o biyectividad para comparar cardinalidades infinitas; vamos a poner en duda la definición de "cardinalidad"... e incluso puede que algún axioma ZF... vamos a "intuir" que existen fenómenos lógicos nuevos (las Paradojas Híbridas³). Y lo que no me esperaba, vamos a expandir el asedio a dos técnicas diferentes. Cuando presento la TPI, para negarla, me GARANTIZAN justo el punto que me faltaba de la DI, y para negar la DI, me GARANTIZAN justo el punto que me faltaba en la TPI. ¿Cuál de las dos es la correcta? ASEDIO!! Jajajaja. Las dos dependen de interpretaciones complementarias del mismo tipo de intersecciones infinitas... para cada posible interpretación, tengo una construcción de "equivalente" a una relación inyectiva imposible según Cantor. Aunque no sepa decirte cuál es la interpretación correcta de las dos.

¿Se pueden construir diagonalizaciones? Sí, pero si no me das 4 horas y media, me niegas el contraejemplo, me niegas el poder enseñarte el equivalente a poder ver que todos los conjuntos implicados SIEMPRE han tenido cardinal 6 (en el ejemplo de la tabla).

No nos podemos saltar el orden. Para que entiendas el fallo de las demostraciones, necesito enseñarte el contraejemplo primero. Esa es mi serpiente que se muerde la cola. Todo el mundo me insiste en que si el

²Espero no equivocarme. La función que dice si un elemento pertenece o no al conjunto

³Una P.H. es un absurdo metido con calzador, que es un absurdo en sí mismo, al ser paradoja, que en realidad no está relacionado con la frase original de la demostración. Para pequeña muestra, un pequeño botón... R_5 debería ser biyectiva, a pesar de la doble contradicción que podemos generar gracias a la definición de 'b'. Se llaman híbridas, pq tienen muchos estados diferentes, según la relación de la que dependen, es un buen subconjunto, o se convierte en paradoja... y nos permite decir que hemos llegado a un absurdo, cuando lo único que hemos hecho es añadir una paradoja por la cara en mitad de la demostración.

contraejemplo existe, les indique el fallo de las demostraciones. Y eso es imposible, al menos para mí. NECESITO el contraejemplo. Debes entender que las diagonalizaciones son irrelevantes y que petan de muchas maneras diferentes si las estudias a fondo.

Aquí ya me meto droga dura en vena: no me hagas mucho caso :D. Una paradoja híbrida no es una función característica válida de un subconjunto, no es un Teorema, y no es un programa (Cantor, Gödel, Turing...). Por eso hay que cambiar un axioma de ZF, para añadir de alguna manera la coletilla de que no puede crearse un subconjunto con una paradoja híbrida. Hay que estudiarlas a fondo, para mejorar su detección y definición, por si también afectan a los teoremas de Gödel, Turing... y alguno de Teoría de Lenguajes Formales. O por si hay más casos...

C.- 7

Intento de Contexto Previo Mínimo

7.1. Relaciones no aplicación

Tanto la TPI como la DI, están basadas en relaciones que no son aplicación: la flja_abstracta y las diferentes r_{θ_k} . En realidad son lo mismo. TODAS son en el sentido:

$r : P(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$

** Sí, invierto el orden común... y te estoy mintiendo un poco... para ir rápido... en realidad son “subconjuntos transformados” de ellos dos, con sus mismos cardinales, pero esa es otra historia... Me pides cosas concretas, que no siguen el orden natural de exposición, y eso me obliga a saltarme cosas... y adaptarlas para tí y esta carta. En su debido momento deberías autorizar dichas transformaciones, pero ya lo han hecho otros antes que tú. Son correctas. Debes creerme :D, hasta que tengas tiempo de verlo por tí mismo.*

Llamemos:

R-pares: a los pares de las relaciones. (elemento de $P(\mathbb{N})$, elemento de \mathbb{N}).

D-pares: a pares creados con elementos del Dominio, o sea $P(\mathbb{N})$. (elemento de $P(\mathbb{N})$, elemento de $P(\mathbb{N})$).

No voy a definirme en este documento la flja_abstracta, pero es una relación; un conjunto de pares; R-pares. Como conjunto, se le puede hacer una partición. Una partición muy particular, que a parte de otras propiedades, tiene la de generar TODAS las relaciones r_{θ_k} . Cada r_{θ_k} es un subconjunto de la flja_abstracta, disjunta con el resto de relaciones r_{θ_k} . No tienen R-pares en común entre ellas. Y me tengo que morder la lengua aquí... para no abrir demasiados melones. La DI real, aplicada, usará la flja_abstracta, y la TPI, real, aplicada, usará las diferentes relaciones r_{θ_k} sin hacer trampas con el cardinal de \mathbb{N} (otra cosa es que haga “trampas” dentro de cada r_{θ_k}). En realidad solo estaremos hablando de una redistribución de R-pares :D.

Como las relaciones no van a ser aplicación, van a haber elementos del Dominio con más de una imagen. No vamos a crear los pares así:

(SUBCONJUNTO_i, { n_0, n_1, \dots, n_j })

Sino así:

(SUBCONJUNTO_i, n_0)

(SUBCONJUNTO_i, n_1)

...

(SUBCONJUNTO_i, n_j)

Todos los elementos del Dominio ($P(\mathbb{N})$), en TODAS las relaciones, van a existir en al menos UN R-par.

Vamos, que van a tener imagen, aunque haya que repetir el uso de algunos elementos de \mathbb{N} .

Sí, keep calm, van a haber D-pares que usan el mismo $n \in \mathbb{N}$, para ambos miembros del D-par, en algunos R-pares de esa relación. A eso lo llamaremos una 'repetición'.

Curiosamente, llamáis igual al conjunto Imagen de cada elemento del Dominio, y al conjunto Imagen de la relación (que hay varias, ojo, :D). El conjunto Imagen de un elemento del Dominio, estará formado, una vez estudiados TODOS los R-pares de esa relación, por todos los $n \in \mathbb{N}$, que aparezcan con él, en algún R-par.

Un 'PACK' de un elemento del Dominio, según una relación r , es un subconjunto, propio o impropio, de su conjunto Imagen. No solo les cambio el nombre para diferenciarlos, sino porque pueden tener incluso diferentes cardinales para cada elemento.

7.2. NAIVE CA theorem, sin demostración

1) Si podemos construir una relación

$$r : A \rightarrow B$$

Siendo A y B conjuntos con cualquier cardinalidad, finita o infinita.

2) Donde para cada elemento de A , en base a los R-pares de r :

2a) Podemos crear un PACK con cardinal mayor que 0, distinto de vacío.

2b) Siempre mantengamos el mismo PACK para el mismo elemento del Dominio.

2c) Todos los PACKs creados, para todos los elementos de A , sean disjuntos entre sí.

3) ENTONCES: Podemos afirmar que $|A| \not\leq |B|$

7.2.1. Apreciaciones

I) Ojo al dato: tu estás acostumbrado a buscar igualdad, yo me voy a obsesionar con demostrar que el cardinal de uno, NO es mayor que el cardinal del otro, por cualquier herramienta posible. Si no existe, me la invento :D... previo acuerdo de que la herramienta sea "legal" matemáticamente. Ya sabemos que $|\mathbb{N}|$ no "es mayor" que $|P(\mathbb{N})|$. Demostrarlo a la inversa es una versión cutre, pero efectiva, del teorema Cantor-Bernstein-Schröder. Decir "NO es mayor" deja una puerta abierta a la igualdad. Una de mis anécdotas es explicarle esto a un matemático... que corrió demasiado al suponer. Ya no recuerdo quién fue, me dijo: "Eso está mal, porque pueden ser iguales". El gatillo del "eso está mal" lo tienen muy sensible. No me molesta, si se me permite responder, y mientras la gente no se ofenda porque les corrija alguien como yo.

II) Otra forma de verlo, es pensar en conseguir que todos los D-pares, tengan PACKs disjuntos en la relación r . Pero siempre eligiendo el mismo PACK, para el mismo elemento del Dominio, da igual en que D-par aparezca. Eso nos lleva a una similitud con la definición de inyectividad:

Dada $f : A \rightarrow B$

Y

$f(a_1) = f(a_2) \leftrightarrow a_1 = a_2$, para cualesquiera $a_1, a_2 \in A$
Entonces f es inyectiva.

Esta definición nos obliga, de forma indirecta, a estudiar TODOS los D-pares de f . Al igual que el NAIVE CA Theorem, nos obliga a estudiar TODOS los D-pares, de r . Vamos a estudiar Dominio X Dominio. Te vas a hartar de escuchar la palabra 'par'. Por eso tengo que llamarlos de forma diferente.

III) Cuando todos los PACKs, tienen cardinal 1, es un caso particular del NAIVE CA Theorem, que es una definición alternativa a la inyectividad. YA que la relación se vuelve función (solo hay una imagen por elemento del Dominio), y solo cambiamos decir 'imagen diferente' por 'imagen disjunta':D.

El NAIVE CA Theorem es una generalización de la inyectividad para relaciones que no son aplicación. La inyectividad es un caso particular del NAIVE CA Theorem. PERO, rigurosamente hablando, el NAIVE CA Theorem no encaja en la definición de biyección. No siempre.

IV) Por favor, es una tontería, pero recuerda:

$\{7, 23, 5027\}$ y $\{8, 23, 5028\}$

Son diferentes, pero NO disjuntos... no vamos a permitir ni un solo elemento en común entre los PACKs. Es esencial recordar que no vamos a buscar imágenes (PACKs), diferentes, sino DISJUNTAS. Esto viene por si caes en la trampa mental de creer que las relaciones son en realidad entre $P(\mathbb{N})$ y $P(\mathbb{N})$. Si los PACKs son disjuntos... por mucho que cada uno sea subconjunto de \mathbb{N} , todos juntos forman una partición de algún subconjunto de \mathbb{N} . Cosa que no se puede asegurar si solo fuesen 'diferentes'.

7.3. Definición de 'resolver'

Decimos que una relación r , RESUELVE un D-par, si es capaz de generar PACKs disjuntos para los miembros de ese D-par concreto. Usando siempre, el mismo PACK, para el mismo elemento del Dominio, a la hora de estudiar TODOS los D-pares. Sin cambiarle un solo elemento. Ni de más, ni de menos.

Si el mismo elemento del Dominio, lo observamos en otro D-par... puede que ya no sean disjuntos los PACKs, pq el PACK del nuevo elemento no lo es con el de este.

RESOLVER, no es una propiedad de elementos aislados, sino de D-pares aislados... un mismo elemento puede estar en otro D-par, y ese D-par no estar resuelto por la relación r . No hay problema, el anterior D-par sigue siendo considerado como resuelto. POR ESO insistiré... nuestro espectro, no van a ser elementos del Dominio, sino de Dominio X Dominio.

Lo idea de cambiar de espectro no es cosa mia, sino de Cantor. La definición de inyectividad te lleva a pensar en ello.

Como penúltima cosa a recordar y precisar. Si dos PACKs, de un D-par concreto, tuviesen tres trillones de

elementos cada uno, y SOLO, un elemento en común, no contaría como D-par resuelto por la relación r , sino como 'repetición'.

Si en un D-par, resulta que ambos elementos del Dominio, son el mismo elemento, aunque sus PACKs no sean disjuntos, se considera resuelto. No necesito que sean disjuntos los PACKs si están asignados al mismo elemento.

C.- 8

DI, TPI, y el fenómeno actual que me está sucediendo

Ambas, la DI y la TPI, son “juegos cardinales”. La DI es más vieja y es menos “rigurosa” en su exposición. Las dos parten del supuesto, que si el conjunto que hace el papel de Dominio, es ABSURDAMENTE mucho mayor que el otro, si su diferencia cardinal es INCONMENSURABLE, $\therefore D$, no deberían poder construirse con éxito. Y si se construyen con éxito, ambas implican que el cardinal del Dominio, NO es mayor que el cardinal del otro conjunto (que no tiene por qué ser el conjunto Imagen, ojo). Lo cual implica que pueden ser iguales.

8.1. DI:variante pelea de colegio


DI significa Diagonalización Inversa. Busca un fenómeno similar a la diagonalización, invirtiendo los papeles conocidos de las cardinalidades \aleph_1 y \aleph_0 . Da igual que barras todas las opciones disponibles para el Dominio (\aleph_1), NUNCA podrá “cubrir” todos los elementos del conjunto con cardinalidad \aleph_0 .

Consiste en que dos alumnos de un colegio se quieren pelear, comparando la cantidad de amigos que cada uno puede aportar a la pelea. Los amigos de Domenicus (Dominio: D) y los amigos de Luciferio¹ (Imagen: I). Domenicus le ha dicho a Luciferio que las paradojas híbridas no existen, y no le deja a Luciferio reproducir el experimento que así lo demuestra². Antes de que esta afrenta al honor acabe en un baño de sangre, Luciferio le dice a Domenicus que más le vale rendirse ya que tiene amigos suficientes como para estar en una proporción 2 a 1 o superior.

Domenicus no se fía de Luciferio, tiene fama de tramposo, así que le exige una lista detallada que diga, exactamente, que amigos suyos se van a pelear con cada uno de sus amigos. Así que Luciferio le entrega este esquema (Empecemos por un caso finito, para entender el juego):


¹Lucifer: portador de Luz, Luz \rightarrow Imagen $\therefore D$.

²Déjame descargar frustración en alguna parte...



Como en este colegio son gente muy rara, los amigos de Domenicus tienen nombre de letra, y los de Luciferio tienen nombre de número natural. Vemos que cada amigo de Domenicus(D) tiene un “Pack” de amigos de Luciferio(I) asignados. El cardinal de esos Packs es de 2... así que aparentemente Luciferio no mentía con su amenaza.


Después de observar un rato, Domenicus se da cuenta que Luciferio ha hecho trampas: ha puesto a su amigo “0”, dentro del Pack de dos de sus amigos: A y B. Se queja a Luciferio, y este le dice: “¿Sabes qué, quita a 0 de la pelea, lo retiro, y si encuentras más repeticiones de uso, también los retiraré de la pelea”. Domenicus luego se fija en que 0 también está dentro del Pack de C. Luciferio le dice que cuando apartas a uno de sus amigos de la pelea, eso significa quitarlo de TODOS los Packs donde pudiese estar. Así lo hacen y el esquema queda así:




Domenicus, que es conocedor de técnicas secretas y avanzadas en teoría de conjuntos, sigue buscando par por par, para ver si Luciferio ha hecho más trampas o si efectivamente, después de descartar a 0, los Packs

nuevos creados a partir del primer esquema (la relación no aplicación original), cumplen las condiciones del Naive CA Theorem.


Domenicus pregunta por el actual estado de los D-pares (E,D), (D,C), (E,A)... (A,B). Los nuevos Packs de (A,B) son más pequeños que los originales, pero ahora son disjuntos, así que este D-par no da más problemas. Y cuando se empieza a desesperar, Domenicus encuentra el D-par (B,C). Tienen el 4 repetido. Siguiendo el acuerdo con Luciferio, 4 se retira de la pelea y lo “retiran” de todos los Packs donde pudiese estar:



Ahora, B y C, tienen Packs asignados completamente vacíos. Domenicus se ríe de Luciferio: “No solo mentiste con la proporción 2 a 1, sino que ni siquiera cumples el Naive CA theorem!!”. Luciferio se enfada mucho, llama a más amigos e intenta otra distribución nueva:



Rápidamente Domenico se fija en el D-par (E, D) que repiten el uso del colega 9. Lo apartan y los Packs quedan así:



Después de este movimiento, Domenico busca con desesperación otros D-pares con Packs que no sean disjuntos pero ya no encuentra ninguno. La nueva distribución cumple las condiciones del Naive Ca Theorem. Luciferio no cumplió su amenaza totalmente de conseguir una proporción 2 a 1, pero donde no le iguala en número, le supera. Cumplir las condiciones del Naive Ca Theorem indica igualdad de elementos, o algo peor. Se sabe en inferioridad numérica, y aparte debe confiar en que Luciferio no use a sus amigos “apartados”. Lo cual empeora la inferioridad numérica.

8.1.1. Observaciones de la DI

Partimos de una relación original, posiblemente que no sea aplicación, que está PREDEFINIDA antes de comenzar el juego y que define un conjunto Imagen para cada elemento del Dominio. A partir de ellos, tratamos de “escoger” Packs disjuntos, estables, para conseguir cumplir las condiciones del Naive CA Theorem.

Nuestros Packs, comienzan siendo el conjunto Imagen de cada elemento. Según otra persona cualquiera, va escogiendo elementos aleatorios del conjunto Dominio X Dominio, vamos “recortando”³ los Packs, eliminando los elementos, no solo de dentro de ellos, sino de cualquier lugar en el que aparezcan en la relación.

No siempre, al preguntar por un D-par, nos obligará a recortar los Packs. A veces, según el orden por el que se pregunte por los D-pares, al preguntar por un D-par concreto, ya habremos eliminado los elementos que impedían a sus Packs ser disjuntos... así que recortar los Packs depende INCLUSO del orden en que recorramos los D-pares.

Si después de haber preguntado por TODOS los D-pares, ninguno de los Packs es vacío, y tienen al menos, un solo elemento, hemos ganado el juego. Cumplimos las condiciones del Naive Ca Theorem:

- 1) Hay un Pack por cada elemento del Dominio.
- 2) Cada Pack es No vacío.

³A esto lo llamamos en inglés el proceso de “chopping”

3) Todos los Packs son disjuntos entre sí (pq hemos recorrido todos los D-pares y hemos eliminado los elementos que lo impedían).
 PODEMOS afirmar que $|Dominio| \not\approx |Imagen|$.

Nuestro “conjunto especial” no es uno, sino varios. Son los conjuntos que nos permiten medir el éxito de nuestra labor de forma objetiva. Son los Packs, actuando y sufriendo el “chopping” en paralelo. CONSEGUIMOS construir la DI, si algún elemento sobrevive al proceso de “chopping”. SI NUESTROS CONJUNTOS NO SE VACÍAN. Solo nos hace falta un único elemento, solo uno, por cada Pack (o más). A la misma vez, da igual el éxito del resto, solo un Pack vacío indicará nuestro fracaso. No podremos afirmar nada con seguridad.

El proceso de chopping, se puede definir como una intersección, por cada Pack. Una intersección diferente por cada Pack. Una intersección entre todos los sub-estados de ese Pack. Si el Pack fuese el conjunto P , y sus sub-estados, subconjuntos de P llamados P_i , se cumpliría:

$$P_{i+1} \subset P_i$$

El siguiente estado, en caso de haber un recorte, es el mismo conjunto anterior, pero al que le hemos quitado algunos elementos.

La intersección para cada Pack sería algo así como:

$$P_0 \cap P_1 \cap P_2 \cap P_3 \cap \dots \cap P_{final} = ?$$

Como los conjuntos infinitos hacen sus locuras, el ÚNICO punto débil de la DI va a ser la interpretación de dichas intersecciones: ¿Si la intersección da un resultado de vacío podemos afirmar que los Packs se vacían? Y esto que parece una pregunta sencilla aparentemente, hay matemáticos que dicen que aunque el resultado sea vacío, no indica “siempre” que los Packs se vacían. Otros dicen que ES OBVIO, que si la intersección tiene un resultado INNEGABLE de vacío, indica que los Packs se han vaciado.

La intersección es necesaria porque un proceso secuencial infinito de chopping, NO TIENE FIN... no hay un P_{final} . Pero una intersección puede tener términos infinitos, que yo sepa, si estos tienen un cardinal \aleph_0 . Así que nos podemos preguntar por su resultado, y tratar de interpretarlo.

En el futuro de este documento y otros, veremos que el resultado de vacío es inamovible para la flja.abstracta en el caso $P(\mathbb{N})$ vs \mathbb{N} :

- a) Si escogemos la interpretación de que los Packs se vacían, El Teorema de Cantor sobrevivirá: nuestros Packs no han conseguido que algunos elementos sobrevivan dentro de ellos, al finalizar el proceso de chopping.
- b) NO PODEMOS escoger la opción de que no se vacían en este tipo de intersecciones... sin destruir el Teorema de Cantor. Eso significaría que nuestros Packs sobreviven, y se cumple el Naive CA Theorem. Recordemos que en la flja.abstracta, $P(\mathbb{N})$ es el Dominio, y \mathbb{N} es el conjunto Imagen.

En realidad el proceso de chopping, es mucho más bestia, vamos a apartar cantidades OBSCENAS.. pero no de números naturales, sino de miembros de LCF_{2p} , el equivalente transformado de (N) , y el otro conjunto será SNEIs, que será el equivalente transformado de $P(\mathbb{N})$, pero explicar eso requiere más tiempo y contexto.

8.2. TPI

TPI significa Transferencia de Pares Ilimitada... pero ¿Entre qué? ¿Qué pares?

8.2.1. Definiciones previas para entender la TPI

Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Sea $B_1 = \{a\}$

Si intentásemos crear una relación inyectiva entre ambos, usando A como conjunto Dominio y B_1 como conjunto Imagen, sería completamente imposible. Pero intentemos definir una posible candidata para explicar las medidas que vamos a presentar. **TODOS los elementos del Dominio deben tener imagen para que tengan sentido.** Los pares de la relación, los definiremos mediante elementos de cada conjunto unidos por flechas:

Llamemos a esta relación r_1

$0 \longrightarrow a$	$1 \longrightarrow a$	$2 \longrightarrow a$	$3 \longrightarrow a$	$4 \longrightarrow a$
$5 \longrightarrow a$	$6 \longrightarrow a$	$7 \longrightarrow a$	$8 \longrightarrow a$	$9 \longrightarrow a$

Nos podríamos preguntar cuántos pares de AXA , cumplen la definición de inyectividad en esa relación concreta. Cuántos RESUELVE ésta relación. “Resolver” es un concepto que ya conocemos.

$WSP(r_1)$: <Well Solved Pairs> es el subconjunto de elementos de AXA , que cumplen la definición de inyectividad, en ESA relación. O tienen Packs disjuntos.

$NWSP(r_1)$: <NOT Well Solved Pairs> es el subconjunto de elementos de AXA , que **NO** cumplen la definición de inyectividad, en ESA relación. O NO tienen Packs disjuntos.

Ambos conjuntos son complementarios respecto de AXA . WSP es el complementario de NWSP y viceversa. El mismo par, no puede estar en WSP y NWSP en la misma relación. O cumple la definición o no la cumple.

$QRE(r_1)$: <Quantity of Repeated Elements> es el cardinal de NWSP, en ESA relación.

A pesar de que la relación que hemos creado, es uno de los posibles ejemplos más desastrosos que pueden haber, la definición de inyectividad nos permite dar por válidos aquellos pares que están formados por el mismo elemento del Dominio. En esos casos, da igual que tengan la misma imagen en la relación, son pares correctos. Van en WSP. Lo mismo para el Naive CA Theorem. Es indiferente hablar de inyectividad que de Naive Ca Theorem... el segundo es incluso peor: se puede afirmar con mayor seguridad que $|D| \not\asymp |I|$.

$$WSP(r_1) = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), \dots, (8, 8), (9, 9)\}$$

En NWSP iría el resto de posibles pares. Entonces:

$$|WSP(r_1)| = 10$$

$$|NWSP(r_1)| = 90$$

*ya que el cardinal de AXA sería 100.

$$QRE(r_1) = 90. \text{ Nota}^4$$

Cuando $QRE = 0$, significa que el cardinal de NWSP es cero. Eso implica que es un conjunto vacío. O sea, que NO EXISTEN pares que INCUMPLAN la definición de inyectividad. O pares cuyos Packs NO SEAN disjuntos. Cuando $QRE = 0$, o $NWSP = \emptyset$, indica que es una relación inyectiva, perfecta. O que tenemos las condiciones del Naive CA theorem.

r_2 : 10 vs 2

Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Sea $B_2 = \{a, b\}$

$r_{2a} : A \longrightarrow B_2$

$0 \longrightarrow b$	$1 \longrightarrow b$	$2 \longrightarrow b$	$3 \longrightarrow b$	$4 \longrightarrow b$
$5 \longrightarrow b$	$6 \longrightarrow b$	$7 \longrightarrow b$	$8 \longrightarrow b$	$9 \longrightarrow b$

En esta relación hemos optado por ni siquiera usar todos los elementos del conjunto Imagen. Un auténtico desastre. Pero un desastre muy parecido al ejemplo de relación del punto anterior: r_1 . Es idéntica solo que cambiando la ‘a’ por la ‘b’. Las medidas son iguales:

$$|WSP(r_{2a})| = 10$$

$$|NWSP(r_{2a})| = 90$$

$$QRE(r_{2a}) = 90$$

$r_{2b} : A \longrightarrow B_2$

$0 \longrightarrow a$	$1 \longrightarrow b$	$2 \longrightarrow b$	$3 \longrightarrow b$	$4 \longrightarrow b$
$5 \longrightarrow b$	$6 \longrightarrow b$	$7 \longrightarrow b$	$8 \longrightarrow b$	$9 \longrightarrow b$

En este ejemplo ya hemos usado los dos elementos del conjunto Imagen, pero no nos hemos esforzado demasiado. Aún así, las medidas mejoran. Antes, el par $(0, 1)$ estaba en NWSP, y ahora está en WSP. Aparte de los 10 pares, que están formados por el mismo elemento, a WSP llegan los pares que contengan el 0, pues este está relacionado con un elemento único del conjunto Imagen. Nadie más está relacionado con ‘a’, solo el 0. A la hora de contar, conviene recordar que en AXA , los pares $(0, 1)$ y $(1, 0)$, por ejemplo, no son el mismo, aunque sepamos seguro que si uno cumple la definición de inyectividad, el otro también. En general, resolver el par (i, j) es lo mismo que resolver el par (j, i) . Las medidas quedan:

$$|WSP(r_{2b})| = 10 + (9 * 2) = 28$$

$$|NWSP(r_{2b})| = 72$$

$$QRE(r_{2b}) = 72$$

⁴Ahora uso está nueva nomenclatura de función. Antes usaba sub-índices. Por ejemplo: QRE_{r_1} . Es lo único que me gustó de alguien que me envió una reformulación formal de la TPI. Pq considero sus cambios INNECESARIOS, arbitrarios... y encima quitaba cosas esenciales por no haber esperado a tener una imagen más global. La aplicaba con errores a \mathbb{Q} vs \mathbb{R} , para luego decir que la TPI era irrelevante pq “ya sabíamos” que tienen diferente cardinal... Lo cual, encima, es un argumento circular. Me envió el documento como anónimo y no tuvo lo que hay que tener para poner su nombre, así que yo tampoco lo haré. pero reconozco que esta nomenclatura no es idea mia. Y que me gustó :D. Los cambios que hacía ROMPIÁN las similitudes con la DI.

$$r_2 : A \longrightarrow B_2$$

$0 \longrightarrow a$	$1 \longrightarrow a$	$2 \longrightarrow a$	$3 \longrightarrow a$	$4 \longrightarrow a$
$5 \longrightarrow b$	$6 \longrightarrow b$	$7 \longrightarrow b$	$8 \longrightarrow b$	$9 \longrightarrow b$

Aquí si me he esforzado más. No estoy seguro de que sea la mejor relación posible. Al crear esta, sabemos que, al menos, estas medidas son posibles:

$$|WSP(r_2)| = 10 + (5 * 5 * 2) = 60$$

$$|NWS(r_2)| = 40$$

$$QRE(r_2) = 40$$

Me gusta decir que QRE es una medida inestable, pero de tipo ‘record del mundo’: no se sabe si alguien la puede mejorar, pero una vez existe una, sabemos seguro que ese valor es posible. Y si con las relaciones que obtengamos, conseguimos resultados ‘suficientes’ para nuestros objetivos, que alguien más pueda encontrar otra relación con mejores medidas nos va a dar igual. Ya encontramos lo que necesitábamos. Para salvarte de un zombie no necesitas ser el corredor más rápido del mundo, solo ser más rápido que el más lento de tu grupo.

También podemos observar, como al tener más elementos disponibles en el conjunto Imagen, tenemos ‘potencial’ para mejorar las medidas. No es seguro que lo logremos. Depende de nuestra capacidad para crear las relaciones. Podemos usar muy mal los elementos del conjunto imagen, o muy bien.

Se intuye que debe existir un tope, a la cantidad de pares que podemos incluir en WSP, cuando el conjunto Imagen tiene un cardinal inferior, estrictamente, al del conjunto Dominio. Como es el caso aquí:

$$|B_2| = 2$$

$$|A| = 10$$

Por muy bien que lo hagamos, conseguir un QRE=0 para una relación del tipo

$$r : A \longrightarrow B_2$$

sería un absurdo!! Al mismo tiempo, que ese ‘tope’ no exista, sería un posible indicativo de que nos hemos equivocado al juzgar el cardinal del conjunto Imagen, por la causa que sea.

r_3 : 10 vs 5

Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Sea $B_3 = \{a, b, c, d, e\}$

Sea $r_3 : A \longrightarrow B_3$

$0 \longrightarrow a$	$1 \longrightarrow b$	$2 \longrightarrow c$	$3 \longrightarrow d$	$4 \longrightarrow e$
$5 \longrightarrow a$	$6 \longrightarrow b$	$7 \longrightarrow c$	$8 \longrightarrow d$	$9 \longrightarrow e$

Ahora resulta más fácil ver que pares caen en NWS :

$$NWS(r_3) = \{(0, 5), (5, 0), (1, 6), (6, 1), (2, 7), (7, 2), (3, 8), (8, 3), (4, 9), (9, 4)\}$$

$$|NWS(r_3)| = 10$$

Esto implica que, como son complementarios:

$$|WSP(r_3)| = 90$$

$$QRE(r_3) = 10$$

r_4 : **10 vs 9**

Sea $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Sea $B_4 = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$

Sea $r_4 : A \longrightarrow B_4$

$0 \longrightarrow a$	$1 \longrightarrow b$	$2 \longrightarrow c$	$3 \longrightarrow d$	$4 \longrightarrow e$
$5 \longrightarrow f$	$6 \longrightarrow g$	$7 \longrightarrow h$	$8 \longrightarrow i$	$9 \longrightarrow e$

Ahora solo hay dos pares que caen dentro de $NWSP$:

$$NWSP(r_4) = \{(4, 9), (9, 4)\}$$

$$|NWSP(r_4)| = 2$$

$$|WSP(r_4)| = 98$$

$$QRE(r_4) = 2$$

Sabemos que es el mejor caso posible, porque un $QRE = 0$ es imposible. Y no puedes resolver $(4, 9)$ sin resolver $(9, 4)$.

Observemos como según teníamos más elementos disponibles, nuestro valores QRE se acercaban a cero:

$$|B_1| = 1 \quad \rightsquigarrow \quad QRE(r_1) = 90$$

$$|B_2| = 2 \quad \rightsquigarrow \quad QRE(r_2) = 40$$

$$|B_3| = 5 \quad \rightsquigarrow \quad QRE(r_3) = 10$$

$$|B_4| = 9 \quad \rightsquigarrow \quad QRE(r_4) = 2$$

8.2.2. TPI, definición

Tenemos una TPI, para casos transfinitos, si entre los conjuntos D (Dominio) y O (Origen⁵):

1. Podemos crear una (Partición de O) = $\{O_1, O_2, O_3, \dots\}$

1b. El cardinal de la partición es \aleph_0 : tenemos \aleph_0 subconjuntos disjuntos de O .

2. Definimos un sistema de diferentes relaciones, usando D como conjunto Dominio en cada una de ellas, y los diferentes O_k , $k \in \mathbb{N}$, como conjuntos Imagen de cada relación.

2b. Cada relación, del sistema, recibirá el nombre de:

$r_{O_1}, r_{O_2}, r_{O_3}, r_{O_4}, \dots, r_{O_k}, \dots$

2c. Siendo r_{O_k} la relación que usa el subconjunto O_k como conjunto Imagen.

2d. Aunque sean infinitas, enumerables, debemos buscar la forma de definir TODAS las relaciones. Sin alterarlas posteriormente.

3. Para cualesquiera dos relaciones, r_{O_k} y $r_{O_{k+1}}$, $r_{O_{k+1}}$ DEBE ser una MEJORA SUSTANCIAL (MS), respecto de r_{O_k} . Esto significa dos cosas:

3a) $NWSP(r_{O_k}) \supset NWSP(r_{O_{k+1}})$

3b) $|NWSP(r_{O_k}) - NWSP(r_{O_{k+1}})| = |D|$

4.

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} NWSP(r_{O_k}) = \emptyset$$

5. ENTONCES podemos decir que el cardinal de D , NO ES MAYOR, que el cardinal de O .

8.2.3. Observaciones de la TPI

Como los sucesivos $NWSP(r_{O_k})$ son subconjuntos anidados de DXD , el siguiente tiene EXACTAMENTE, no la misma cantidad, sino las mismas entidades, MENOS, unos cuantos elementos. Esta diferencia debe ser, como regla arbitraria, por seguridad, y porque podemos hacerlo, igual al cardinal del dominio. Si vamos a “vaciar” un conjunto cuyo cardinal es el de DXD , en algún momento deberemos empezar a quitar cantidades iguales al cardinal de D , si queremos acabar alguna vez. La regla de que sean anidados viene para asegurarnos de no dejarnos ningún D -par particular. Una vez resuelto un par, permanece SIEMPRE resuelto durante TODO el proceso de la TPI. Pero éste no es secuencial, es paralelo. Todas las r_{O_k} deben ser definidas DE GOLPE, al mismo tiempo.

El resultado final de vacío, significa que NINGÚN D -par concreto sobrevive al infinito (y paralelo) proceso de chopping de $NWSP$. Para TODO D -par, a PARTIR de alguna r_{O_k} , dejará de aparecer en su conjunto $NWSP$. Habrá sido “transferido” a WSP . En la DI , el conjunto que nos marcaba el resultado de forma objetiva eran TODOS los Packs, aquí solo es uno, $NWSP$, que se va reduciendo y reduciendo, mientras WSP va alcanzando la totalidad de pares. PERO A LA INVERSA DE LA DI , aquí “ganamos” si conseguimos

⁵Origen de todos los subconjuntos que usaremos como Imagen en cada relación

“vaciar” NWSP. Ya que si NWSP se vacía, WSP es igual a DXD

Si \mathbb{N} , o LCF_{2p} , actuando como el conjunto O , tienen un cardinal ABSURDAMENTE más pequeño que $P(\mathbb{N})$, o $SNEIs$, actuando como D , da igual que lo intentemos una o infinitas veces. NUNCA deberíamos estar cerca de “resolver” todos los pares. DEBE existir un límite, un tope, que no podamos sobrepasar. Si la cantidad de miembros indica la cantidad de D-pares que podemos resolver de DXD , y en TODAS LAS RELACIONES, solo usamos subconjuntos de \mathbb{N} , EL TOPE MÁXIMO de D-pares dentro de WSP debe ser muy concreto, pues TODAS las relaciones están PREDEFINIDAS. Y tienen la propiedad de tener conjuntos WSP y NWSP anidados... la siguiente resuelve TODOS los D-pares de las anteriores y algunos más. No en cantidad: las mismas entidades, los mismos D-pares. Su crecimiento debe parar... si no lo hace... debemos empezar a considerar que nos hemos equivocado al juzgar el cardinal de O , si antes decíamos que era menor que D .

En vez de hablar de cardinal, hablamos de D-pares: sabiendo que resolverlos todos es tener, mínimo, el cardinal de D . El resultado final de vacío, mínimamente, nos indica una animación que parte de un “cardinal” difícil de definir, y acaba en el cardinal de D (resolver todos los D-pares). Pero en cada “fotograma” de la animación infinita usamos todo el rato subconjuntos de \mathbb{N} . Si lo niegas, al ser todas la relaciones PREDEFINIDAS, deberías poder mencionar un solo D-par, UNO SOLO, que sobrevive a todos los intentos de mejorar la relación. Pero el resultado de vacío te va a indicar que no existe, o aparecería en el resultado de la intersección infinita. RECORDEMOS que de los puntos 1 a 4, son CONDICIONES, que hay que ser capaz de construir para afirmar el 5 punto. Y vaya que si podremos construirlos!! (pero eso es otra historia).

Otra cosa a tener en cuenta. Lo que estamos haciendo con la TPI es una especie de función por partes, solo que el Dominio de las sub-funciones, sub-relaciones, es siempre el mismo: D . Da igual si hacemos más grande el cardinal de D ... la cuestión es que en cada subconjunto Imagen, de cada r_{O_k} , usamos un pedacito diferente de O ... lo cual no altera su cardinal. Pueden haber dudas con D , pero no con O . Y no hacemos D precisamente más pequeño al repetir su uso. No hacemos trampas con el cardinal de O : cada conjunto Imagen es un subconjunto diferente de una partición de O , y las repeticiones dentro de cada relación están controladas por el conjunto NWSP, por definición. La condición de vacío, mezclada con la 3, nos sirve para estar seguros que WSP no crece sin parar, hasta un punto, que en realidad está lejano de la totalidad de D-pares. O evitar que nos hayamos olvidado algún D-par, durante el proceso, por haber sido desordenados al transferirlos a WSP. Da igual que estemos hablando de $\aleph_1 X \aleph_1$.

Nos hayamos ante la misma problemática que en la DI:

¿Significa el resultado final de la intersección, de vacío, de todos los NWSP, que hemos vaciado NWSP? Solo que la respuesta que buscamos ahora, es totalmente inversa. Y este es el origen de todos los cortocircuitos.
:D.

8.3. Resultado increíble

Tanto la DI como la TPI están construidas, HACE AÑOS YA. Las dos en realidad son el mismo fenómeno matemático innegable. Solo uso esos juegos para darle una definición lo más precisa posible. Como son en realidad, el mismo fenómeno (un extraño empate entre *SNEIs* Y LCF_{2p}), ambas acaban en la misma situación: una intersección infinita de interpretación ambigua.

Las condiciones de ambas intersecciones son idénticas, solo que en la DI, le sucede A TODOS los Packs⁶, y en la TPI le sucede a NWSP. Sólo cambia el tamaño de los subconjuntos anidados. En la DI es \aleph_0 , y en la TPI es \aleph_1 :

1) Sea B una forma genérica de llamar a un Pack cualquiera, o a NWSP, vamos a tener una lista infinita, con \aleph_0 miembros, de subconjuntos de B:

$B_1, B_2, \dots, B_k, \dots$

2) $B_k \supset B_{k+1}$

3)

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \emptyset$$

4) Como ya dije:

4a) En la DI $\rightarrow |B_k| = \aleph_0$

4b) En la TPI $\rightarrow |B_k| = \aleph_1$

5) (OPCIONAL) Tanto en la DI como en la TPI, existen “Familias” de D-pares. Juntas forman una partición de $\text{Dominio} \times \text{Dominio}$. Y son también \aleph_0 subconjuntos disjuntos entre sí. Mientras en la TPI, la diferencia entre conjuntos NWSP es una Familia ENTERA cada vez... En la DI, al preguntar por un D-par, quitamos elementos de cada Pack, de una forma especial, consiguiendo que la Familia entera de ese D-par, y las anteriores, no tengan ni un solo Pack NO disjunto. O sea, cada D-par es un representante de una Familia, que es completamente eliminada del juego, por un motivo u otro. Eliminar (resolver) una Familia, significa eliminar a las anteriores. Hay \aleph_0 pasos en ambos casos, y \aleph_0 Familias de D-pares. Las “mejoras sustanciales” de la TPI, en la condición 3, son otra forma de describir lo que sucede en la DI y viceversa. No es diseño, es descripción. Lo que en la TPI llamamos O_k , son los universos θ_k . Una partición de LCF_{2p} . Y si, como se dice en la TPI, hay \aleph_0 universos... en la DI, de TODOS los posibles Packs... vamos apartando TODOS sus miembros que pertenecen a un universo K concreto (y los anteriores que todavía pululen por los Packs). Con eso conseguimos “resolver” una Familia entera, nueva, y sus anteriores. ESE es el poder de la *flja_abstracta*: los universos y las Familias de D-pares tiene una relación muy estrecha, pero en el sentido coloquial, no en el de relación matemática. :D. Pero esto hay que explicarlo con más detalle... si este punto te lía, ignóralo. Esto es la base de mi frase: “Con \aleph_0 elementos puedo deshacerme de \aleph_1 problemáticas”. Con cada universo, puedo resolver una Familia entera.

NADIE NIEGA QUE ESTO SUCEDE(puntos 1 a 4, también el 5... pero necesita tiempo para explicarse bien), la pregunta es: QUÉ significa eso??

Si en la DI interpretamos que el resultado INNEGABLE de vacío implica que se vacían los Packs. Bien,

⁶En paralelo a todos los \aleph_1 Packs, por como la construimos para el caso concreto. Eso permite fijarnos en un solo Pack. Le va a pasar algo similar, al resto, al mismo tiempo.

perfecto. El Teorema de Cantor sigue vivo. Pero eso significa que NWSP se vacía. Mismas condiciones, misma interpretación. Si niegas que NWSP se vacía, porque cada NWSP está lejos de ser vacío, y siempre tiene cardinal infinito... PASA LO MISMO EN LA DI... Cada estado de los Packs, SIEMPRE tiene cardinal infinito. Si no se vacía NWSP, no se vacían los Packs.

Para cada interpretación de una intersección infinita con esas condiciones, hay una construcción de un equivalente de una relación inyectiva IMPOSIBLE según el Teorema de Cantor. Da igual si no eres capaz de decidir cuál es la verdadera interpretación. ASEDIO!! :D. Hemos cubierto una serie de posibilidades, aunque no sabemos cual es la correcta de entre todas ellas. DA IGUAL, TODAS LO SON. Al igual que en el ejemplo sencillo de asedio, de la tabla de relaciones, del capítulo inicial, de R_1 a R_4 eran todas biyectivas.

Otra gracia, es que entre dos conjuntos con el mismo cardinal infinito es posible crear ambas construcciones. La verdadera contradicción surge de considerar que tienen cardinal transfinito diferente. Si tienen el mismo cardinal, es fácil conseguir una relación de mínimo 2 a 1 (DI), y aquí, aunque el documento es extenso, se explica como crear una TPI para dos conjuntos con cardinal \aleph_0 :
<https://vixra.org/abs/2209.0120>

No solo nos vale que una opción sea válida, o la otra. También nos vale que lo sean ambas. Un caso muy extraño sería que no significase ninguna de las dos: ni se vacía, ni NO se vacía. Cuesta hasta interpretarlo si no es una contradicción inaceptable por sí misma: o sea, da igual lo que interpretes, no tiene sentido ni enunciarlo. Podríamos verlo como el inverso de cuando ambas se cumplen. Pero es un problema, porque al negar y doble negar, vuelve a ser el caso que ambas se cumplen. De todas formas, si insistimos, si uno no tiene sentido, el otro tampoco debería tenerlo. Para cubrir esa duda, y como la TPI es mi favorita, podemos recordar una propiedad: en la TPI, los subconjuntos de O, crecen en cardinalidad, desde un estado inicial indeterminado, hasta el supuesto cardinal de D. En una animación PERFECTA con \aleph_0 fotogramas. Pero en vez de estudiarlo mediante su cardinal directo, lo estudiamos por su habilidad de resolver D-pares. Crece SIN TOPE. Por eso es tan problemático el resultado final de vacío: garantiza que no hay tope.

Es como la paradoja de la caja y las bolitas numeradas con los números naturales. En el primer paso, metemos los 10 primeros números naturales, pero luego sacamos solo el 1. En el segundo metemos los 10 siguientes, pero sacamos el dos. Vamos metiendo de diez en diez... pero sacamos las bolitas por orden numérico. En infinitos pasos. He leído discusiones al respecto. TODO el mundo opina sobre si se vacía la caja o no. O que es ambiguo, pero la duda está entre esos dos finales. Nadie opta por la versión de que se vacía y no se vacía, o por la de que “no se vacía, ni no se vacía” al mismo tiempo. Por analogía, si eres de los que crees que no se vacía, para tí funcionaría la DI. Si crees que se vacía, para tí funcionaría la TPI. En los tres casos(vacía, no vacía y no sabemos), del “potencial” resto de elementos, de una serie con \aleph_0 pasos, vamos extrayendo un bolita cada vez. Solo que en la DI y la TPI, son “cajitas”, en vez de bolitas, cada una conteniendo un subconjunto del conjunto estudiado, que nos ayuda a tomar una decisión objetiva del resultado. En vez de \aleph_0 bolitas, en orden, son \aleph_0 “cajitas”... con las diferencias de los subconjuntos anidados. Y en los tres casos, el resultado final de vacío se justifica, quienes lo justifican, de la misma forma: todo elemento es “extraído”, “apartado”, o “transferido” a partir de un paso concreto.

Pues eso. Tengo dos grupos de matemáticos que fuertemente defienden, con actitudes muy belicosas, para la DI aplicada a *SNEIs* vs *LCF_{2p}*:

a1) Que da igual que en cada paso, los Packs siempre tengan cardinal infinito.

- a2) Que el resultado final de vacío INDICA, claramente, que los Packs se vacían.
- a3) Que es una tontería decir que un Pack siempre existe y tiene cardinal distinto de cero, si no puedes nombrar ni un solo elemento concreto que sobreviva al chopping infinito.

Para la TPI aplicada al mismo caso, me dicen:

- b1) ES SUPER IMPORTANTE que cada NWSP siempre tenga cardinal infinito.
- b2) Podemos ignorar el resultado final de vacío de la intersección de todos ellos.
- b3) SI PUEDE EXISTIR un conjunto, del que no puedas nombrar ni un solo elemento concreto y estés seguro, que todos van a salir de él, en algún paso del chopping. “Conjuntos rotativos” los llamaron. :D. Yo los llamaba parecido cuando defendía la DI. Uno de los fallos es no acordarse que tengo varias relaciones, sí, pero TODAS PREDEFINIDAS... no las adapto... como en la diagonalización \mathbb{N} vs \mathbb{R} . No espero a que me digas algo y vuelvo a crear una nueva relación para adaptarme al elemento externo creado: están todas predefinidas y creadas sin hacer trampas con el cardinal del conjunto supuestamente inferior. Hasta le último par. Sin cambiar una coma.

Ambas respuestas son argumentos míos. Ambas respuestas niegan una construcción y autorizan la otra. Y HABLAMOS DEL MISMO TIPO DE INTERSECCIONES. Y ambas respuestas, al mismo tiempo, no son palabras mías: sino de matemáticos en foros de internet.

A uno incluso le pregunté, cuando le definí la TPI rápidamente, si esa imposibilidad de reducir los sub-estados de los subconjuntos NWSP, eran un indicativo de superioridad cardinal. Y me dijo claramente que SÍ. La gracia es que en la DI pasa lo mismo a la inversa... por muchos D-pares que preguntes, los Packs no bajan de cardinal infinito... y eso significaría, PARA ELLOS, que \mathbb{N} tiene un cardinal superior estrictamente a $P(\mathbb{N})$.

Cortocircuito. Solo ven que la otra posibilidad rompe el Teorema, así que la niegan sin pensar y me dejan de hablar. Por eso necesito juntarles en la misma habitación para que se escuchen unos a otros. O repetir el proceso con otros matemáticos. Se tardan cuatro horas y media.

No sé si puedes verlo con descripciones tan escuetas, a pesar de que el documento me haya quedado largo. En la DI, cuántos más universos “apartamos” de los Packs, más Familias de D-pares resolvemos. Es super curioso!! Al apartar elementos, la apariencia cardinal “crece”. En la TPI, cada universo por separado, en relaciones independientes, es capaz de ir creciendo hasta el cardinal de \aleph_1 como límite... SIN TOPE... al ser una partición, su unión forma \mathbb{O} . No solo hay que pensar en como crecen, de forma individual, sino en la unión de todos. Un ejemplo análogo sería:

$$\begin{aligned} O_1 &= \{0\} \\ O_2 &= \{1, 2\} \\ O_3 &= \{3, 4, 5\} \\ O_4 &= \{6, 7, 8, 9\} \\ &\dots \end{aligned}$$

Ninguno tiene cardinal \aleph_0 , pero juntos forman una lista de cardinalidades SIN TOPE hasta el cardinal de \aleph_0 . La única forma de que \mathbb{O} pueda alimentar ese crecimiento, de subconjuntos disjuntos, sin tope, es tener cardinal infinito... y ninguno por separado tiene cardinal \aleph_0 , pero la unión de todos ellos sí :D. En la TPI hacemos lo mismo, solo que mirando su capacidad para resolver D-pares, en vez de poder observar su cardinal directo.

Tantas observaciones apuntando a la misma idea... curiosidades maravillosas... y no te he contado todo ni de coña!

El Teorema de Cantor ya está muerto, solo que no le han avisado⁷.

⁷Música de mariachis