Cholestérol et triglycérides

Que faut-il éviter et que faut-il privilégier pour faire baisser ses graisses dans le sang ?

Le **« mauvais » cholestérol (LDL)** monte surtout avec les **graisses saturées** (graisses animales et certaines huiles). Les **triglycérides** montent surtout avec le **sucre, l'alcool et le surpoids**. Les bons choix alimentaires font souvent baisser ces valeurs de 10 à 20 %, et renforcent l'effet d'un éventuel traitement.

À privilégier

- Huile d'olive ou de colza, margarines végétales à tartiner
- Poissons gras 1 à 2 fois par semaine (saumon, maquereau, sardine, hareng) : ils font baisser les triglycérides
- Une poignée de noix nature par jour (noix, amandes, noisettes)
- Légumineuses 2 à 3 fois par semaine (lentilles, pois chiches, haricots)
- Flocons d'avoine, orge, pain complet : leurs fibres captent le cholestérol
- Légumes à volonté, 2 à 3 fruits par jour
- Volaille sans peau, poisson, tofu
- Produits laitiers demi-écrémés ou maigres

À éviter ou limiter

- Beurre, crème, saindoux, huile de coco et de palme
- Charcuteries, saucisses, viandes grasses, abats
- Fromages gras en grande quantité
- Viennoiseries, pâtisseries, biscuits, plats préparés, fritures
- **Pour les triglycérides :** sodas, jus de fruits, sucreries, pain blanc en excès
- **Pour les triglycérides : l'alcool**, même en petite quantité (bière, vin…)

Et les œufs ?

Pour la plupart des personnes, les œufs restent permis (jusqu'à environ 1 par jour), à condition de ne pas les accompagner de lard, de beurre ou de charcuterie. Suivez l'avis de votre médecin si votre cholestérol est très élevé.

Les autres leviers

- **Bouger** au moins 150 minutes par semaine : l'activité fait baisser les triglycérides et monter le « bon » cholestérol (HDL).
- **Perdre quelques kilos** si vous êtes en surpoids : 5 à 10 % du poids suffit souvent pour un effet net sur les triglycérides.
- **Arrêter de fumer** protège les artères, quel que soit le taux de cholestérol.
- Les aliments enrichis en stérols végétaux (certaines margarines ou yaourts) peuvent aider un peu : demandez conseil avant de les utiliser.

Prise de sang de contrôle

Pour mesurer les triglycérides, la prise de sang se fait de préférence **à jeun** (pas de repas depuis 10 à 12 heures ; l'eau est permise). Les changements d'alimentation se voient en général sur la prise de sang après 6 à 12 semaines. **N'arrêtez jamais un traitement contre le cholestérol sans en parler à votre médecin.**