Bien manger avec un diabète

Des repères simples pour équilibrer la glycémie, sans se priver de tout.

Les 4 règles de base

- **3 repas réguliers par jour**, à heures fixes, sans en sauter (et une collation si votre médecin la conseille).
- **Des féculents à chaque repas, en quantité modérée**, et de préférence complets.
- **Des légumes en abondance** : ils calent sans faire monter le sucre.
- **Pas de boissons sucrées** : c'est le changement qui a le plus d'effet.

L'assiette équilibrée

½ légumes (crus ou cuits) · **¼ protéines** (poisson, volaille, œufs, légumineuses, tofu) · **¼ féculents** (pain complet, riz complet, pâtes al dente, pommes de terre, quinoa). Un fruit en dessert, une cuillère d'huile d'olive ou de colza.

À privilégier

- Pain complet ou au levain, flocons d'avoine, céréales complètes
- Légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots) : elles font peu monter le sucre
- Pâtes cuites al dente, pommes de terre à l'eau refroidies
- Fruits entiers : 2 à 3 portions par jour, réparties dans la journée
- Produits laitiers nature (yaourt, fromage blanc) sans sucre ajouté
- Eau, eau pétillante, thé et café sans sucre
- Noix nature, huile d'olive ou de colza

À limiter

- Sodas, jus de fruits (même « 100 % »), sirops, thé glacé, boissons énergisantes
- Sucre, miel, confiture, bonbons, pâtisseries, biscuits
- Pain blanc, baguette, riz blanc collant, purée, frites
- Céréales du petit-déjeuner sucrées
- Plats préparés, snacks, charcuteries, fritures
- Produits « spécial diabétique » : souvent gras et chers, sans intérêt
- Alcool : avec modération, toujours en mangeant

D'autres conseils utiles

- **Bougez après le repas** : 10 à 15 minutes de marche font baisser la glycémie. Visez 150 minutes d'activité par semaine.
- Si vous êtes en surpoids, **perdre 5 à 10 % de votre poids** améliore nettement le diabète.
- Lisez les étiquettes : regardez la ligne « dont sucres » et la liste des ingrédients.
- Le fruit se mange de préférence à la fin du repas plutôt que seul.
- Ramadan, jeûne, régime : parlez-en avant à votre médecin pour adapter le traitement.

Hypoglycémie (sucre trop bas) : si vous prenez de l'insuline ou certains comprimés

Signes : tremblements, sueurs, faim brutale, palpitations, confusion. **Prenez tout de suite 15 g de sucre rapide** : 3 à 4 morceaux de sucre, ou un verre (150 ml) de jus de fruits ou de soda normal. Contrôlez après 15 minutes et recommencez si nécessaire, puis mangez. Prévenez votre médecin si cela se répète.