Diverticules et diverticulite

Que manger pendant une poussée, et ensuite pour éviter qu'elle revienne ?

Les **diverticules** sont de petites poches dans la paroi du côlon, très fréquentes après 50 ans. La **diverticulite** est l'inflammation d'une de ces poches : douleur dans le bas du ventre (souvent à gauche), parfois fièvre.

Pendant la poussée (diverticulite)

- Suivez le traitement prescrit. Les premiers jours, votre médecin peut conseiller une **alimentation liquide puis pauvre en fibres** pour mettre l'intestin au repos : bouillons, compotes, riz blanc, pâtes, pain blanc, pommes de terre sans peau, poisson, volaille, œufs, yaourt.
- Évitez pendant quelques jours : crudités, légumes à fibres dures, fruits avec peau, céréales complètes, légumineuses.
- **Buvez suffisamment** : eau, bouillon, tisanes.
- Dès que la douleur diminue (en général après quelques jours), **réintroduisez progressivement les fibres** : légumes cuits, puis fruits, puis céréales complètes, puis crudités.

Ensuite : prévenir les récidives

À privilégier

- **Une alimentation riche en fibres** : 25 à 30 g par jour (légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses)
- Augmentez les fibres progressivement, sur 2 à 3 semaines, pour éviter les ballonnements
- **1,5 à 2 litres d'eau** par jour
- Une activité physique régulière
- Un poids santé

À limiter

- Viande rouge et charcuteries
- Aliments très gras et ultra-transformés
- Le tabac
- La constipation : ne retenez pas l'envie d'aller à selle

Une idée reçue

Il n'est **pas nécessaire d'éviter les graines, les noix, les fraises, les tomates ou le maïs**. Les études n'ont pas montré qu'ils provoquaient des diverticulites ; ce sont même de bonnes sources de fibres.

Consultez rapidement

- Douleur au ventre intense ou qui augmente, ventre dur
- Fièvre au-dessus de 38,5 °C ou frissons
- Vomissements, impossibilité de boire
- Sang dans les selles