Calendrier de vaccination de l'enfant

Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles (ONE). Nouveau calendrier des nourrissons en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

Les vaccins du programme sont **gratuits**. Ils sont faits à la consultation ONE, chez votre médecin ou à l'école (service de Promotion de la Santé à l'École, PSE). Gardez le carnet de vaccination de votre enfant et apportez-le à chaque vaccination.

Les nourrissons (calendrier depuis le 1er novembre 2026)

Âge	Vaccins	Protège contre
8 semaines (2 mois)	Hexavalent (1re dose) Pneumocoque (1re dose) Rotavirus (par la bouche)	Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, Haemophilus influenzae b, hépatite B · Pneumocoque · Rotavirus
12 semaines (3 mois)	Rotavirus	Rotavirus (gastro-entérite)
16 semaines (4 mois)	Hexavalent (2e dose) Pneumocoque (2e dose) Rotavirus (3e dose selon le vaccin)	
12 mois	Hexavalent (rappel) RRO (1re dose)	Rougeole, oreillons, rubéole
15 mois	Pneumocoque (rappel) Méningocoques ACWY	Méningite et septicémie à méningocoques A, C, W, Y

Ce qui change au 1er novembre 2026 : l'hexavalent passe de 4 à 3 doses (2, 4 et 12 mois, au lieu de 2, 3, 4 et 15 mois) ; le rappel du pneumocoque passe de 12 à 15 mois. Un enfant qui a déjà commencé avec l'ancien calendrier poursuit selon les indications de son médecin ou de l'ONE.

Bébé né prématuré (avant 37 semaines) : une dose de pneumocoque en plus à 3 mois ; les vaccins de 15 mois sont faits à 13 mois.

Virus RSV (bronchiolite) : une protection peut être proposée pendant la grossesse, à la naissance ou pendant les premiers mois de vie. Parlez-en à votre médecin ou à l'ONE.

Les enfants et adolescents

Âge (année scolaire)	Vaccin	Protège contre
5-6 ans (3e maternelle)	Tétravalent (rappel)	Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio
7-8 ans (2e primaire)	RRO (2e dose)	Rougeole, oreillons, rubéole
13-14 ans (2e secondaire)	HPV : 2 doses à 6 mois d'intervalle (filles et garçons)	Papillomavirus : cancers du col de l'utérus, de la gorge, de l'anus, verrues génitales
15-16 ans (4e secondaire)	dTpa (rappel)	Diphtérie, tétanos, coqueluche

Et les adultes ?

- **Tétanos-diphtérie-coqueluche :** un rappel tous les 10 ans.
- **Femme enceinte :** vaccin contre la coqueluche à chaque grossesse (à partir de 24 semaines, idéalement avant 32 semaines) et vaccin contre la grippe pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.

- **Grippe** chaque automne à partir de 65 ans, et plus tôt en cas de maladie chronique ; **pneumocoque** à partir de 65 ans. Demandez-nous ce qui est recommandé pour vous.

Bon à savoir

- Un peu de fièvre, une rougeur ou une petite douleur au point d'injection sont fréquentes et passent en 1 à 2 jours.
- Un vaccin oublié n'oblige pas à tout recommencer : on reprend le calendrier là où il s'est arrêté.
- D'autres vaccins sont recommandés mais pas gratuits (par exemple méningocoque B) : nous pouvons en parler.

Source : Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles, www.vaccination-info.be (calendrier et repères pour le nouveau calendrier 2026).