Model for "Te"

General Condition

- Basis type: `lg`
- SAMB selection:
  - Type: `[Q, G]`
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: $[A_1, A_2, E]$
  - Spin (s): `[0, 1]`
- Atomic selection:
  - Type: `[Q, G, M, T]`
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: $[A_1, A_2, E]$
  - Spin (s): `[0, 1]`
- Site-cluster selection:
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: $[A_1, A_2, E]$
- Bond-cluster selection:
  - Type: `[Q, G, M, T]`
  - Rank: `[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]`
  - Irrep.: $[A_1, A_2, E]$
- Max. neighbor: `10`
- Search cell range: `(-2, 3), (-2, 3), (-2, 3)`
- Toroidal priority: `false`

Group and Unit Cell

- Group: SG No. 152 D_3^4 $P3_121$ [trigonal]
- Associated point group: PG No. 152 D_3 32 (321 setting) [trigonal]
- Unit cell:
  $a = 4.45800$, $b = 4.45800$, $c = 5.92500$, $\alpha = 90.0$, $\beta = 90.0$, $\gamma = 120.0$
- Lattice vectors (conventional cell):
  $a_1 = [\ 4.45800,\ 0.00000,\ 0.00000]$
  $a_2 = [-2.22900,\ 3.86074,\ 0.00000]$
  $a_3 = [\ 0.00000,\ 0.00000,\ 5.92500]$

Table 1: Symmetry operation

#	SO	#	SO	#	SO	#	SO	#	SO
1	$\{1\|0\}$	2	$\{3^+_{001}\|00\frac{1}{3}\}$	3	$\{3^-_{001}\|00\frac{2}{3}\}$	4	$\{2_{110}\|0\}$	5	$\{2_{100}\|00\frac{2}{3}\}$
6	$\{2_{010}\|00\frac{1}{3}\}$								

Table 2: Harmonics

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
1	$\mathbb{G}_0(A_1)$	A_1	0	G, M	-	-	1
2	$\mathbb{Q}_0(A_1)$	A_1	0	Q, T	-	-	1
3	$\mathbb{G}_2(A_1)$	A_1	2	G, M	-	-	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
4	$\mathbb{Q}_2(A_1)$	A_1	2	Q, T	-	-	$-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + z^2$
5	$\mathbb{Q}_3(A_1)$	A_1	3	Q, T	-	-	$\frac{\sqrt{10}x(x^2-3y^2)}{4}$
6	$\mathbb{G}_1(A_2)$	A_2	1	G, M	-	-	z
7	$\mathbb{Q}_1(A_2)$	A_2	1	Q, T	-	-	z
8	$\mathbb{Q}_3(A_2, 2)$	A_2	3	Q, T	2	-	$\frac{\sqrt{10}y(3x^2-y^2)}{4}$

continued ...

Table 2

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
9	$\mathbb{G}_{1,1}(E)$	E	1	$G,\ M$	-	1	x
10	$\mathbb{G}_{1,2}(E)$					2	y
11	$\mathbb{Q}_{1,1}(E)$	E	1	$Q,\ T$	-	1	x
12	$\mathbb{Q}_{1,2}(E)$					2	y
13	$\mathbb{G}_{2,1}(E,1)$	E	2	$G,\ M$	1	1	$\sqrt{3}yz$
14	$\mathbb{G}_{2,2}(E,1)$					2	$-\sqrt{3}xz$
15	$\mathbb{G}_{2,1}(E,2)$	E	2	$G,\ M$	2	1	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
16	$\mathbb{G}_{2,2}(E,2)$					2	$-\sqrt{3}xy$
17	$\mathbb{Q}_{2,1}(E,1)$	E	2	$Q,\ T$	1	1	$\sqrt{3}yz$
18	$\mathbb{Q}_{2,2}(E,1)$					2	$-\sqrt{3}xz$
19	$\mathbb{Q}_{2,1}(E,2)$	E	2	$Q,\ T$	2	1	$\frac{\sqrt{3}(x-y)(x+y)}{2}$
20	$\mathbb{Q}_{2,2}(E,2)$					2	$-\sqrt{3}xy$
21	$\mathbb{Q}_{3,1}(E,1)$	E	3	$Q,\ T$	1	1	$-\frac{\sqrt{6}x\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$
22	$\mathbb{Q}_{3,2}(E,1)$					2	$-\frac{\sqrt{6}y\left(x^2+y^2-4z^2\right)}{4}$
23	$\mathbb{Q}_{3,1}(E,2)$	E	3	$Q,\ T$	2	1	$\sqrt{15}xyz$
24	$\mathbb{Q}_{3,2}(E,2)$					2	$\frac{\sqrt{15}z(x-y)(x+y)}{2}$

Basis in full matrix

Table 3: dimension = 9

#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)
0	$|p_x\rangle$ @A(1)	1	$|p_y\rangle$ @A(1)	2	$|p_z\rangle$ @A(1)	3	$|p_x\rangle$ @A(2)	4	$|p_y\rangle$ @A(2)
5	$|p_z\rangle$ @A(2)	6	$|p_x\rangle$ @A(3)	7	$|p_y\rangle$ @A(3)	8	$|p_z\rangle$ @A(3)		

Table 4: Atomic basis (orbital part only)

orbital	definition
$|p_x\rangle$	x
$|p_y\rangle$	y
$|p_z\rangle$	z

—— **SAMB** ———————————————————————————————

45 (all 45) SAMBs

- 'A' site-cluster : A
  * bra: $\langle p_x|$, $\langle p_y|$, $\langle p_z|$
  * ket: $|p_x\rangle$, $|p_y\rangle$, $|p_z\rangle$
  * wyckoff: 3a

  z1 $\mathbb{Q}_0^{(c)}(A_1) = \mathbb{Q}_0^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1)$

  z2 $\mathbb{Q}_2^{(c)}(A_1) = \mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1)$

$\boxed{\text{z3}}$ $\quad \mathbb{Q}_3^{(c)}(A_1) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{2} + \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z4}}$ $\quad \mathbb{G}_2^{(c)}(A_1) = -\dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z11}}$ $\quad \mathbb{Q}_1^{(c)}(A_2) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z12}}$ $\quad \mathbb{Q}_3^{(c)}(A_2,2) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z16}}$ $\quad \mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(E,a) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z17}}$ $\quad \mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(E,a) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z18}}$ $\quad \mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(E,b) = \dfrac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{14} - \dfrac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{14} - \dfrac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{14}$

$\boxed{\text{z19}}$ $\quad \mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(E,b) = -\dfrac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{14} - \dfrac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{14} - \dfrac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{14}$

$\boxed{\text{z20}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E,1) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1)}{2}$

$\boxed{\text{z21}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E,1) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1)}{2}$

$\boxed{\text{z22}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E,2) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1)}{2}$

$\boxed{\text{z23}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E,2) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1)}{2}$

$\boxed{\text{z24}}$ $\quad \mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(E,1) = \dfrac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{14} - \dfrac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{14} + \dfrac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{7}$

$\boxed{\text{z25}}$ $\quad \mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(E,1) = -\dfrac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{14} - \dfrac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{14} + \dfrac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{7}$

$\boxed{\text{z26}}$ $\mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(E,2) = \dfrac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{2} - \dfrac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z27}}$ $\mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(E,2) = -\dfrac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E)}{2} - \dfrac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E)}{2}$

- 'A'-'A' bond-cluster : `A;A_001_1`
  * bra: $\langle p_x|$, $\langle p_y|$, $\langle p_z|$
  * ket: $|p_x\rangle$, $|p_y\rangle$, $|p_z\rangle$
  * wyckoff: `3a@3b`

$\boxed{\text{z5}}$ $\mathbb{Q}_0^{(c)}(A_1) = \mathbb{Q}_0^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_1)$

$\boxed{\text{z6}}$ $\mathbb{Q}_2^{(c)}(A_1) = \mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_1)$

$\boxed{\text{z7}}$ $\mathbb{Q}_3^{(c)}(A_1) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{2} + \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z8}}$ $\mathbb{G}_0^{(c)}(A_1) = \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(E)}{3} + \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(E)}{3} + \dfrac{\sqrt{3}\mathbb{M}_1^{(a)}(A_2)\mathbb{T}_1^{(b)}(A_2)}{3}$

$\boxed{\text{z9}}$ $\mathbb{G}_2^{(c)}(A_1,a) = -\dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z10}}$ $\mathbb{G}_2^{(c)}(A_1,b) = -\dfrac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(E)}{6} - \dfrac{\sqrt{6}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(E)}{6} + \dfrac{\sqrt{6}\mathbb{M}_1^{(a)}(A_2)\mathbb{T}_1^{(b)}(A_2)}{3}$

$\boxed{\text{z13}}$ $\mathbb{Q}_1^{(c)}(A_2,a) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z14}}$ $\mathbb{Q}_1^{(c)}(A_2,b) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(E)}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z15}}$ $\mathbb{Q}_3^{(c)}(A_2,2) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{2} - \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z28}}$ $\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(E,a) = \dfrac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$

z29
$$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(E,a) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_0^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{2}$$

z30
$$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(E,b) = \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{14} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{14} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{14}$$

z31
$$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(E,b) = -\frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{14} - \frac{\sqrt{42}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{14} - \frac{\sqrt{14}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{14}$$

z32
$$\mathbb{Q}_{1,1}^{(c)}(E,c) = \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E)\mathbb{T}_1^{(b)}(A_2)}{2} - \frac{\mathbb{M}_1^{(a)}(A_2)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(E)}{2}$$

z33
$$\mathbb{Q}_{1,2}^{(c)}(E,c) = -\frac{\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E)\mathbb{T}_1^{(b)}(A_2)}{2} + \frac{\mathbb{M}_1^{(a)}(A_2)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$$

z34
$$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E,1) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_1)}{2}$$

z35
$$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E,1) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_1)}{2}$$

z36
$$\mathbb{Q}_{2,1}^{(c)}(E,2) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_1)}{2}$$

z37
$$\mathbb{Q}_{2,2}^{(c)}(E,2) = \frac{\sqrt{2}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_0^{(b)}(A_1)}{2}$$

z38
$$\mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(E,1) = \frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{14} - \frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{14} + \frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{7}$$

z39
$$\mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(E,1) = -\frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{14} - \frac{\sqrt{7}\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{14} + \frac{\sqrt{21}\mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{7}$$

z40
$$\mathbb{Q}_{3,1}^{(c)}(E,2) = \frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{2}$$

z41
$$\mathbb{Q}_{3,2}^{(c)}(E,2) = -\frac{\mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,2}^{(b)}(E)}{2} - \frac{\mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1)\mathbb{Q}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$$

z42
$$\mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(E,1) = \frac{\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E)\mathbb{T}_1^{(b)}(A_2)}{2} + \frac{\mathbb{M}_1^{(a)}(A_2)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(E)}{2}$$

$\boxed{\text{z43}}$ $\quad \mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(E,1) = -\dfrac{\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E)\mathbb{T}_1^{(b)}(A_2)}{2} - \dfrac{\mathbb{M}_1^{(a)}(A_2)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z44}}$ $\quad \mathbb{G}_{2,1}^{(c)}(E,2) = \dfrac{\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(E)}{2} - \dfrac{\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(E)}{2}$

$\boxed{\text{z45}}$ $\quad \mathbb{G}_{2,2}^{(c)}(E,2) = -\dfrac{\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,2}^{(b)}(E)}{2} - \dfrac{\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E)\mathbb{T}_{1,1}^{(b)}(E)}{2}$

— **Atomic SAMB** ————————————————————————————————————

- bra: $\langle p_x |$, $\langle p_y |$, $\langle p_z |$
- ket: $| p_x \rangle$, $| p_y \rangle$, $| p_z \rangle$

$\boxed{\text{x1}}$ $\quad \mathbb{Q}_0^{(a)}(A_1) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x2}}$ $\quad \mathbb{Q}_2^{(a)}(A_1) = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{6}}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x3}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x4}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x5}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,1}^{(a)}(E,2) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\boxed{\text{x6}}$ $\quad \mathbb{Q}_{2,2}^{(a)}(E,2) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

8

x7 $\mathbb{M}_1^{(a)}(A_2) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

x8 $\mathbb{M}_{1,1}^{(a)}(E) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{bmatrix}$

x9 $\mathbb{M}_{1,2}^{(a)}(E) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}i}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

— Cluster SAMB —

- Site cluster

** Wyckoff: `3a`

y1 $\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1) = \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right]$

y2 $\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E) = \left[\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6} \right]$

y3 $\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E) = \left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right]$

- Bond cluster

** Wyckoff: `3a@3b`

y4 $\mathbb{Q}_0^{(s)}(A_1) = \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right]$

y5 $\mathbb{T}_1^{(s)}(A_2) = \left[\frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3} \right]$

y6 $\mathbb{Q}_{1,1}^{(s)}(E) = \left[\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6} \right]$

9

y7 $\mathbb{Q}_{1,2}^{(s)}(E) = \left[0, \dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$

y8 $\mathbb{T}_{1,1}^{(s)}(E) = \left[0, -\dfrac{\sqrt{2}i}{2}, \dfrac{\sqrt{2}i}{2}\right]$

y9 $\mathbb{T}_{1,2}^{(s)}(E) = \left[\dfrac{\sqrt{6}i}{3}, -\dfrac{\sqrt{6}i}{6}, -\dfrac{\sqrt{6}i}{6}\right]$

— **Site and Bond** ————————————————————————

Table 5: Orbital of each site

#	site	orbital
1	A	$\lvert p_x\rangle, \lvert p_y\rangle, \lvert p_z\rangle$

Table 6: Neighbor and bra-ket of each bond

#	head	tail	neighbor	head (bra)	tail (ket)
1	A	A	[1]	[p]	[p]

— **Site in Unit Cell** ————————————————————————

Sites in (conventional) cell (no plus set), SL = sublattice

Table 7: 'A' (#1) site cluster (3a), .2.

SL	position (s)	mapping
1	[0.27400, 0.00000, 0.33333]	[1,5]
2	[0.00000, 0.27400, 0.66667]	[2,4]
3	[0.72600, 0.72600, 0.00000]	[3,6]

━━ **Bond in Unit Cell** ━━

Bonds in (conventional) cell (no plus set): tail, head = (SL, plus set), (N)D = (non)directional (listed up to 5th neighbor at most)

Table 8: 1-th 'A'-'A' [1] (#1) bond cluster (3a@3b), ND, $|v|= 2.89426$ (cartesian)

SL	vector (v)	center (c)	mapping	head	tail	R (primitive)
1	[-0.27400,-0.54800, 0.33333]	[0.86300, 0.00000, 0.83333]	[1,-5]	(3,1)	(2,1)	[1,1,-1]
2	[0.54800, 0.27400, 0.33333]	[0.00000, 0.86300, 0.16667]	[2,-4]	(1,1)	(3,1)	[-1,-1,0]
3	[-0.27400, 0.27400, 0.33333]	[0.13700, 0.13700, 0.50000]	[3,-6]	(2,1)	(1,1)	[0,0,0]

11