

Response Tensors up to 4th rank in D_2

— polar tensors —

$$C^{(0,Q)} = (C^{(0,Q)})$$

$$C^{(0,Q)} = Q_0$$

$$S^{(2,Q)} = \begin{pmatrix} S_{xx}^{(2,Q)} & 0 & 0 \\ 0 & S_{yy}^{(2,Q)} & 0 \\ 0 & 0 & S_{zz}^{(2,Q)} \end{pmatrix}$$

$$S_{xx}^{(2,Q)} = Q_0 - Q_u + Q_v$$

$$S_{yy}^{(2,Q)} = Q_0 - Q_u - Q_v$$

$$S_{zz}^{(2,Q)} = Q_0 + 2Q_u$$

$$S^{(3,Q)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ S_{4x}^{(3,Q)} & 0 & 0 \\ 0 & S_{5y}^{(3,Q)} & 0 \\ 0 & 0 & S_{6z}^{(3,Q)} \end{pmatrix}$$

$$S_{4x}^{(3,Q)} = -3G_u[1] - G_v[1] + Q_{xyz}$$

$$S_{5y}^{(3,Q)} = 3G_u[1] - G_v[1] + Q_{xyz}$$

$$S_{6z}^{(3,Q)} = 2G_v[1] + Q_{xyz}$$

$$A^{(3,Q)} = \begin{pmatrix} A_{4x}^{(3,Q)} & 0 & 0 \\ 0 & A_{5y}^{(3,Q)} & 0 \\ 0 & 0 & A_{6z}^{(3,Q)} \end{pmatrix}$$

$$A_{4x}^{(3,Q)} = G_0 - G_u[2] + G_v[2]$$

$$A_{5y}^{(3,Q)} = G_0 - G_u[2] - G_v[2]$$

$$A_{6z}^{(3,Q)} = G_0 + 2G_u[2]$$

$$S^{(4,Q)} = \begin{pmatrix} S_{11}^{(4,Q)} & S_{12}^{(4,Q)} & S_{13}^{(4,Q)} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12}^{(4,Q)} & S_{22}^{(4,Q)} & S_{23}^{(4,Q)} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13}^{(4,Q)} & S_{23}^{(4,Q)} & S_{33}^{(4,Q)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44}^{(4,Q)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55}^{(4,Q)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66}^{(4,Q)} \end{pmatrix}$$

$$S_{11}^{(4,Q)} = Q_0[1] + 2Q_0[2] - Q_{4u} + Q_{4v} + 2Q_4 - 2Q_u[1] - 4Q_u[2] + 2Q_v[1] + 4Q_v[2]$$

$$S_{12}^{(4,Q)} = Q_0[1] + 2Q_{4u} - Q_4 - 2Q_u[1]$$

$$S_{13}^{(4,Q)} = Q_0[1] - Q_{4u} - Q_{4v} - Q_4 + Q_u[1] + Q_v[1]$$

$$S_{22}^{(4,Q)} = Q_0[1] + 2Q_0[2] - Q_{4u} - Q_{4v} + 2Q_4 - 2Q_u[1] - 4Q_u[2] - 2Q_v[1] - 4Q_v[2]$$

$$S_{23}^{(4,Q)} = Q_0[1] - Q_{4u} + Q_{4v} - Q_4 + Q_u[1] - Q_v[1]$$

$$S_{33}^{(4,Q)} = Q_0[1] + 2Q_0[2] + 2Q_{4u} + 2Q_4 + 4Q_u[1] + 8Q_u[2]$$

$$S_{44}^{(4,Q)} = Q_0[2] - Q_{4u} + Q_{4v} - Q_4 + Q_u[2] - Q_v[2]$$

$$S_{55}^{(4,Q)} = Q_0[2] - Q_{4u} - Q_{4v} - Q_4 + Q_u[2] + Q_v[2]$$

$$S_{66}^{(4,Q)} = Q_0[2] + 2Q_{4u} - Q_4 - 2Q_u[2]$$

$$\bar{S}^{(4,Q)} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{S}_{12}^{(4,Q)} & \bar{S}_{13}^{(4,Q)} & 0 & 0 & 0 \\ -\bar{S}_{12}^{(4,Q)} & 0 & \bar{S}_{23}^{(4,Q)} & 0 & 0 & 0 \\ -\bar{S}_{13}^{(4,Q)} & -\bar{S}_{23}^{(4,Q)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{S}_{12}^{(4,Q)} = 4G_{xyz}[1] - 2Q_v[3]$$

$$\bar{S}_{13}^{(4,Q)} = -4G_{xyz}[1] + 3Q_u[3] - Q_v[3]$$

$$\bar{S}_{23}^{(4,Q)} = 4G_{xyz}[1] + 3Q_u[3] + Q_v[3]$$

$$A^{(4,Q)} = \begin{pmatrix} A_{xx}^{(4,Q)} & 0 & 0 \\ 0 & A_{yy}^{(4,Q)} & 0 \\ 0 & 0 & A_{zz}^{(4,Q)} \end{pmatrix}$$

$$A_{xx}^{(4,Q)} = Q_0[3] - 2Q_u[6] + 2Q_v[6]$$

$$A_{yy}^{(4,Q)} = Q_0[3] - 2Q_u[6] - 2Q_v[6]$$

$$A_{zz}^{(4,Q)} = Q_0[3] + 4Q_u[6]$$

$$M^{(4,Q)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{4x}^{(4,Q)} & 0 & 0 \\ 0 & M_{5y}^{(4,Q)} & 0 \\ 0 & 0 & M_{6z}^{(4,Q)} \end{pmatrix}$$

$$M_{4x}^{(4,Q)} = G_{xyz}[2] - 3Q_u[4] - Q_v[4]$$

$$M_{5y}^{(4,Q)} = G_{xyz}[2] + 3Q_u[4] - Q_v[4]$$

$$M_{6z}^{(4,Q)} = G_{xyz}[2] + 2Q_v[4]$$

$$\bar{M}^{(4,Q)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \bar{M}_{x4}^{(4,Q)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{M}_{y5}^{(4,Q)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{M}_{z6}^{(4,Q)} \end{pmatrix}$$

$$\bar{M}_{x4}^{(4,Q)} = G_{xyz}[3] - 3Q_u[5] - Q_v[5]$$

$$\bar{M}_{y5}^{(4,Q)} = G_{xyz}[3] + 3Q_u[5] - Q_v[5]$$

$$\bar{M}_{z6}^{(4,Q)} = G_{xyz}[3] + 2Q_v[5]$$

— axial tensors —

$$C^{(0,G)} = (C^{(0,G)})$$

$$C^{(0,G)} = G_0$$

$$S^{(2,G)} = \begin{pmatrix} S_{xx}^{(2,G)} & 0 & 0 \\ 0 & S_{yy}^{(2,G)} & 0 \\ 0 & 0 & S_{zz}^{(2,G)} \end{pmatrix}$$

$$S_{xx}^{(2,G)} = G_0 - G_u + G_v$$

$$S_{yy}^{(2,G)} = G_0 - G_u - G_v$$

$$S_{zz}^{(2,G)} = G_0 + 2G_u$$

$$S^{(3,G)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ S_{4x}^{(3,G)} & 0 & 0 \\ 0 & S_{5y}^{(3,G)} & 0 \\ 0 & 0 & S_{6z}^{(3,G)} \end{pmatrix}$$

$$S_{4x}^{(3,G)} = G_{xyz} - 3Q_u[1] - Q_v[1]$$

$$S_{5y}^{(3,G)} = G_{xyz} + 3Q_u[1] - Q_v[1]$$

$$S_{6z}^{(3,G)} = G_{xyz} + 2Q_v[1]$$

$$A^{(3,G)} = \begin{pmatrix} A_{4x}^{(3,G)} & 0 & 0 \\ 0 & A_{5y}^{(3,G)} & 0 \\ 0 & 0 & A_{6z}^{(3,G)} \end{pmatrix}$$

$$A_{4x}^{(3,G)} = Q_0 - Q_u[2] + Q_v[2]$$

$$A_{5y}^{(3,G)} = Q_0 - Q_u[2] - Q_v[2]$$

$$A_{6z}^{(3,G)} = Q_0 + 2Q_u[2]$$

$$S^{(4,G)} = \begin{pmatrix} S_{11}^{(4,G)} & S_{12}^{(4,G)} & S_{13}^{(4,G)} & 0 & 0 & 0 \\ S_{12}^{(4,G)} & S_{22}^{(4,G)} & S_{23}^{(4,G)} & 0 & 0 & 0 \\ S_{13}^{(4,G)} & S_{23}^{(4,G)} & S_{33}^{(4,G)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44}^{(4,G)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55}^{(4,G)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66}^{(4,G)} \end{pmatrix}$$

$$S_{11}^{(4,G)} = G_0[1] + 2G_0[2] - G_{4u} + G_{4v} + 2G_4 - 2G_u[1] - 4G_u[2] + 2G_v[1] + 4G_v[2]$$

$$S_{12}^{(4,G)} = G_0[1] + 2G_{4u} - G_4 - 2G_u[1]$$

$$S_{13}^{(4,G)} = G_0[1] - G_{4u} - G_{4v} - G_4 + G_u[1] + G_v[1]$$

$$S_{22}^{(4,G)} = G_0[1] + 2G_0[2] - G_{4u} - G_{4v} + 2G_4 - 2G_u[1] - 4G_u[2] - 2G_v[1] - 4G_v[2]$$

$$S_{23}^{(4,G)} = G_0[1] - G_{4u} + G_{4v} - G_4 + G_u[1] - G_v[1]$$

$$S_{33}^{(4,G)} = G_0[1] + 2G_0[2] + 2G_{4u} + 2G_4 + 4G_u[1] + 8G_u[2]$$

$$S_{44}^{(4,G)} = G_0[2] - G_{4u} + G_{4v} - G_4 + G_u[2] - G_v[2]$$

$$S_{55}^{(4,G)} = G_0[2] - G_{4u} - G_{4v} - G_4 + G_u[2] + G_v[2]$$

$$S_{66}^{(4,G)} = G_0[2] + 2G_{4u} - G_4 - 2G_u[2]$$

$$\bar{S}^{(4,G)} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{S}_{12}^{(4,G)} & \bar{S}_{13}^{(4,G)} & 0 & 0 & 0 \\ -\bar{S}_{12}^{(4,G)} & 0 & \bar{S}_{23}^{(4,G)} & 0 & 0 & 0 \\ -\bar{S}_{13}^{(4,G)} & -\bar{S}_{23}^{(4,G)} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{S}_{12}^{(4,G)} = -2G_v[3] + 4Q_{xyz}[1]$$

$$\bar{S}_{13}^{(4,G)} = 3G_u[3] - G_v[3] - 4Q_{xyz}[1]$$

$$\bar{S}_{23}^{(4,G)} = 3G_u[3] + G_v[3] + 4Q_{xyz}[1]$$

$$A^{(4,G)} = \begin{pmatrix} A_{xx}^{(4,G)} & 0 & 0 \\ 0 & A_{yy}^{(4,G)} & 0 \\ 0 & 0 & A_{zz}^{(4,G)} \end{pmatrix}$$

$$A_{xx}^{(4,G)} = G_0[3] - 2G_u[6] + 2G_v[6]$$

$$A_{yy}^{(4,G)} = G_0[3] - 2G_u[6] - 2G_v[6]$$

$$A_{zz}^{(4,G)} = G_0[3] + 4G_u[6]$$

$$M^{(4,G)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ M_{4x}^{(4,G)} & 0 & 0 \\ 0 & M_{5y}^{(4,G)} & 0 \\ 0 & 0 & M_{6z}^{(4,G)} \end{pmatrix}$$

$$M_{4x}^{(4,G)} = -3G_u[4] - G_v[4] + Q_{xyz}[2]$$

$$M_{5y}^{(4,G)} = 3G_u[4] - G_v[4] + Q_{xyz}[2]$$

$$M_{6z}^{(4,G)} = 2G_v[4] + Q_{xyz}[2]$$

$$\bar{M}^{(4,G)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \bar{M}_{x4}^{(4,G)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{M}_{y5}^{(4,G)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \bar{M}_{z6}^{(4,G)} \end{pmatrix}$$

$$\bar{M}_{x4}^{(4,G)} = -3G_u[5] - G_v[5] + Q_{xyz}[3]$$

$$\bar{M}_{y5}^{(4,G)} = 3G_u[5] - G_v[5] + Q_{xyz}[3]$$

$$\bar{M}_{z6}^{(4,G)} = 2G_v[5] + Q_{xyz}[3]$$