SG No. 6 C_s^1 Pm (b-axis setting) [monoclinic]

* plus set: $+[0, 0, 0]$
* Wyckoff site: `1a`, site symmetry: `m`

Table 1: Wyckoff bond: `1a@1a`, bond symmetry: `m`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$[x, 0, z]$	`[1,2]`

Table 2: Wyckoff bond: `1b@1a`, bond symmetry: `m`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, Y, 0]$	$[x, 0, z]$	`[1,-2]`

Table 3: Wyckoff bond: `2c@1a`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, 0, z]$	`[1]`
2	$[X, -Y, Z]$	$[x, 0, z]$	`[2]`

* Wyckoff site: `1b`, site symmetry: `m`

Table 4: Wyckoff bond: `1a@1b`, bond symmetry: `m`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,2]`

Table 5: Wyckoff bond: `1b@1b`, bond symmetry: `m`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, Y, 0]$	$\left[x, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,-2]`

Table 6: Wyckoff bond: `2c@1b`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1]`
2	$[X, -Y, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, z\right]$	`[2]`

* Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `1`

Table 7: Wyckoff bond: `2a@2c`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, y, z]$	`[1]`
2	$[X, -Y, Z]$	$[x, -y, z]$	`[2]`