SG No. 12 C_{2h}^3 $C2/m$ (b-axis setting) [monoclinic]

* plus set: $+[0, 0, 0]$, $+\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$

Table 1: Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `2/m`

No.	position	mapping
1	$[0, 0, 0]$	`[1,2,3,4]`

Table 2: Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `2/m`

No.	position	mapping
1	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 3: Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `2/m`

No.	position	mapping
1	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 4: Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `2/m`

No.	position	mapping
1	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 5: Wyckoff site: `4e`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[1,3]`
2	$\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0\right]$	`[2,4]`

Table 6: Wyckoff site: `4f`, site symmetry: `-1`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,3]`
2	$\left[\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,4]`

Table 7: Wyckoff site: `4g`, site symmetry: `2`

No.	position	mapping
1	$[0, y, 0]$	`[1,2]`
2	$[0, -y, 0]$	`[3,4]`

Table 8: Wyckoff site: `4h`, site symmetry: `2`

No.	position	mapping
1	$\left[0,\ y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[1,2]`
2	$\left[0,\ -y,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,4]`

Table 9: Wyckoff site: `4i`, site symmetry: `m`

No.	position	mapping
1	$[x,\ 0,\ z]$	`[1,4]`
2	$[-x,\ 0,\ -z]$	`[2,3]`

Table 10: Wyckoff site: `8j`, site symmetry: `1`

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	`[1]`
2	$[-x,\ y,\ -z]$	`[2]`
3	$[-x,\ -y,\ -z]$	`[3]`
4	$[x,\ -y,\ z]$	`[4]`