MSG No. 2.5 $P\bar{1}1'$ [Type II, triclinic]

Table 1: Wyckoff site: `1a`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	[0, 0, 0]	`[1,2,3,4]`

Table 2: Wyckoff site: `1b`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	$\left[0, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 3: Wyckoff site: `1c`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	$\left[0, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 4: Wyckoff site: `1d`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 5: Wyckoff site: `1e`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 6: Wyckoff site: `1f`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 7: Wyckoff site: `1g`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 8: Wyckoff site: `1h`, site symmetry: `-11'`

No.	position	mapping
1	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,3,4]`

Table 9: Wyckoff site: `2i`, site symmetry: `11'`

No.	position	mapping
1	$[x,\ y,\ z]$	`[1,3]`
2	$[-x,\ -y,\ -z]$	`[2,4]`