MPG No. 20.1.71 $\bar{3}m$ (-3m1 setting) [Type I, trigonal] [Q tensor]

* Rank 0 tensor.

$$[Q]$$

$$Q = \mathbb{Q}_0^{(1)}$$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{zz} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{zz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss). * Rank 3 tensor (sa). * Rank 3 tensor (a). * Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & Q_{xxyz} & 0 & 0 \\ Q_{xxyy} & Q_{xxxx} & Q_{xxzz} & -Q_{xxyz} & 0 & 0 \\ Q_{xxzz} & Q_{xxzz} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ Q_{xxyz} & -Q_{xxyz} & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{yzyz} & Q_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xxyz} & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{xxzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{xxyz} = \mathbb{Q}_{4s}^{(1)}$$
$$Q_{zzzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_0^{(2)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & Q_{xxzz} & Q_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xxzz} & -Q_{xxyz} & 0 & 0 \\ -Q_{xxzz} & -Q_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -Q_{xxyz} & Q_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -Q_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxzz} = 3\mathbb{Q}_u^{(3)}$$
$$Q_{xxyz} = 2\mathbb{G}_{3c}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_0^{(3)} - 2\mathbb{Q}_u^{(4)}$$
$$Q_{xyxy} = \mathbb{Q}_0^{(3)} + 4\mathbb{Q}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxyz} & 0 & 0 \\ -Q_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & -Q_{yzyz} & 0 \\ 0 & -Q_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxyz} = \mathbb{G}_{3c}^{(2)}$$
$$Q_{yzyz} = -3\mathbb{Q}_{u}^{(5)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzxx} & -Q_{yzxx} & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -Q_{yzyz} & -Q_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzxx} = \mathbb{G}_{3c}^{(3)}$$
$$Q_{yzyz} = -3\mathbb{Q}_{u}^{(6)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & Q_{xxyy} & Q_{xxzz} & Q_{xxyz} & 0 & 0 & Q_{xxzy} & 0 & 0 \\ Q_{xxyy} & Q_{xxxx} & Q_{xxzz} & -Q_{xxyz} & 0 & 0 & -Q_{xxzy} & 0 & 0 \\ Q_{zzxx} & Q_{zzxx} & Q_{zzzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Q_{yzxx} & -Q_{yzxx} & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 & Q_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{yzzy} & Q_{yzxx} & 0 & Q_{yzyz} & Q_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xxzy} & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} & 0 & Q_{xxyz} & \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{0}^{(2)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{u}^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{u}^{(2)}$$
$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{u}^{(1)}$$
$$Q_{xxzz} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_{u}^{(1)} + 3\mathbb{Q}_{u}^{(3)}$$
$$Q_{xxyz} = 2\mathbb{G}_{3c}^{(1)} + \mathbb{G}_{3c}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4s}^{(1)}$$
$$Q_{xxzy} = 2\mathbb{G}_{3c}^{(1)} - \mathbb{G}_{3c}^{(2)} + \mathbb{Q}_{4s}^{(1)}$$
$$Q_{zzxx} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_{u}^{(1)} - 3\mathbb{Q}_{u}^{(3)}$$
$$Q_{zzzz} = \mathbb{Q}_{0}^{(1)} + 2\mathbb{Q}_{0}^{(2)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_{u}^{(1)} + 8\mathbb{Q}_{u}^{(2)}$$
$$Q_{yzxx} = -2\mathbb{G}_{3c}^{(1)} + \mathbb{Q}_{4s}^{(1)}$$
$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_{0}^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_{u}^{(2)} - 3\mathbb{Q}_{u}^{(5)}$$
$$Q_{yzzy} = \mathbb{Q}_{0}^{(2)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_{u}^{(2)} + 3\mathbb{Q}_{u}^{(5)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} Q_{yzxx} & -Q_{yzxx} & 0 & Q_{yzyz} & 0 & 0 & Q_{yzzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -Q_{yzzy} & -Q_{yzxx} & 0 & -Q_{yzyz} & -Q_{yzxx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & Q_{xyxy} & 0 & 0 & -Q_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$Q_{yzxx} = \mathbb{G}_{3c}^{(3)}$$
$$Q_{yzyz} = \mathbb{Q}_{0}^{(3)} - 2\mathbb{Q}_{u}^{(4)} - 3\mathbb{Q}_{u}^{(6)}$$
$$Q_{yzzy} = -\mathbb{Q}_{0}^{(3)} + 2\mathbb{Q}_{u}^{(4)} - 3\mathbb{Q}_{u}^{(6)}$$
$$Q_{xyxy} = \mathbb{Q}_{0}^{(3)} + 4\mathbb{Q}_{u}^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} Q_{xxxx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{xxxx} & Q_{yyyz} \\ 0 & 0 & Q_{zzzz} \\ 0 & Q_{yyyz} & Q_{yyzz} \\ Q_{zzxx} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{xxyy} & -Q_{yyyz} \\ 0 & Q_{yzzy} & 0 \\ 0 & -Q_{yyyz} & -\frac{Q_{xxxx}}{2} + \frac{3Q_{xxyy}}{2} + Q_{yyzz} - Q_{yzzy} + Q_{zzxx} \\ \frac{Q_{xxxx}}{2} - \frac{Q_{xxyy}}{2} & 0 & 0 \\ -Q_{yyyz} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{xxxx} = 3\mathbb{Q}_0^{(1)} + 3\mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)} - 4\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{yyyz} = -\mathbb{Q}_{4s}^{(1)}$$
$$Q_{zzzz} = 3\mathbb{Q}_0^{(1)} + 8\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{Q}_u^{(1)} + 8\mathbb{Q}_u^{(2)}$$
$$Q_{yyzz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} + 3\mathbb{Q}_u^{(3)}$$
$$Q_{zzxx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(1)} - 3\mathbb{Q}_u^{(3)}$$
$$Q_{xxyy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + \mathbb{Q}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_u^{(1)}$$
$$Q_{yzzy} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - 4\mathbb{Q}_{40}^{(1)} + \mathbb{Q}_u^{(2)} + 3\mathbb{Q}_u^{(5)}$$