慢病随访调查问卷

筛查机构名称：_____　　筛查日期：_____年_____月_____ 日

筛查员：_____　　联系电话：_____

质控员：_____　　联系电话：_____

一、基本信息

1.1 人口学信息		
姓名：_____	性别__|：1-男 2-女	民族：_____族
身份证号：__________________		
1.2 通讯及联系方式		
户籍地址：_____省_____市_____区/县_____街道/乡镇_____居（村）委		邮编（选填）：_____
现居住地址：_____省_____市_____区/县_____街道/乡镇_____居（村）		邮编（选填）：_____
联系手机：　　联系电话：		电子邮箱（选填）：
主要联系人姓名：_____	与本人关系__|：1-父母 2-配偶 3-子女 4-兄弟姐妹 5-其他：_____	联系人手机：_____

二、疾病状况监测

2.1 症状表现
自上次随访以来，您的症状（改善/恶化/不变）：_____ 是否出现新的症状（是/否），如是，请描述：_____
2.2 治疗方案遵循情况
对当前治疗方案的满意度（高/中/低）：_____ 是否遵循医嘱（是/否），如否，请说明：_____ 治疗相关副作用（有/无），如有，请描述：_____

三、生活方式

3.1 吸烟
__|否 __|是，　若正在吸烟，吸烟年限_____年，每天_____支 若已戒烟，戒烟年限_____年，曾经吸烟_____年 （吸烟：一生中连续或累积吸烟 6 个月及以上者定义为吸烟者。 戒烟：　是指吸烟者在调查时已不再吸烟者，并坚持 6 个月以上。）
3.2 饮酒

|__|不饮酒
|__|少量饮酒
|__|经常大量饮酒（白酒≥3 次/周，每次≥2 两）

3.3 运动习惯

|__|经常运动（相当于快步走的中等强度运动，且每周≥3 次、每次≥30 分钟，包含中度、重度体力劳动者）
|__|缺乏运动 （不符合上述经常运动标准者）

（中度体力劳动：指手和臂持续动作，如锯木头等；臂和腿的工作，如卡车、拖拉机或建筑设备等运输操作；臂和躯干的工作，如锻造、风动工具操作、粉刷、间断搬运中等重物、除草、锄田、摘水果和蔬菜等。

重度体力劳动：指臂和躯干负荷工作，如搬重物、铲、锤锻、锯刨或凿硬木、割草、挖掘等。）

3.4 膳食习惯

口味： |__|偏咸 |__|偏淡 |__|适中
荤素： |__|偏荤 |__|偏素 |__|均衡

吃蔬菜（每日食用 6 两蔬菜）： |____|≥5 天/周 |____|3-4 天/周 |____|≤2 天/周
吃水果（每日食用 4 两水果）： |____|≥5 天/周 |____|3-4 天/周 |____|≤2 天/周

四、家族史

4.1 脑卒中（中风）

|__|无
|__|有，与本人关系： |__|父亲|__|母亲 |__|兄弟姐妹（患病_____人）
|__|不详

4.2 冠心病

|__|无
|__|有，与本人关系： |__|父亲 |__|母亲 |__|兄弟姐妹（患病_____人）
|__|不详

4.3 高血压

|__|无
|__|有，与本人关系： |__|父亲 |__|母亲 |__|兄弟姐妹（患病_____人）
|__|不详

4.4 糖尿病

|__|无
|__|有，与本人关系： |__|父亲 |__|母亲 |__|兄弟姐妹（患病_____人）
|__|不详

五、既往病史及控制情况

5.1 脑血管病史

脑血管病史：|__|无

|__|有，脑血管病类型：|__|脑梗死 |__|脑出血 |__|蛛网膜下腔出血|__|短暂性脑缺血发作（TIA）

发病次数：_____次

首次发病时间：|__|__|__|__|年

就诊机构级别：|__|省级医院 |__|地市级医院 |__|县级医院 |__|社区或乡镇卫生机构

主要诊断：|__|脑梗死 |__|脑出血 |__|蛛网膜下腔出血 |__|短暂性脑缺血发作（TIA）

住院期间是否接受康复治疗：|__|否 |__|是

出院后是否接受康复治疗：|____|否 |____|是

末次发病时间：|__|__|__|__|年

就诊机构级别：|__|省级医院 |__|地市级医院 |__|县级医院 |__|社区或乡镇卫生机构

主要诊断：|__|脑梗死 |__|脑出血 |__|蛛网膜下腔出血 |__|短暂性脑缺血发作（TIA）

住院期间是否接受康复治疗：|__|否 |__|是

出院后是否接受康复治疗：|____|否 |____|是

5.2 心脏病史

心脏病史：|__|无

|__|有， 心脏病类型：|__|冠心病 (|__|心绞痛、 |__|心肌梗死、|__|无症状冠脉狭窄)

|__|房颤（|__|阵发型 |__|持续性 |__|未知）

|__|瓣膜性心脏病

|__|其他 (_____)

|__|具体不详

如有冠心病，发病次数：_____次

冠心病首次确诊时间：|__|__|__|__|年

就诊机构级别：|__|省级医院 |__|地市级医院 |__|县级医院 |__|社区或乡镇卫生机构

冠心病末次发病时间：|__|__|__|__|年

就诊机构级别：|__|省级医院 |__|地市级医院 |__|县级医院 |__|社区或乡镇卫生机构

如果有房颤：首次确诊时间：|__|__|__|__|年

是否服用抗栓药物：|__|否

|__|是， 用药品种：|__|华法林 |__|新型抗凝剂 |__|阿司匹林

|__|氯吡格雷 |__|其他

用药年限： 年， 用药情况：|____|规律 |____|不规律

5.3 高血压

本次调查期间血压测量频率：|__|从未测量 |__|经常测量（每周至少 1 次） |__|偶尔测量

是否家庭自测血压：|__|否

|__|偶尔测量

|__|经常测量： 测量频率：_____次/周

既往有无被诊断为高血压：|__|无

|__|有，确诊时间：|__|__|__|__|年

是否服用降压药：|__| 否 |__|是

用药种类：|____|利尿药 |____|钙拮抗剂 |____|β受体阻滞剂

|____|α受体阻滞剂　　|____|α，β受体阻滞剂

|____|ACEI　　|____|ARB　　|____|其他

用药年限：_____年，用药情况：|____|规律　|____|不规律

血压控制情况：|____|达标　|____|不达标　|____|不清楚

5.4 血脂异常

血脂测量频率：|__|从未检测　|__|定期检测　|__|偶尔检测（每年检测不足 1 次）

既往有无被诊断为血脂异常：|__|无

|__|有，确诊时间：|__|__|__|__|年

血脂异常类型：|__|高胆固醇　|__|高甘油三酯　|__|高 LDL-C

|__|低 HDL-C　|__|不详

是否服用调脂药：|__|否

|__|是：|__|他汀类　|__|贝特类　|__|其他

5.5 糖尿病

血糖测量频率：|__|从未检测　|__|定期检测　|__|偶尔检测（每年检测不足 1 次）

既往有无被诊断为糖尿病：|__|无

|__|有，确诊时间：|__|__|__|__|年

是否应用降糖药：|__|否

|__|是：|__|服降糖药　|__|胰岛素　|__|其他

血糖控制情况：|____|基本达标　|____|未达标　|____|不清楚

六、体格检查信息

6.1 一般体征　筛查员：

检查时间：|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日

身高：_____cm　　体重：_____kg　　BMI：_____ (kg/m^2)

腰围：_____cm　　颈围：_____cm

6.2 现测血压（同侧，需测量 2 次）　筛查员：

测量时间：|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日

第一次，收缩压 SBP：_____mmHg　舒张压 DBP：_____mmHg　脉搏：_____次/分

第二次，收缩压 SBP：_____mmHg　舒张压 DBP：_____mmHg　脉搏：_____次/分

6.3 心脏听诊　筛查员：

检查时间：|__|__|__|__|年|__|__|月|__|__|日

心脏杂音：|__|无　|__|有

心　　律：|__|整齐　|__|不齐

七、脑卒中风险评级

1	高血压：　|____|有　|____|无

2	血脂异常：	|____|有	|____|无
3	糖尿病：	|____|有	|____|无
4	房颤或瓣膜性心脏病：	|____|有	|____|无
5	吸烟史：	|____|有	|____|无
6	明显超重或肥胖：	|____|有	|____|无
7	运动缺乏：	|____|有	|____|无
8	脑卒中家族史：	|____|有	|____|无

八、风险分级标准

风险因素	低危描述	中危描述	高危描述
慢性疾病病史	无任何慢性疾病病史	有慢性疾病病史，但病情得到良好控制	有多种慢性疾病病史，病情控制不佳
生活习惯	不吸烟、不频繁饮酒、规律运动、均衡饮食	少量不健康生活习惯（偶尔吸烟或饮酒、偶尔运动）	多个不健康生活习惯（经常吸烟和饮酒、缺乏运动、不健康饮食）
体征	正常血压、正常BMI、腰围正常	大体正常或轻度异常（轻微血压升高、BMI略高、腰围略增大）	异常（高血压、肥胖或中心性肥胖）
家族史	无脑卒中、冠心病、高血压、糖尿病患者	家族中有患病但数量不多（1-2位患病亲属）	家族中多位患病亲属
既往疾病史及控制情况	无脑血管病史、心脏病史、未诊断高血压、血脂异常或糖尿病	有既往疾病史，但病情得到良好控制，包括血压、血脂、血糖等指标	有多次或严重的疾病发作史，包括脑血管病、心脏病等，且病情控制不佳
脑卒中风险评级问答反馈	所有问题的回答均指向低风险因素	部分问题的回答指向中危风险因素	多个问题的回答指向高危风险因素

九、综合评分规则设计

9.1 评分标准：

慢性病病史：低危=1分，中危=2分，高危=3分

生活习惯：低危=1分，中危=2分，高危=3分

体征：低危=1分，中危=2分，高危=3分

家族史：低危=1分，中危=2分，高危=3分

既往疾病史及控制情况：低危=1分，中危=2分，高危=3分

9.2 总分计算：

每个类别的分数相加，得出总分。总分的范围为5（所有类别均为低危）至15（所有类别均为高危）。

9.3 风险等级划分：

5-7 分：整体低危

8-11 分：整体中危

12-15 分：整体高危

9.4 规则应用：

个体按照上述评分标准在每个风险因素上进行评估。

将每个因素的分数相加以得出总分。

根据总分，将个体归入相应的风险等级。

9.5 示例：

一个个体在慢性病病史（1 分）、生活习惯（2 分）、体征（1 分）、家族史（1 分）、既往疾病史及控制情况（2 分）上的评分分别为：这将给出一个总分为 7 分，根据风险等级划分，该个体被归类为整体低危。