#### A.03.04 – Modelos de Propriedades Energéticas

(Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-06-03 18h51m44s UTC







- Modelos de Propriedades Energéticas
  - Energia Interna e Entalpia

2 Tópicos de Leitura







O sistema fechado de massa m, ilustrado:

• Recebe uma diferencial de calor a volume constante,  $(\delta q)_V$ ;









#### O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a volume constante,  $(\delta q)_V$ ;
- $m \in V$  constantes implicam em  $v \equiv V/m$  constante, tal que  $(\delta q)_V = (\delta q)_V$ ;










#### O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a volume constante,  $(\delta q)_V$ ;
- $m \in V$  constantes implicam em  $v \equiv V/m$  constante, tal que  $(\delta q)_V = (\delta q)_V$ ;
- A temperatura experimenta uma variação de  $(dT)_{v}$ .

















$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$










$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$
  $\rightarrow$   $(\delta q)_v = du.$ 










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist} \quad \neg$$
$$(\delta q)_v = du.$$

Assim, o calor transferido a volume constante a um sistema fechado é a variação de sua energia interna!










Define-se o calor específico a volume constante da substância do sistema,  $c_v$ , como

$$c_{v} \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v},$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.










Define-se o calor específico a volume constante da substância do sistema,  $c_v$ , como

$$c_{v} \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v},$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.

Ainda,  $C_v = (\partial U/\partial T)_v = mc_v$  é a capacidade térmical a volume constante do sistema.










#### Entalpia – Relação com Temperatura

O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:

• Recebe uma diferencial de calor a pressão constante,  $(\delta q)_P$ ;








#### Entalpia – Relação com Temperatura

O sistema fechado de massa m, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a pressão constante,  $(\delta q)_P$ ;
- Realiza uma diferencial de trabalho a pressão constante,  $(\delta w)_P = P dv$ ;










#### Entalpia – Relação com Temperatura

O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:


- Recebe uma diferencial de calor a pressão constante,  $(\delta q)_P$ ;
- Realiza uma diferencial de trabalho a pressão constante,  $(\delta w)_P = P dv$ ;
- A temperatura experimenta uma variação de  $(dT)_P$ , possivelmente diferente de  $(dT)_v$ .


















$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$









$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist} \quad \neg$$
$$(\delta q)_P - (\delta w)_P = du$$










$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist} \rightarrow$$

$$(\delta q)_P - (\delta w)_P = du \rightarrow$$

$$(\delta q)_P = du + P dv = d(u + Pv).$$










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist} \quad \neg$$

$$(\delta q)_P - (\delta w)_P = du \quad \neg$$

$$(\delta q)_P = du + P dv = \frac{d(u + Pv)}{d}.$$

A quantidade (u + Pv) aparece frequentemente o suficiente para ser definida como uma nova propriedade.










Assim,

$$H \equiv U + PV$$
 [kJ], e










Assim,

$$H \equiv U + PV$$
 [kJ], e  
 $h \equiv u + Pv$  [kJ/kg],










Assim,

$$H \equiv U + PV$$
 [kJ], e  
 $h \equiv u + Pv$  [kJ/kg],

são a entalpia e a entalpia específica, respectivamente: novas propriedades termodinâmicas.










O termo origina do verbo grego "ενθάλπω", que significa: "(eu) aqueço", conforme a própria ilustração.










O termo origina do verbo grego "ενθάλπω", que significa: "(eu) aqueço", conforme a própria ilustração.

Da expressão  $(\delta q)_P = dh$ , tem-se que o calor transferido a pressão constante a um sistema fechado é a variação de sua entalpia!










Define-se o calor específico a pressão constante da substância do sistema,  $c_P$ , como

$$c_P \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P,$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.










Define-se o calor específico a pressão constante da substância do sistema,  $c_P$ , como

$$c_P \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P,$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.

Ainda,  $C_P = (\partial H/\partial T)_P = m c_P$  é a capacidade térmical a pressão constante do sistema.









## Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A.

Termodinâmica 7ª Edição. Seções 4-3 a 4-5.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.





