### A.03.03 – Balanço de Energia

(Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-04-09 19h04m20s







- Balanço de Energia
  - Primeira Lei da Termodinâmica
  - Balanço de Energia

2 Tópicos de Leitura





#### Enunciado

- A 1ª lei da Termodinâmica estabelece que:
  - Energia é uma quantidade conservada.







#### Enunciado

- A 1ª lei da Termodinâmica estabelece que:
  - Energia é uma quantidade conservada.

Este princípio da conservação da energia:

• É exaustivamente confirmado em experimentos.





Logo, no universo observável:

• Não há processos físicos que criem energia,







#### Logo, no universo observável:

- Não há processos físicos que criem energia,
- Nem processos físicos que destruam energia.





#### Logo, no universo observável:

- Não há processos físicos que criem energia,
- Nem processos físicos que destruam energia.
- Processos físicos podem apenas converter energia de uma forma a outra.







#### Logo, no universo observável:

- Não há processos físicos que criem energia,
- Nem processos físicos que destruam energia.
- Processos físicos podem apenas converter energia de uma forma a outra.

#### A Relatividade Especial de Einstein:

• Unificou as conservações de massa e de energia;





#### Logo, no universo observável:

- Não há processos físicos que criem energia,
- Nem processos físicos que destruam energia.
- Processos físicos podem apenas converter energia de uma forma a outra.

#### A Relatividade Especial de Einstein:

- Unificou as conservações de massa e de energia;
- Através da equivalência massa-energia expressa por  $E_{eq} = c^2 m$ .







#### Logo, no universo observável:

- Não há processos físicos que criem energia,
- Nem processos físicos que destruam energia.
- Processos físicos podem apenas converter energia de uma forma a outra.

#### A Relatividade Especial de Einstein:

- Unificou as conservações de massa e de energia;
- Através da equivalência massa-energia expressa por  $E_{eq} = c^2 m$ .
- Assim, a quantidade  $E_{tot} = c^2 m + E_{outras}$  do universo é conservada.





A 1ª lei é central em Termodinâmica. Suas aplicações são vastas e incluem:

• Princípio em variedade de deduções;







A 1<sup>a</sup> lei é central em Termodinâmica. Suas aplicações são vastas e incluem:

- Princípio em variedade de deduções;
- Instrumental na definição de propriedades.







A 1ª lei é central em Termodinâmica.

Suas aplicações são vastas e incluem:

- Princípio em variedade de deduções;
- Instrumental na definição de propriedades.
- Cálculos de processos energéticos.





A 1<sup>a</sup> lei é central em Termodinâmica. Suas aplicações são vastas e incluem:

- Princípio em variedade de deduções;
- Instrumental na definição de propriedades.
- Cálculos de processos energéticos.

Exemplo: O que é, afinal, "energia"?







A 1<sup>a</sup> lei é central em Termodinâmica. Suas aplicações são vastas e incluem:

- Princípio em variedade de deduções;
- Instrumental na definição de propriedades.
- Cálculos de processos energéticos.

Exemplo: O que é, afinal, "energia"?

— Jack P. Holman (SMU)





A 1ª lei é central em Termodinâmica. Suas aplicações são vastas e incluem:

- Princípio em variedade de deduções;
- Instrumental na definição de propriedades.
- Cálculos de processos energéticos.

Exemplo: O que é, afinal, "energia"?

• "Energia é uma quantidade (escalar)

— Jack P. Holman (SMU)







A 1<sup>a</sup> lei é central em Termodinâmica. Suas aplicações são vastas e incluem:

- Princípio em variedade de deduções;
- Instrumental na definição de propriedades.
- Cálculos de processos energéticos.

Exemplo: O que é, afinal, "energia"?

- "Energia é uma quantidade (escalar)
- que é conservada na natureza

— Jack P. Holman (SMU)







A 1ª lei é central em Termodinâmica. Suas aplicações são vastas e incluem:

- Princípio em variedade de deduções;
- Instrumental na definição de propriedades.
- Cálculos de processos energéticos.

Exemplo: O que é, afinal, "energia"?

- "Energia é uma quantidade (escalar)
- que é conservada na natureza
- e que possui unidades de kg·m<sup>2</sup>/s<sup>2</sup>."
  - Jack P. Holman (SMU)







A 1<sup>a</sup> lei é matematicamente expressa por meio de balanço de energia.





40 + 40 + 43 + 43 +

A 1<sup>a</sup> lei é matematicamente expressa por meio de balanço de energia.







A 1<sup>a</sup> lei é matematicamente expressa por meio de balanço de energia.







A 1<sup>a</sup> lei é matematicamente expressa por meio de balanço de energia.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Total de energia que} \\ \text{entra no sistema} \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} \text{Total de energia} \\ \text{que sai do sistema} \end{array}\right) =$$





A 1<sup>a</sup> lei é matematicamente expressa por meio de balanço de energia.

$$\left(\begin{array}{c} \text{Total de energia que} \\ \text{entra no sistema} \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} \text{Total de energia} \\ \text{que sai do sistema} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} \text{Variação líquida de} \\ \text{energia no sistema} \end{array}\right),$$





A 1<sup>a</sup> lei é matematicamente expressa por meio de balanço de energia.

Em um processo, o balanço de energia é dado por:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Total de energia que} \\ \text{entra no sistema} \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} \text{Total de energia} \\ \text{que sai do sistema} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} \text{Variação l\'iquida de} \\ \text{energia no sistema} \end{array}\right),$$

que matematicamente se escreve:

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$
, para um processo 1–2.





A 1<sup>a</sup> lei é matematicamente expressa por meio de balanço de energia.

Em um processo, o balanço de energia é dado por:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Total de energia que} \\ \text{entra no sistema} \end{array}\right) - \left(\begin{array}{c} \text{Total de energia} \\ \text{que sai do sistema} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} \text{Variação l\'iquida de} \\ \text{energia no sistema} \end{array}\right),$$

que matematicamente se escreve:

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$
, para um processo 1–2.

Assim, se  $E_1$ ,  $E_{ent}$  e  $E_{sai}$  são conhecidos, então:  $E_2 = E_1 + E_{ent} - E_{sai}$ .





Processo

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$





<ロト <回り < 重り < 重り

Processo 
$$\frac{d(}{}$$

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$





Processo

$$\xrightarrow{d()}$$

Diferencial

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$
  $\xrightarrow{d()}$   $\delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist}$ 





Processo 
$$\xrightarrow{d()}$$
 Diferencial  $\xrightarrow{/d}$ 

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1 \qquad \xrightarrow{d()} \qquad \delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist} \qquad \xrightarrow{/dt}$$





Processo 
$$\xrightarrow{d()}$$
 Diferencial  $\xrightarrow{/dt}$  Taxa

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1 \qquad \xrightarrow{d()} \qquad \delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist} \qquad \xrightarrow{/dt} \qquad \dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \left. \frac{dE}{dt} \right|_{sist}$$





Processo 
$$\xrightarrow{d()}$$
 Diferencial  $\xrightarrow{/dt}$  Taxa
$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1 \qquad \xrightarrow{d()} \qquad \delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist} \qquad \xrightarrow{/dt} \qquad \dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \left. \frac{dE}{dt} \right|_{sist}$$

(int.) 
$$\downarrow \div m$$





Processo

$$\xrightarrow{d()}$$

Diferencial

$$\xrightarrow{/dt}$$

Taxa

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$

$$\xrightarrow{d()}$$

$$\xrightarrow{/dt}$$

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$
  $\xrightarrow{d()}$   $\delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist}$   $\xrightarrow{/dt}$   $\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \left. \frac{dE}{dt} \right|_{sist}$ 

$$\downarrow \div m$$

$$e_{ent} - e_{sai} = \Delta e_{sist} = e_2 - e_1$$





$$\xrightarrow{d()}$$

Diferencial

$$\xrightarrow{/dt}$$

Taxa

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$
  $\xrightarrow{d()}$   $\delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist}$   $\xrightarrow{/dt}$   $\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \frac{dE}{dt}$ 

$$\xrightarrow{d()}$$

$$\xrightarrow{/dt}$$

$$\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \left. \frac{dE}{dt} \right|_{s}$$

$$\downarrow \div m$$

$$\downarrow \div m$$

$$e_{ent} - e_{sai} = \Delta e_{sist} = e_2 - e_1 \qquad \xrightarrow{d()}$$





$$\xrightarrow{d()}$$

Diferencial

$$\xrightarrow{/dt}$$

Taxa

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$$
  $\xrightarrow{d()}$   $\delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist}$   $\xrightarrow{/dt}$   $\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \frac{dE}{dt}$ 

$$\xrightarrow{d()}$$

$$\delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist}$$

$$\xrightarrow{/ai}$$

$$\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \frac{dE}{dt} \Big|_{sai}$$

$$| \div m$$

$$\downarrow \div m$$

$$e_{ent} - e_{sai} = \Delta e_{sist} = e_{sist}$$

$$\xrightarrow{d()}$$

$$e_{ent} - e_{sai} = \Delta e_{sist} = e_2 - e_1$$
  $\xrightarrow{d()}$   $\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$ 





Processo 
$$\xrightarrow{d()}$$
 Differencial  $\xrightarrow{/dt}$  Taxa
$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1 \qquad \xrightarrow{d()} \qquad \delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist} \qquad \xrightarrow{/dt} \qquad \dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \frac{dE}{dt} \Big|_{sist}$$

 $\downarrow \div m$ 

$$e_{ent} - e_{sai} = \Delta e_{sist} = e_2 - e_1$$
  $\xrightarrow{d()}$   $\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$   $\xrightarrow{/dt}$ 



(int.)



 $\downarrow \div m$ 

Processo 
$$\xrightarrow{d()}$$
 Differencial  $\xrightarrow{/dt}$  Taxa
$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1 \xrightarrow{d()} \delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist} \xrightarrow{/dt} \dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \frac{dE}{dt} \Big|_{sist}$$
(int.)  $\downarrow \div m$   $\downarrow \div m$   $\downarrow \div m$ 

 $e_{ent} - e_{sai} = \Delta e_{sist} = e_2 - e_1$   $\xrightarrow{d()}$   $\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$   $\xrightarrow{/dt}$   $\dot{e}_{ent} - \dot{e}_{sai} = \frac{de}{dt}\Big|_{sist}$ 





## Balanço de Energia – Formas

Processo	$\xrightarrow{d()}$	Diferencial	$\xrightarrow{/dt}$	Taxa
$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sist} = E_2 - E_1$	$\xrightarrow{d()}$	$\delta E_{ent} - \delta E_{sai} = dE_{sist}$	$\xrightarrow{/dt}$	$\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = \left. \frac{dE}{dt} \right _{sist}$
(int.) $\downarrow \div m$		<i>↓</i> ÷ <i>m</i>		$\mid \div m$
$e_{ent} - e_{sai} = \Delta e_{sist} = e_2 - e_1$	$\xrightarrow{d()}$	$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$	$\xrightarrow{/dt}$	$\dot{e}_{ent} - \dot{e}_{sai} = \left. \frac{de}{dt} \right _{sist}$





イロト イプト イミト イミト

Em sistemas compressíveis simples,  $E_{ent}$  e  $E_{sai}$  podem ser apenas nas formas de:





Em sistemas compressíveis simples,  $E_{ent}$  e  $E_{sai}$  podem ser apenas nas formas de:

calor e





Em sistemas compressíveis simples,  $E_{ent}$  e  $E_{sai}$  podem ser apenas nas formas de:

- calor e
- 2 trabalho.





Em sistemas compressíveis simples,  $E_{ent}$  e  $E_{sai}$  podem ser apenas nas formas de:

- calor e
- 2 trabalho.

Assim, no balanço de energia:





Em sistemas compressíveis simples,  $E_{ent}$  e  $E_{sai}$  podem ser apenas nas formas de:

- calor e
- 2 trabalho.

Assim, no balanço de energia:

$$E_{ent} = Q_{ent} + W_{ent},$$





Em sistemas compressíveis simples,  $E_{ent}$  e  $E_{sai}$  podem ser apenas nas formas de:

- calor e
- 2 trabalho.

Assim, no balanço de energia:

$$E_{ent} = Q_{ent} + W_{ent},$$

$$E_{sai} = Q_{sai} + W_{sai}$$
.









Em sistemas clássicos (pré-relativísticos) não reativos,  $E_{sist} = E_{micro} + E_{macro}$ :

①  $E_{micro} \equiv U_{sist}$ , a energia interna, em kJ;





- ①  $E_{micro} \equiv U_{sist}$ , a energia interna, em kJ;
- ②  $E_{macro} = E_c + E_p$ , a soma das energias cinética, e potencial, em kJ, onde:





- ①  $E_{micro} \equiv U_{sist}$ , a energia interna, em kJ;
- ②  $E_{macro} = E_c + E_p$ , a soma das energias cinética, e potencial, em kJ, onde:
- **3**  $E_c = m \mathbb{V}^2 / 2$ , com  $[\![ \mathbb{V} \!]\!] = \sqrt{k J / k g} = \sqrt{1000} \text{ m/s} \approx 31.62 \text{ m/s}$ , ou





- ①  $E_{micro} \equiv U_{sist}$ , a energia interna, em kJ;
- ②  $E_{macro} = E_c + E_p$ , a soma das energias cinética, e potencial, em kJ, onde:
- **3**  $E_c = m \mathbb{V}^2 / 2$ , com  $[\![ \mathbb{V} \!]\!] = \sqrt{k J / k g} = \sqrt{1000} \text{ m/s} \approx 31.62 \text{ m/s}$ , ou
- **4**  $E_c = m v^2 / 2000$ , com  $[v] = m/s = \sqrt{J/kg}$ ;





- ①  $E_{micro} \equiv U_{sist}$ , a energia interna, em kJ;
- ②  $E_{macro} = E_c + E_p$ , a soma das energias cinética, e potencial, em kJ, onde:
- **3**  $E_c = m \mathbb{V}^2 / 2$ , com  $[\![ \mathbb{V} \!]\!] = \sqrt{k J / k g} = \sqrt{1000} \text{ m/s} \approx 31.62 \text{ m/s}$ , ou
- **4**  $E_c = m v^2 / 2000$ , com  $[v] = m/s = \sqrt{J/kg}$ ;





- ①  $E_{micro} \equiv U_{sist}$ , a energia interna, em kJ;
- ②  $E_{macro} = E_c + E_p$ , a soma das energias cinética, e potencial, em kJ, onde:
- **3**  $E_c = m \mathbb{V}^2 / 2$ , com  $[\![ \mathbb{V} \!]\!] = \sqrt{k J / k g} = \sqrt{1000} \text{ m/s} \approx 31.62 \text{ m/s}$ , ou
- **4**  $E_c = m v^2 / 2000$ , com  $[v] = m/s = \sqrt{J/kg}$ ;
- **6**  $E_p = mg\mathbb{Z}/1000$ , com  $[\![g]\!] = m/s^2$  e  $[\![\mathbb{Z}]\!] = m$ .





#### Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A.

Termodinâmica 7ª Edição. Seções 2-6 e 4-2.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.





