### A.03.02 – Processos Politrópicos

(Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-04-03 18h37m34s







- Processos Politrópicos
  - Apresentação
  - Resultados

2 Tópicos de Leitura







É todo o processo para o qual:

$$Pv^n = \text{const.}$$





40 + 40 + 43 + 43 +

É todo o processo para o qual:

$$Pv^n = \text{const.}$$

Onde:

• P é a pressão do sistema





40 + 40 + 43 + 43 +

É todo o processo para o qual:

$$Pv^n = \text{const.}$$

#### Onde:

- P é a pressão do sistema
- v é o volume específico do sistema





É todo o processo para o qual:

$$Pv^n = \text{const.}$$

#### Onde:

- P é a pressão do sistema
- v é o volume específico do sistema
- *n* é o expoente politrópico





É todo o processo para o qual:

$$Pv^n = \text{const.}$$

A equação é utilizada na forma:

$$P_1v_1^n = P_2v_2^n$$

#### Onde:

- P é a pressão do sistema
- v é o volume específico do sistema
- n é o expoente politrópico







Em processos politrópicos,

• um parâmetro de processo, n, é mantido constante





Em processos politrópicos,

- um parâmetro de processo, *n*, é mantido constante
- e não necessariamente uma propriedade do sistema.







Em processos politrópicos,

- um parâmetro de processo, *n*, é mantido constante
- e não necessariamente uma propriedade do sistema.
- porém uma propriedade pode ficar constante, como veremos.





Em processos politrópicos,

- um parâmetro de processo, n, é mantido constante
- e não necessariamente uma propriedade do sistema.
- porém uma propriedade pode ficar constante, como veremos.

Um exemplo trivial é reconhecer que para n = 0, tem-se:







Em processos politrópicos,

- um parâmetro de processo, n, é mantido constante
- e não necessariamente uma propriedade do sistema.
- porém uma propriedade pode ficar constante, como veremos.

Um exemplo trivial é reconhecer que para n = 0, tem-se:

$$Pv^0 = \text{const.} \rightarrow P = \text{const.}$$





$$Pv^n = \text{const.}$$





$$Pv^n = c_1$$





$$\log\left(Pv^n=c_1\right) \to$$





$$\log\left(Pv^n=c_1\right) \to$$

$$\log(Pv^n) = \log(c_1) \equiv c_2 \rightarrow$$





40 + 40 + 43 + 43 +

$$\log (Pv^n = c_1) \rightarrow \log(Pv^n) = \log(c_1) \equiv c_2 \rightarrow \log(Pn) \log v = c_2 \rightarrow 0$$





$$\log (Pv^n = c_1) \rightarrow \log(Pv^n) = \log(c_1) \equiv c_2 \rightarrow \log(Pn) \log v = c_2 \rightarrow \log(Pn) \log v$$





$$\log (Pv^n = c_1) \rightarrow \log(Pv^n) = \log(c_1) \equiv c_2 \rightarrow \log Pn \log v = c_2 \rightarrow \log P = c_2 - n \log v \qquad \therefore \qquad \text{uma equação na forma}$$





$$\log (Pv^n = c_1) \rightarrow$$

$$\log (Pv^n) = \log(c_1) \equiv c_2 \rightarrow$$

$$\log Pn \log v = c_2 \rightarrow$$

$$\log P = c_2 - n \log v \qquad \therefore \qquad \text{uma equação na forma}$$


$$y = A + Bx \qquad \text{para } y \equiv \log P, \quad x \equiv \log v, \quad \text{etc.}$$





#### Assim:

- Todo processo politrópico
- é representado por um segmento de reta
- que une os estados inicial e final
- em coordenadas  $\log P \times \log v$ .









Segundo (Chantraine, 1968), o termo "politrópico":

• origina do grego "πολύτροπος", o qual é composto de "πολύς" e de "τρόπος".





- origina do grego "πολύτροπος", o qual é composto de "πολύς" e de "τρόπος".
- "πολύς" inclui significados de « nombreux, vaste », a saber, "numeroso, vasto".







- origina do grego "πολύτροπος", o qual é composto de "πολύς" e de "τρόπος".
- o "πολύς" inclui significados de « nombreux, vaste », a saber, "numeroso, vasto".
- "τρόπος" inclui significados de « manière, mode », a saber, "maneira, modo".







- origina do grego "πολύτροπος", o qual é composto de "πολύς" e de "τρόπος".
- o "πολύς" inclui significados de « nombreux, vaste », a saber, "numeroso, vasto".
- "τρόπος" inclui significados de « manière, mode », a saber, "maneira, modo".
- Ou seja: "muitas formas ou maneiras". O termo composto







- origina do grego "πολύτροπος", o qual é composto de "πολύς" e de "τρόπος".
- "πολύς" inclui significados de « nombreux, vaste », a saber, "numeroso, vasto".
- "τρόπος" inclui significados de « manière, mode », a saber, "maneira, modo".
- Ou seja: "muitas formas ou maneiras". O termo composto
- "πολύτροπος" inclui significados de « souple, très varié »: "flexível, muito variado",







- origina do grego "πολύτροπος", o qual é composto de "πολύς" e de "τρόπος".
- o "πολύς" inclui significados de « nombreux, vaste », a saber, "numeroso, vasto".
- "τρόπος" inclui significados de « manière, mode », a saber, "maneira, modo".
- Ou seja: "muitas formas ou maneiras". O termo composto
- "πολύτροπος" inclui significados de « souple, très varié »: "flexível, muito variado",
- indicando flexibilidade e a vasta variedade de processos que pode representar!





$$Pv^n = c_1$$





$$Pv^n = c_1 = P_1v_1^n = P_2v_2^n -$$





40 + 40 + 43 + 43 +

$$Pv^{n} = c_{1} = P_{1}v_{1}^{n} = P_{2}v_{2}^{n} \rightarrow P = c_{1}v^{-n};$$





$$Pv^{n} = c_{1} = P_{1}v_{1}^{n} = P_{2}v_{2}^{n} \rightarrow P = c_{1}v^{-n};$$

$$w_f = \int_1^2 P \, dv \rightarrow$$





40 + 40 + 43 + 43 +

$$Pv^{n} = c_{1} = P_{1}v_{1}^{n} = P_{2}v_{2}^{n} \rightarrow$$

$$P = c_{1}v^{-n};$$

$$w_{f} = \int_{1}^{2} P dv \rightarrow$$

$$w_{f} = c_{1} \int_{1}^{2} v^{-n} dv \rightarrow$$





$$Pv^{n} = c_{1} = P_{1}v_{1}^{n} = P_{2}v_{2}^{n} \rightarrow$$

$$P = c_{1}v^{-n};$$

$$w_{f} = \int_{1}^{2} P dv \rightarrow$$

$$w_{f} = c_{1} \int_{1}^{2} v^{-n} dv \rightarrow$$

$$w_{f} = P_{1}v_{1}^{n} \int_{1}^{2} v^{-n} dv.$$





$$Pv^{n} = c_{1} = P_{1}v_{1}^{n} = P_{2}v_{2}^{n} \rightarrow$$

$$P = c_{1}v^{-n};$$

$$w_{f} = \int_{1}^{2} P dv \rightarrow$$

$$w_{f} = c_{1} \int_{1}^{2} v^{-n} dv \rightarrow$$

 $w_f = P_1 v_1^n \int_1^2 v^{-n} dv.$ 

A integração de  $v^{-n}$  toma formas diferentes dependendo se n=1 ou não:







$$Pv^{n} = c_{1} = P_{1}v_{1}^{n} = P_{2}v_{2}^{n} \rightarrow$$

$$P = c_{1}v^{-n};$$

$$w_{f} = \int_{1}^{2} P dv \rightarrow$$

$$w_{f} = c_{1} \int_{1}^{2} v^{-n} dv \rightarrow$$

$$w_{f} = P_{1}v_{1}^{n} \int_{1}^{2} v^{-n} dv.$$

A integração de  $v^{-n}$  toma formas diferentes dependendo se n = 1 ou não:

$$w_f = egin{cases} rac{P_2 v_2 - P_1 v_1}{1 - n} & ext{para } n 
eq 1, \ P v \ln \left( rac{v_2}{v_1} 
ight) & ext{para } n = 1. \end{cases}$$







$$Pv^{n} = c_{1} = P_{1}v_{1}^{n} = P_{2}v_{2}^{n} \rightarrow$$

$$P = c_{1}v^{-n};$$

$$w_{f} = \int_{1}^{2} P dv \rightarrow$$

$$w_{f} = c_{1} \int_{1}^{2} v^{-n} dv \rightarrow$$

$$w_{f} = P_{1}v_{1}^{n} \int_{1}^{2} v^{-n} dv.$$

A integração de  $v^{-n}$  toma formas diferentes dependendo se n = 1 ou não:

$$w_f = egin{cases} rac{P_2 v_2 - P_1 v_1}{1-n} & ext{para } n 
eq 1, \ P v \ln \left( rac{v_2}{v_1} 
ight) & ext{para } n = 1. \end{cases}$$

No último caso, o produto Pv pode ser tanto  $P_1v_1$  ou  $P_2v_2$ , em função do próprio processo.





# Processos Politrópicos – Aplicações

- Medições  $P \times v$  frequentemente seguem relações politrópicas
- •
- •
- •





O termo "politrópico"

- •
- .

- .





O termo "politrópico"

- •
- .

- .





## Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A. *Termodinâmica* 7<sup>a</sup> *Edição*. Seção 4-1.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.







