#### A.03.04 – Modelos de Propriedades Energéticas

(Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-06-03 16h48m53s UTC





- Modelos de Propriedades Energéticas
  - Energia Interna
  - Entalpia

2 Tópicos de Leitura








O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:

• Recebe uma diferencial de calor a volume constante:  $(\delta q)_V$ ;









#### O sistema fechado de massa m, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a volume constante:  $(\delta q)_V$ ;
- $m \in V$  constantes implicam em  $v \equiv V/m$  constante, tal que  $(\delta q)_V = (\delta q)_V$ ;










O sistema fechado de massa m, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a volume constante:  $(\delta q)_V$ ;
- m e V constantes implicam em  $v \equiv V/m$  constante, tal que  $(\delta q)_V = (\delta q)_v$ ;
- A temperatura experimenta uma variação de  $(dT)_{y}$ .










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$
  $\rightarrow$   $(\delta q)_{v} = du.$ 










O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$
  $\rightarrow$   $(\delta q)_v = du.$ 

Assim, o calor transferido a volume constante a um sistema fechado é a variação de sua energia interna!










Define-se










Define-se

$$c_{v} \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v},$$










Define-se

$$c_{\scriptscriptstyle \mathcal{V}} \equiv \left(rac{\partial u}{\partial T}
ight)_{\scriptscriptstyle \mathcal{V}},$$

denominado de calor específico a volume constante da substância do sistema. Ainda,










Define-se

$$c_{\scriptscriptstyle \mathcal{V}} \equiv \left(rac{\partial u}{\partial T}
ight)_{\scriptscriptstyle \mathcal{V}},$$

denominado de calor específico a volume constante da substância do sistema. Ainda,  $C_v = (\partial U/\partial T)_v = mc_v$  é a capacidade térmical a volume constante do sistema.










# Entalpia – Relação com Temperatura

Filler...









## Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A.

Termodinâmica 7ª Edição. Seções 4-3 a 4-5.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.





