C.01.01.Z1 – Biblioteca Simplificada de Gás Ideal

Aplicação em FTHA – Finite Time Heat Addition Otto Engine Model

Prof. C. Naaktgeboren, PhD

https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci

Compiled on 2020-09-14 23h58m00s UTC

Equação de Estado (EoS): Comportamento $P - T - v$

$$Pv = RT \qquad P\bar{v} = \bar{R}T \qquad \rightharpoondown$$

Equação de Estado (EoS): Comportamento $P - T - v$

$$Pv = RT \qquad P\bar{v} = \bar{R}T$$

$$P = \frac{RT}{v} \qquad P = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}}$$

Equação de Estado (EoS): Comportamento $P - T - v$

$$Pv = RT \qquad\qquad P\bar{v} = \bar{R}T$$

$$P = \frac{RT}{v} \qquad\qquad P = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}}$$

$$T = \frac{Pv}{R} \qquad\qquad T = \frac{P\bar{v}}{\bar{R}}$$

Equação de Estado (EoS): Comportamento $P - T - v$

$$Pv = RT \qquad\qquad P\bar{v} = \bar{R}T \quad \rightharpoondown$$

$$P = \frac{RT}{v} \qquad\qquad P = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}} \quad \rightharpoondown$$

$$T = \frac{Pv}{R} \qquad\qquad T = \frac{P\bar{v}}{\bar{R}} \quad \rightharpoondown$$

$$v = \frac{RT}{P} \qquad\qquad \bar{v} = \frac{\bar{R}T}{P} \quad \therefore$$

Equação de Estado (EoS): Comportamento $P - T - v$

$$Pv = RT \qquad P\bar{v} = \bar{R}T \qquad \neg$$

$$P = \frac{RT}{v} \qquad P = \frac{\bar{R}T}{\bar{v}} \qquad \neg$$

$$T = \frac{Pv}{R} \qquad T = \frac{P\bar{v}}{\bar{R}} \qquad \neg$$

$$v = \frac{RT}{P} \qquad \bar{v} = \frac{\bar{R}T}{P} \qquad \therefore$$

Cada equação com forma nas bases mássica, e molar, com $R = \bar{R}/M$ — armazenar $\bar{R}$ e M!

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial:

$$\bar{c}_p(T) = \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \rightharpoondown$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial:

$$\bar{c}_p(T) = \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial:

$$\bar{c}_p(T) = \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{c}_v(T) = \bar{c}_p(T) - \bar{R} = \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial:

$$\bar{c}_p(T) = \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{c}_v(T) = \bar{c}_p(T) - \bar{R} = \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$b_1 = a_1 - \bar{R}, \qquad b_{i>1} = a_{i>1} \qquad \therefore$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial:

$$\bar{c}_p(T) = \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \rightharpoonup$$

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \rightharpoonup$$

$$\bar{c}_v(T) = \bar{c}_p(T) - \bar{R} = \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \rightharpoonup$$

$$b_1 = a_1 - \bar{R}, \qquad b_{i>1} = a_{i>1} \quad \therefore$$

Armazenar a_i, T_{min} e T_{max} e saber as conversões (i) $a_i \to b_i$ e (ii) $\bar{c}_{p,v}(T) \to c_{p,v}(T)$.

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{u}(T)$

$$\bar{u}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_v(T)\, dT = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}\, dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{u}(T)$

$$\bar{u}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_v(T)\, dT = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}\, dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{u}(T)$

$$\bar{u}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_v(T)\,dT = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}\,dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Armazenar T_{ref},

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{u}(T)$

$$\bar{u}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_v(T)\,dT = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}\,dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Armazenar T_{ref},
- Compor eficientemente a soma de produtos, e

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{u}(T)$

$$\bar{u}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_v(T)\, dT = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} b_i T^{i-1}\, dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Armazenar T_{ref},
- Compor eficientemente a soma de produtos, e
- Saber as conversões $\bar{u}(T) \rightarrow u(T)$.

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{h}(T) = \bar{u}(T) + \bar{R}T$

$$\bar{h}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_p(T)\, dT + \bar{R}T_{ref} = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}\, dT + \bar{R}T_{ref}, \quad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{h}(T) = \bar{u}(T) + \bar{R}T$

$$\bar{h}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_p(T)\,dT + \bar{R}T_{ref} = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}\,dT + \bar{R}T_{ref}, \quad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{h}(T) = \left(a_1 T + \frac{a_2 T^2}{2} + \frac{a_3 T^3}{3} + \frac{a_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R}T_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

UTFPR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

CN Θ Sci

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{h}(T) = \bar{u}(T) + \bar{R}T$

$$\bar{h}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_p(T)\,dT + \bar{R}T_{ref} = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}\,dT + \bar{R}T_{ref}, \quad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \rightarrow$$

$$\bar{h}(T) = \left(a_1 T + \frac{a_2 T^2}{2} + \frac{a_3 T^3}{3} + \frac{a_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R}T_{ref}, \quad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \therefore$$

- Compor eficientemente a soma de produtos, e

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{h}(T) = \bar{u}(T) + \bar{R}T$

$$\bar{h}(T) = \int_{T_{ref}}^{T} \bar{c}_p(T)\, dT + \bar{R}T_{ref} = \int_{T_{ref}}^{T} \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-1}\, dT + \bar{R}T_{ref}, \quad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{h}(T) = \left(a_1 T + \frac{a_2 T^2}{2} + \frac{a_3 T^3}{3} + \frac{a_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R}T_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Compor eficientemente a soma de produtos, e
- Saber as conversões $\bar{h}(T) \rightarrow h(T)$.

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{s}^\circ(T)$

$$\bar{s}^\circ(T) = \int_0^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT = \int_0^{T_{ref}} \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT + \int_{T_{ref}}^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT, \quad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{s}^\circ(T)$

$$\bar{s}^\circ(T) = \int_0^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT = \int_0^{T_{ref}} \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT + \int_{T_{ref}}^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \bar{s}^\circ_{ref} + \int_{T_{ref}}^T \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-2}\,dT \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{s}^\circ(T)$

$$\bar{s}^\circ(T) = \int_0^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT = \int_0^{T_{ref}} \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT + \int_{T_{ref}}^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \bar{s}^\circ_{ref} + \int_{T_{ref}}^T \sum_{i=1}^4 a_i T^{i-2}\,dT \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \bar{s}^\circ_{ref} + \left(a_1 \ln(T) + a_2 T + \frac{a_3 T^2}{2} + \frac{a_4 T^3}{3}\right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{s}^\circ(T)$

$$\bar{s}^\circ(T) = \int_0^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT = \int_0^{T_{ref}} \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT + \int_{T_{ref}}^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \bar{s}^\circ_{ref} + \int_{T_{ref}}^T \sum_{i=1}^4 a_i T^{i-2}\,dT \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \bar{s}^\circ_{ref} + \left(a_1 \ln(T) + a_2 T + \frac{a_3 T^2}{2} + \frac{a_4 T^3}{3}\right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Armazenar $\bar{s}^\circ_{ref}$, compor eficientemente a soma de produtos, e

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $\bar{s}^\circ(T)$

$$\bar{s}^\circ(T) = \int_0^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT = \int_0^{T_{ref}} \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT + \int_{T_{ref}}^T \frac{\bar{c}_p(T)}{T}\,dT, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \bar{s}^\circ_{ref} + \int_{T_{ref}}^T \sum_{i=1}^{4} a_i T^{i-2}\,dT \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightarrow$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \bar{s}^\circ_{ref} + \left(a_1 \ln(T) + a_2 T + \frac{a_3 T^2}{2} + \frac{a_4 T^3}{3}\right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Armazenar $\bar{s}^\circ_{ref}$, compor eficientemente a soma de produtos, e
- Saber as conversões $\bar{s}^\circ(T) \to s^\circ(T)$.

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $P_r(T)$ e $v_r(T)$

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_s = \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \qquad \left(\frac{v_2}{v_1}\right)_s = \frac{v_{r2}}{v_{r1}}$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $P_r(T)$ e $v_r(T)$

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_s = \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \qquad\qquad \left(\frac{v_2}{v_1}\right)_s = \frac{v_{r2}}{v_{r1}}$$

$$P_r(T) \equiv e^{\bar{s}^\circ(T)/\bar{R}} \qquad\qquad P_r(T) = e^{s^\circ(T)/R}$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $P_r(T)$ e $v_r(T)$

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_s = \frac{P_{r2}}{P_{r1}}$$

$$P_r(T) \equiv e^{\bar{s}^\circ(T)/\bar{R}}$$

$$v_r(T) \equiv \frac{T}{P_r(T)}.$$

$$\left(\frac{v_2}{v_1}\right)_s = \frac{v_{r2}}{v_{r1}} \qquad \longrightarrow$$

$$P_r(T) = e^{s^\circ(T)/R}$$

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $P_r(T)$ e $v_r(T)$

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_s = \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \qquad \left(\frac{v_2}{v_1}\right)_s = \frac{v_{r2}}{v_{r1}} \quad \rightharpoondown$$

$$P_r(T) \equiv e^{\bar{s}^\circ(T)/\bar{R}} \qquad P_r(T) = e^{s^\circ(T)/R}$$

$$v_r(T) \equiv \frac{T}{P_r(T)}.$$

- Sem requisitos adicionais de armazenamento!

Modelo de $\bar{c}_p(T)$ Polinomial: $P_r(T)$ e $v_r(T)$

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_s = \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \qquad\qquad \left(\frac{v_2}{v_1}\right)_s = \frac{v_{r2}}{v_{r1}} \qquad \rightharpoondown$$

$$P_r(T) \equiv e^{\bar{s}^\circ(T)/\bar{R}} \qquad\qquad P_r(T) = e^{s^\circ(T)/R}$$

$$v_r(T) \equiv \frac{T}{P_r(T)}.$$

- Sem requisitos adicionais de armazenamento!
- Sem conversões de base!

Padrões nos Cálculos:

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

Padrões nos Cálculos:

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{c}_v(T) = b_1 + b_2 T + b_3 T^2 + b_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

Padrões nos Cálculos:

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \neg$$

$$\bar{c}_v(T) = b_1 + b_2 T + b_3 T^2 + b_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \neg$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \quad \neg$$

Padrões nos Cálculos:

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{c}_v(T) = b_1 + b_2 T + b_3 T^2 + b_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{h}(T) = \left(a_1 T + \frac{a_2 T^2}{2} + \frac{a_3 T^3}{3} + \frac{a_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R} T_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

Padrões nos Cálculos:

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2T + a_3T^2 + a_4T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{c}_v(T) = b_1 + b_2T + b_3T^2 + b_4T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1T + \frac{b_2T^2}{2} + \frac{b_3T^3}{3} + \frac{b_4T^4}{4}\right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{h}(T) = \left(a_1T + \frac{a_2T^2}{2} + \frac{a_3T^3}{3} + \frac{a_4T^4}{4}\right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R}T_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \left(a_1\ln(T) + a_2T + \frac{a_3T^2}{2} + \frac{a_4T^3}{3}\right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{s}^\circ_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

Padrões nos Cálculos:

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{c}_v(T) = b_1 + b_2 T + b_3 T^2 + b_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{h}(T) = \left(a_1 T + \frac{a_2 T^2}{2} + \frac{a_3 T^3}{3} + \frac{a_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R} T_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \rightharpoondown$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \left(a_1 \ln(T) + a_2 T + \frac{a_3 T^2}{2} + \frac{a_4 T^3}{3} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{s}^\circ_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Verificação de limites;

Padrões nos Cálculos:

$$\bar{c}_p(T) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{c}_v(T) = b_1 + b_2 T + b_3 T^2 + b_4 T^3, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{u}(T) = \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{h}(T) = \left(a_1 T + \frac{a_2 T^2}{2} + \frac{a_3 T^3}{3} + \frac{a_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R} T_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \neg$$

$$\bar{s}^\circ(T) = \left(a_1 \ln(T) + a_2 T + \frac{a_3 T^2}{2} + \frac{a_4 T^3}{3} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{s}^\circ_{ref}, \qquad T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} \qquad \therefore$$

- Verificação de limites;
- Coef./func. próprios; e

Padrões nos Cálculos:

$$
\begin{aligned}
\bar{c}_p(T) &= a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3, && T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} && \neg \\
\bar{c}_v(T) &= b_1 + b_2 T + b_3 T^2 + b_4 T^3, && T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} && \neg \\
\bar{u}(T) &= \left(b_1 T + \frac{b_2 T^2}{2} + \frac{b_3 T^3}{3} + \frac{b_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T}, && T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} && \neg \\
\bar{h}(T) &= \left(a_1 T + \frac{a_2 T^2}{2} + \frac{a_3 T^3}{3} + \frac{a_4 T^4}{4} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{R} T_{ref}, && T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} && \neg \\
\bar{s}^\circ(T) &= \left(a_1 \ln(T) + a_2 T + \frac{a_3 T^2}{2} + \frac{a_4 T^3}{3} \right)_{T_{ref}}^{T} + \bar{s}^\circ_{ref}, && T_{min} \leqslant T \leqslant T_{max} && \therefore
\end{aligned}
$$

- Verificação de limites;
- Coef./func. próprios; e
- Produtos matriciais.

```julia
# Universal gas constant
R̄() = 8.314472 # ± 0.000015 # kJ/kmol·K

# Standard Tref
Tref() = 298.15 # K

# IG (Ideal Gas) structure: values for each gas instance
struct IG
    MW                      # Molecular "Weight", kg/kmol
    CP::Ntuple{4}           # Exactly 4 c̄p(T) coefficients
    Tmin                    # T_min, K
    Tmax                    # T_max, K
    sref                    # s̄°ref, kJ/kmol·K
end
```



Photo by alexandre saraiva carniato from Pexels