
Hospital San Marcos





















Caso

"Una amiga se musió en un baño de la Galesia...

Su mejor amiga le recomendó tomasse unas pastas
que le sirvieron a ella en el pasado"

>\$300.000







Protocolo en Salud Mental















Confesso Conceptos Cifras Normatividad Cédigo Libélula Butes Ateneión Estrategia y Acciones **Experiencies**











Parto
Parto







Riesgos Salud Integral

Femilyes




Personal Asistencial

Berreres de Acceso

Aborto Segurol







Espontánco Emducido



Humanización











Interrupciones métodos no seguros





PROFAMILIA



36,7% Aumento aborto Seguro (Ene-Jul)



Interrupciones seguras

10.744

0221 10.624









1 Trimestre Imberezo

75% < 9 semana 88% 12 semanas 3 de 4 Abortos

Estrato 1 - 2

75% Usuarias atendidas







Despendización Sentencia C-055 24 Semanas
Ley 599 Delito Aborto
Decreto 4444 Salud sexual y Reproductiva
Resolución 1905 Servicio del IVI
Sentencia Tela Salud Mental necesidad IVI








8<u>60ag</u> æ8













Intervención Crisis

379531261616

Duck



Psicocducación





RUTA DE ATENCIÓN PARA LA INTERRUPCIÓN **VOLUNTARIA DEL EMBARAZO**

Elección de la técnica

A. EDAD GESTACIONAL B. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO C. PREFERENCIA DE LA MUJER

Hasta las 15 semanas

Tratamiento Quirúrgico: Dilatación y aspiración hasta 15 semanas

Tratamiento con medicamentos: Ambulatorio hasta 10 semanas

Tratamiento con medicamentos supervisado (Inducción intrahospitalaria desde 10 semanas)

Firma consentimiento informado

Tratamiento Quirúrgico: Dilatación y evacuación Desde 15 semanas

>15 semanas

Preparación previa:

Analgesia, Preparación cervical Profilaxis antibiótica

Procedimiento

Bloqueo paracervical Dilatación Aspiración Revisión tejido

Misoprostol hasta 10 semanas:

800 mcg SL cada 3 h o VV cada 3-12 h por 3 dosis ANALGESIA dosis máximas

Control en 15 días

Si incompleto o retenido - dosis adicional de misoprostol (400 mcg) vs aspiración Si fallido: aspiración

Misoprostol desde 12 sem.

400 mcg SL cada 3 h o VV cada 3-12 h por 5 dosis o hasta expulsión Repetir al día siguiente de ser necesario.

Misoprostol

Analgesia Preparación cervical: Misoprostol 400 mcg VV o VSKL 2-3 horas antes Profilaxis antibiótica

Preparación previa:

Analgesia Preparación cervical: Profilaxis antibiótica

Procedimiento

Bloqueo paracervical Dilatación Evacuación con pinza y aspiración Revisión tejido


Rutus de Atención







CUIDADO MÉDICO POST IVE





Acreditación Institucional de Alta Calidad

RUTA DE ATENCIÓN ANTE EL ABORTO ESPONTÁNEO

Es importante el cuidado prenatal, en el caso de una señal de alerta...

Acudir al servicio médico mas cercano


CUÁLES SON LAS OPCIONES DE MANEJO DE UN ABORTO ESPONTÁNEO?

Naturalmente

El 80% de abortos espontáneos suceden así, puede tomar entre 6-8 semanas, es importante antes la evaluación medica

Bajo medicamentos

Tras una evaluación medica y complicaciones, se da un medicamentos como el misoprostol, 95% de efectividad y se da el seguimiento medico constante



Código libélula


Es importante continuar el acompañamiento psicoterapéutico desde el momento que entre al servicio medico hasta el egreso con seguimiento constante

Cirugía

La evacuación quirúrgica por curetaje o aspiración, es una de las ultimas opciones pero es igual de efectiva y realizado por el profesional adecuado









" Más allá de la Moral Personal, las Acciones Seguras"

Fortaleer Protocolo
Capacitar Personal
Socializar Comunidad
Activar Buta Psicosocial









Estrategias

Alienzes Institucionales

Dirección Territorial Alcaldía Universidades Otras


Campañas Comunitarias

Ambulancia Colegios Otras





Recursoteed











Recursoteed



Protocolo











Recursofeed









www.https://coddbits.github.io/libalula/app/





Experiencies de Elymenización









