

TEMPEST_FW_Well_TSS_20250904

Stephanie J. Wilson

2025-09-15

TSS Data

```
#Read in the data
```

```
tss <- read.csv("COMPASS_TEMPEST_WellTest_TSS_Data.csv")  
head(tss)
```


```
##      Sample_ID Tin_ID Tin_Weight_g Tin_Filter_Weight_g  
## 1 TMP_FW_Well_1230    86      1.81022      1.99738  
## 2 TMP_FW_Well_1300    87      1.79589      1.98429  
## 3 TMP_FW_Well_1400    88      1.74777      1.94640  
## 4      DI_Blank     89      1.81108      2.00673  
##      Tin_Filter_Sample_Weight_Dry_g Tin_Filter_Sample_Weight_Dry1_g  
## 1                      2.00113                      2.00101  
## 2                      1.99866                      1.99887  
## 3                      1.95921                      1.95923  
## 4                      2.00571                      2.00567  
##      Filtered_Volume_mL  
## 1                      950  
## 2                      1105  
## 3                      1060  
## 4                      980
```

```
#Calculate an Avg. Sample Weight and calculate TSS mg/L
```

```
tss <- tss %>%  
  mutate(Avg_Sample_Weight_g =  
    rowMeans(select(., Tin_Filter_Sample_Weight_Dry_g,  
                    Tin_Filter_Sample_Weight_Dry1_g), na.rm = TRUE))  
  
tss$TSS_mgL <- ((tss$Avg_Sample_Weight_g - tss$Tin_Filter_Weight_g)*1000) /  
  (tss$Filtered_Volume_mL/1000)
```

```
#plot the TSS
```

```
tss_plot <- ggplot(tss, aes(x=Sample_ID, y=TSS_mgL, fill=Sample_ID)) +  
  geom_bar(stat = "identity") + theme_minimal() +  
  ylab("Total Dissolved Solids (mg/L)") + xlab(" ") +  
  theme(legend.position = "none")  
  
print(tss_plot)
```



##remove the DI blank and make a table

```
tss_table <- tss %>%
  filter(Sample_ID != "DI_Blank") %>%
  select("Sample_ID", "TSS_mgL") %>%
  mutate(TSS_mgL = round(TSS_mgL, 2))
```

```
kable(tss_table)
```

Sample_ID	TSS_mgL
TMP_FW_Well_1230	3.88
TMP_FW_Well_1300	13.10
TMP_FW_Well_1400	12.09

DIC Data

TOC/TN Data

Sulfate / Chloride Data