



中位数为0，不代表每一帧没有红；八方向全低分，不等于某一方向低分
审计区域：车后x∈(-1.5,-0.48)m、|y|<0.8m，排除车内；0.04m/格







18.1秒：一个约10cm偏高输入格影响部分方向
黑虚线框为模型约2.04m见方输入；白点表示缺测后的补全像素；压平只用于归因，未用于运行










34.9秒：附近高结构进入模型感受野，八方向均低分
黑虚线框为模型约2.04m见方输入；白点表示缺测后的补全像素；压平只用于归因，未用于运行










静止段末帧：大量缺测补全和邻近高结构共同存在
黑虚线框为模型约2.04m见方输入；白点表示缺测后的补全像素；压平只用于归因，未用于运行








反例检查：仅去掉≤3cm残差并没有消除这些残留低分
18.1秒样本去掉1个约10cm高格后最低T由0.497到0.886；不能把三类情况统一归因为厘米纹理




从HT反查高程，再回查原始点云；灰色环境结构不能因为出现在车后就删掉
高回波的实体类别、异常/多径成因尚无独立真值，不能仅凭这些图断言


小高格：源扫描175有3个偏高回波，高格见于17.6和18.1秒两张输出
XY=[4.28, 7.12] m



后侧高结构：多次扫描在同一世界位置记录到高点
XY=[-3.56, 18.04] m



18.1秒整图对照：只替换1个约9.8cm偏高输入，车后低分259→0
其余输入不变、全图重新推理；原始输出精确复现；仅作归因，未修改运行逻辑



静止段的另一层问题：可计算分数 ≠ 脚下已有物理观测支持
右图只改变离线示意的着色掩码，保留所有T原值；没有修改实际显示或规划代码

