

**Table S2.** PCR primers used in *Listeria monocytogenes* detection in bedding samples.

Gene	Gene Role	Primer	Primer	Primer Sequence
	(Identification)		Concentration	(5'–3')
			( $\mu$ M)	
prfA	<i>L. monocytogenes</i>	LIP1	0.2	GATACAGAAACATCGGTTGGC
	species	LIP2	0.2	GTGTAATCTTGATGCCATCAGG
prs	Listeria genus	prsF	0.2	GCTGAAGAGATTGCGAAAGAAG
		prsR	0.2	CAAAGAAACCTTGGATTTGCGG
Lmo 1118	Genoserogroup IIc	lmo1118	0.6	AGGGGTCTTAAATCCTGGAA
		F		
		lmo1118 R	0.6	CGGCTTGTTCCGGCATACTTA
Orf 2819	Genoserogroup IIb IVb	orf2819F	0.4	AGCAAAATGCCAAACTCGT
		orf2819R	0.4	CATCACTAAAGCCTCCCATTG
Orf 2110	Geneserogroup IVb	orf2110F	0.4	AGTGGACAATTGATTGGTGAA
		orf2110R	0.4	CATCCATCCCTTACTTTGGAC
Lmo 0737	Genoserogroup IIa IIc	lmo0737	0.4	AGGGCTTCAAGGACTTACCC
		F		
		lmo0737	0.4	ACGATTTCTGCTTGCCATTC
		R		

Adapted from K  rouanton et al., 2010