


Σπύρος Φρόνιμος  
Μαθηματικός

# ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΠΟΙ ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΜΑΤΑ ΤΩΝ  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

$$f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$$



ΕΚΔΟΣΕΙΣ -----  
ΚΕΡΚΥΡΑ 2015

**ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ**  
**Γυμνασίου - Λυκείου**

**Σπύρος Φρόνιμος - Μαθηματικός**  
e-mail : spyrosfronimos@gmail.com

Σελίδες : ...

: ...

Εκδόσεις : ...

51 Copyright 2015

Φιλολογική Επιμέλεια :

**Μαρία Πρεντουλή** - e-mail : predouli@yahoo.com

Επιστημονική Επιμέλεια :

**Ιωάννα Γραμμένου** - - e-mail : predouli@yahoo.com

**Σπύρος Φρόνιμος**

Εξώφυλλο :

**Δημήτρης Πρεντουλής**

Πνευματικά Δικαιώματα : ...

*Στους γονείς μου.*



# Πρόλογος

Το βιβλίο περιέχει συγκεντρωμένη όλη τη θεωρία των μαθηματικών όλων των τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου γραμμένη αναλυτικά και κατανοητά.

Ειδικότερα ο αναγνώστης θα βρει

- Ορισμούς
- Θεωρήματα
- Τυπολόγιο
- Μεθοδολογία

Σκοπό έχει να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για μικρούς ή μεγάλους μαθητές όπου μπορούν να έχουν όλη τη θεωρία της χρονιάς τους συγκεντρωμένη, χρήσιμη για επανάληψη και διαγωνίσματα, αλλά και να μπορούν εύκολα να καλύψουν τυχόν κενά από προηγούμενες τάξεις.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν.

# Περιεχόμενα

ΠΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΩΝ.....	x
---------------------	---

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ.....	xiii
----------------------	------

## Κεφάλαιο 1

ΑΛΓΕΒΡΑ	ΣΕΛΛΑ	i
1.1 Αριθμοί .....		1
1.2 Αλγεβρικές Παραστάσεις - Εξισώσεις - Ανισώσεις .....		24
1.3 Τριγωνομετρία .....		39
1.4 Ακολουθίες αριθμών - Πρόοδοι .....		48
1.5 Μιγαδικοί Αριθμοί .....		52
1.6 Πίνακες .....		54
1.7 Μαθηματική Λογική .....		58

## Κεφάλαιο 2

ΓΕΩΜΕΤΡΑ	ΣΕΛΛΑ	61
2.1 Ευθείες - Ημιευθείες - Ενθύγραμμα τμήματα .....		61

## Κεφάλαιο 3

ΠΙΘΑΝΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ	ΣΕΛΛΑ	63
3.1 Σύνολα - Δειγματικός Χώρος - Ενδεχόμενα .....		63

## Κεφάλαιο 4

ΑΝΑΛΥΣΗ	ΣΕΛΛΑ	67
4.1 Συναρτήσεις .....		67
4.2 Όρια - Συνέχεια .....		72
4.3 Διαφορικός Λογισμός .....		76
4.4 Ολοκληρωτικός Λογισμός .....		77

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ.....	A-I
-------------------	-----







# Πίνακας Συμβόλων

Σύμβολο	Όνομα	Περιγραφή
$+$ , $-$ , $\cdot$ , $:$	Συν, Πλην, Επί, Δια	Τα σύμβολα της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης αντίστοιχα.
$=$	Ίσον	Δηλώνει ισότητα ανάμεσα σε δύο στοιχεία.
$\equiv$	Ταυτίζεται	
$\neq$	Διάφορο	Εκφράζει οτι δύο στοιχεία είναι διαφορετικά μεταξύ τους.
$>$	Μεγαλύτερο	Δηλώνει ανισότητα ανάμεσα σε δύο στοιχεία. (Το 1 <sup>ο</sup> μεγαλύτερο του 2 <sup>ου</sup> ).
$<$	Μικρότερο	Δηλώνει ανισότητα ανάμεσα σε δύο στοιχεία. (Το 1 <sup>ο</sup> μικρότερο του 2 <sup>ου</sup> ).
$\geq$	Μικρότερο ίσο	Συνδυασμός των σχέσεων $=$ και $>$ .
$\leq$	Μικρότερο ίσο	Συνδυασμός των σχέσεων $=$ και $<$ .
$\pm$	Συν Πλην	Συνδυασμός των προσήμων $+$ και $-$ .
$\mp$	Πλην Συν	Έχει την ίδια σημασία με το συμβολισμό $\pm$ και χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αλλάξουμε τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν τα πρόσημα $+$ , $-$ .
$\Rightarrow$	Συνεπαγωγή	Συνδέει δύο μαθηματικές προτάσεις, όταν η μια έχει σαν συμπέρασμα την άλλη.
$\Leftarrow$	Αντίστροφη συνεπαγωγή	Συνδέει δύο μαθηματικές προτάσεις με φορά αντίστροφη από το σύνδεσμο $\Rightarrow$ .
$\Leftrightarrow$	Διπλή συνεπαγωγή	Συνδέει δύο μαθηματικές προτάσεις με διπλή φορά. Δηλώνει ισοδυναμία μεταξύ τους.
$\%$	Ποσοστό τοις εκατό	Μέρος μιας ποσότητας μοιρασμένης σε 100 ίσα κομμάτια.
$\text{‰}$	Ποσοστό τοις χιλίοις	Μέρος μιας ποσότητας μοιρασμένης σε 1000 ίσα κομμάτια.

Σύμβολο	Όνομα	Περιγραφή
$   $	Απόλυτη τιμή	Απόσταση ενός αριθμού από το 0.
$\sqrt{\phantom{x}}$	Τετραγωνική ρίζα	
$\sqrt[n]{\phantom{x}}$	n-οστή ρίζα	
$\in$	Ανήκει	
$\ni$	Ανήκει	
$\notin$	Δεν ανήκει	
$\subseteq$	Υποσύνολο	
$\supseteq$	Υπερσύνολο	
$\subset, \supset$	Γνήσιο υποσύνολο, γν. υπερσύνολο	
$\cup, \cap$	Ένωση, Τομή	
$\emptyset$	Κενό σύνολο	
$\infty$	Άπειρο	
$\forall$	Για κάθε	
$\exists$	Υπάρχει	
$\nexists$	Δεν υπάρχει	
$\perp$	Κάθετο	
$\Sigma$	Άθροισμα	
$\int$	Ολοκλήρωμα	
$\lim$	Όριο	
$\log, \ln$	Λογάριθμός	

Σύμβολο	Όνομα	Περιγραφή
$\begin{pmatrix} \nu \\ \kappa \end{pmatrix}$		

# Βασικές Έννοιες

Η επιστήμη των μαθηματικών

## A-1. Αλγεβρα

## A-2. Γεωμετρία

## A-3. Στατιστική

## A-4. Πιθανότητες

## A-5. Ανάλυση

## A-6. Εφαρμοσμένα μαθηματικά

Πριν δούμε αναλυτικά τους ορισμούς, τους κανόνες και τις βασικές μεθόδους της θεωρίας των μαθηματικών θα πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτές τις βασικές έννοιες καθώς και κάθε έννοια που προκύπτει μέσα απ' αυτές ή είναι χρήσιμη για τη δομή ενός μαθηματικού κειμένου.

## B-1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Ορισμός ονομάζεται μια πρόταση η οποία εισάγει και ερμηνεύει πλήρως μια νέα μαθηματική έννοια, με τρόπο σαφή και σύντομο.

## B-2. ΘΕΩΡΗΜΑ

Θεώρημα καλείται κάθε πρόταση η οποία αποτελεί ένα βασικό και αποδεδειγμένο κανόνα μεταξύ μαθηματικών εννοιών.

- Αποτελείται από δύο μέρη τα οποία είναι μαθηματικές προτάσεις και ονομάζονται **υπόθεση** και **συμπέρασμα**.
- Η υπόθεση αποτελείται από μια ή περισσότερες προτάσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα το οποίο είναι λογική συνέπεια αυτών.
- Η ισχύς ενός θεωρήματος είναι γενική. Μαθηματικές προτάσεις με μικρότερη βαρύτητα αποτελούν υποκατηγορίες της έννοιας του θεωρήματος. Αυτές είναι τα πορίσματα, οι προτάσεις, τα κριτήρια και οι ιδιότητες.

**B-3. Πόρισμα**

Πόρισμα λέγεται μια πρόταση η οποία προκύπτει άμεσα από ένα θεώρημα και αποδεικνύεται με τη βοήθεια αυτού. Είναι ένας κανόνας με συμπέρασμα πιο ειδικό απ' αυτό ενός θεωρήματος.

**B-4. Κριτήριο**

Κριτήριο ονομάζεται μια πρόταση η οποία αποτελεί έναν κανόνα με τον οποίο ελέγχεται η ισχύς μιας ιδιότητας ή ενός χαρακτηριστικού. Αν ικανοποιούνται οι συνθήκες ενός κριτηρίου τότε ως συμπέρασμα έχουμε τη ζητούμενη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό ενός μαθηματικού αντικειμένου.

**B-5. Ιδιότητα****B-6. Χαρακτηριστικό****B-7. Παράδειγμα****B-8. Αντιπαράδειγμα****B-9. Αξίωμα****B-10. Γεωμετρική ερμηνεία****B-11. Διερεύνηση****B-12. Ισχυρισμός****B-13. Περιορισμός****B-14. Παρατήρηση****B-15. Σχόλιο****B-16. Γενίκευση****B-17. Εικασία****B-18. Ιδιότητα**

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ

## ΑΛΓΕΒΡΑ

# 1

### 1.1 Αριθμοί

#### ΟΡΙΣΜΟΙ

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

- Φυσικοί Αριθμοί** : Το σύνολο των αριθμών από το 0 έως το άπειρο όπου κάθε αριθμός έχει διαφορά μιας μονάδας από τον προηγούμενο. Συμβολίζεται με  $\mathbb{N}$  και είναι :  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ .
- Ακέραιοι Αριθμοί** : Το σύνολο των φυσικών αριθμών μαζί με τους αντίθετους τους. Συμβολίζεται με  $\mathbb{Z}$  και είναι :  $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ .
- Ρητοί Αριθμοί** : Όλοι οι αριθμοί που μπορούν να γραφτούν με τη μορφή κλάσματος με ακέραιους όρους. Συμβολίζεται με  $\mathbb{Q}$  και είναι :  $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{\beta} \mid a, \beta \in \mathbb{Z}, \beta \neq 0 \right\}$ .
- Άρρητοι Αριθμοί** : Κάθε αριθμός ο οποίος δεν είναι ρητός. Κατά κύριο λόγο, άρρητοι αριθμοί είναι οι ρίζες που δεν έχουν ρητό αποτέλεσμα, ο αριθμός  $\pi$  κ.τ.λ.
- Πραγματικοί Αριθμοί** : Οι ρητοί μαζί με το σύνολο των άρρητων μας δίνουν τους πραγματικούς αριθμούς, όλους τους αριθμούς που γνωρίζουμε. Συμβολίζεται με  $\mathbb{R}$  και είναι :  $\mathbb{R} = \{\text{όλοι οι αριθμοί}\}$ .
- Μιγαδικοί Αριθμοί** : Οι αριθμοί που αποτελούν άθροισμα ενός πραγματικού με ένα φανταστικό αριθμό. Οι αριθμοί είναι της μορφής  $a + \beta i$  ενώ το σύνολο των μιγαδικών αριθμών συμβολίζεται με  $\mathbb{C}$  και είναι  $\mathbb{C} = \{z = a + \beta i \mid a, \beta \in \mathbb{R} \text{ με } i^2 = -1\}$ .

Τα παραπάνω σύνολα χωρίς το μηδενικό τους στοιχείο συμβολίζονται αντίστοιχα με  $\mathbb{N}^*$ ,  $\mathbb{Z}^*$ ,  $\mathbb{Q}^*$ ,  $\mathbb{R}^*$ ,  $\mathbb{C}^*$ .

Με το σύνολο  $\mathbb{C}$  των μιγαδικών αριθμών θα ασχοληθούμε εκτενέστερα στην **Παράγραφο 1.5** όπου θα ορίσουμε κάθε έννοια, που αφορά το σύνολο αυτό, αναλυτικά.

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.2 ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Δεκαδικό ονομάζεται το σύστημα αρίθμησης στο οποίο κάθε αριθμός σχηματίζεται με τη χρήση των δέκα συμβόλων - ψηφίων : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 τοποθετημένα διαδοχικά το ένα μετά το άλλο. Καθένα απ' αυτά έχει διαφορετική αξία ανάλογα με το πλήθος των μονάδων που εκφράζει. Στο δεκαδικό σύστημα έχουμε σαν βάση τον αριθμό δέκα.

### Ψηφία Ακέραιου Αριθμού

Δεκαδική Τάξη	Εκατομμύρια	Εκατοντάδες Χιλιάδες	Δεκάδες Χιλιάδες	Χιλιάδες	Εκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες
Συμβ.	Εκ	ΕΧ	ΔΧ	Χ	Ε	Δ	Μ
Αξία	1.000.000	100.000	10.000	1.000	100	10	1

Πίνακας 1.1: Ψηφία ακέραιου αριθμού

- Κάθε αριθμός έχει διαφορετική αξία ανάλογα με τη θέση και την αξία των ψηφίων που τον αποτελούν.
- Σε κάθε αριθμό η θέση κάθε ψηφίου καθορίζει την αξία του. Η θέση αυτή ονομάζεται **δεκαδική θέση**.
- Η αξία των δεκαδικών θέσεων αυξάνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά.
- Κάθε δεκαδική θέση έχει αξία δεκαπλάσια της προηγούμενης.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.3 ΑΡΤΙΟΙ - ΠΕΡΙΤΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Άρτιοι (ζυγοί) ονομάζονται οι αριθμοί που διαιρούνται με το 2 ενώ περιττοί (μονοί) όσοι δεν διαιρούνται με το 2. Η μορφή που έχουν αντίστοιχα είναι:

$$\text{Άρτιοι : } a = 2k \text{ , Περιττοί : } a = 2k + 1 \text{ , όπου } k \in \mathbb{Z}$$

Το τελευταίο ψηφίο κάθε άρτιου αριθμού είναι ένα από τα 0, 2, 4, 6, 8 ενώ ένας περιττός αριθμός τελειώνει σε ένα από τα 1, 3, 5, 7, 9.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.4 ΘΕΤΙΚΟΣ - ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Θετικός ονομάζεται κάθε αριθμός που είναι μεγαλύτερος του μηδενός ενώ αρνητικός ονομάζεται κάθε αριθμός που είναι μικρότερος του μηδενός.

- Τα σύμβολα + και − τα οποία χρησιμοποιούμε για να δείξουμε αν κάποιος αριθμός είναι θετικός ή αρνητικός ονομάζονται **πρόσημα**.
- Το 0 δεν έχει πρόσημο.
- Δύο αριθμοί με το ίδιο πρόσημο ονομάζονται **ομόσημοι**.
- Δύο αριθμοί με το διαφορετικά πρόσημα ονομάζονται **ετερόσημοι**.
- Το 0 είναι μικρότερο από κάθε θετικό και μεγαλύτερο από κάθε αρνητικό αριθμό.
- Κάθε θετικός αριθμός είναι μεγαλύτερος από κάθε αρνητικό αριθμό.
- Ανάμεσα σε δύο αρνητικούς αριθμούς, μεγαλύτερος είναι εκείνος με τη μικρότερη απόλυτη τιμή.



**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.5 ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ**

Αντίθετοι ονομάζονται οι αριθμοί που έχουν ίσες απόλυτες τιμές και αντίθετα πρόσημα.

Ο αντίθετος ενός αριθμού  $x$  είναι ο  $-x$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.6 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΩΝ**

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ονόματα των αριθμών που αποτελούν μια πράξη, τα ονόματα των αποτελεσμάτων και ο συμβολισμός κάθε πράξης.

Πράξη	Όροι	Αποτέλεσμα	Συμβολισμός
<b>Πρόσθεση</b>	Προσθετέοι	Άθροισμα	$a + \beta$
<b>Αφαίρεση</b>	Μειωτέος - Αφαιρετέος	Διαφορά	$a - \beta$
<b>Πολλαπλασιασμός</b>	Παράγοντες	Γινόμενο	$a \cdot \beta$
<b>Διαίρεση</b>	Διαιρετέος - Διαιρέτης	Πηλίκο	$a : \beta$

*Πίνακας 1.2:* Βασικές πράξεις

**1. Πρόσθεση**

Πρόσθεση ονομάζεται η πράξη με την οποία μπορούμε από δύο αριθμούς  $a, \beta \in \mathbb{R}$  να βρούμε τον αριθμό  $a + \beta$  που ονομάζεται **άθροισμα**.

**2. Πολλαπλασιασμός**

Πολλαπλασιασμός ονομάζεται η πράξη με την οποία μπορούμε από δύο αριθμούς  $a, \beta \in \mathbb{R}$  να βρούμε τον αριθμό  $a \cdot \beta$  που ονομάζεται **γινόμενο**.

**3. Αφαίρεση - Διαίρεση**

Η αφαίρεση  $a - \beta$  και η διαίρεση  $a : \beta$  δύο αριθμών  $a, \beta \in \mathbb{R}$  είναι οι πράξεις που προκύπτουν από την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό αντίστοιχα και μπορούν να γραφτούν με τη βοήθεια τους.

$$a - \beta = a + (-\beta) \quad , \quad a : \beta = \frac{a}{\beta} = a \cdot \frac{1}{\beta}$$

- Η διαίρεση ενός αριθμού  $a$  με το 0 **δεν** ορίζεται.
- Η διαίρεση  $0 : 0$  είναι απροσδιόριστη.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.7 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ**

Ευκλείδεια διαίρεση ονομάζεται η διαίρεση δύο αριθμών  $\Delta$  (**Διαιρετέος**) και  $\delta$  (**διαιρέτης**) από την οποία προκύπτουν φυσικοί αριθμοί  $\pi$  (**πηλίκο**) που είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης και  $\nu$  (**υπόλοιπο**). Οι φυσικοί αριθμοί  $\Delta, \delta, \pi, \nu$  ικανοποιούν την ισότητα

$$\Delta = \delta \cdot \pi + \nu$$

η οποία ονομάζεται **ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης**.

Ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες :

1. Για να είναι μια διαίρεση Ευκλείδεια πρέπει το υπόλοιπό της να είναι μικρότερο από το διαιρέτη δηλαδή :

$$v < \delta$$

2. Αν σε μια διαίρεση το υπόλοιπο είναι 0 τότε η διαίρεση ονομάζεται **τέλεια** και ισχύει :

$$\Delta = \delta \cdot \pi \quad , \quad v = 0$$

3. Αν ο διαιρέτης είναι ίσος με το διαιρετέο τότε το πηλίκο είναι ίσο με 1.

$$\Delta = \delta \Rightarrow \pi = 1$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.8 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ

Πολλαπλάσιο ενός αριθμού  $a$  ονομάζεται ο φυσικός αριθμός που προκύπτει από πολλαπλασιασμό του  $a$  με οποιονδήποτε φυσικό αριθμό. :

$$\beta \text{ πολλαπλάσιο του } a : \beta = v \cdot a \quad , \quad \text{όπου } v \in \mathbb{N}$$

Ένας αριθμός  $a \in \mathbb{N}$  λέμε ότι **διαιρεί** έναν αριθμό  $\beta \in \mathbb{N}$  όταν ο  $\beta$  είναι πολλαπλάσιο του  $a$ . Όταν συμβαίνει αυτό, η διαίρεση  $\beta : a$  δίνει υπόλοιπο 0.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.9 ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

Διαιρέτης ενός φυσικού αριθμού  $a \in \mathbb{N}$  ονομάζεται ένας φυσικός αριθμός  $\beta \in \mathbb{N}$  ο οποίος εαν διαιρεθεί με τον  $a$  αφήνει υπόλοιπο 0.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.10 Ε.Κ.Π.

Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσότερων φυσικών αριθμών ονομάζεται το μικρότερο, μη μηδενικό, κοινό πολλαπλάσιο τους. Συμβολίζεται

$$Ε.Κ.Π.(a_1, a_2, \dots, a_v) \quad , \quad \text{όπου } a_1, \dots, a_v \in \mathbb{N}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.11 Μ.Κ.Δ.

Μέγιστος κοινός διαιρέτης δύο ή περισσότερων αριθμών ονομάζεται ο μεγαλύτερος από τους κοινούς τους διαιρέτες. Συμβολίζεται

$$Μ.Κ.Δ.(a_1, a_2, \dots, a_v) \quad , \quad \text{όπου } a_1, \dots, a_v \in \mathbb{N}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.12 ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Πρώτος ονομάζεται ένας αριθμός που διαιρείται **μόνο** με τον εαυτό του και το 1. Οποιοσδήποτε άλλος αριθμός λέγεται **σύνθετος**.


### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.13 ΠΡΩΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

Πρώτοι μεταξύ τους ονομάζονται δύο αριθμοί  $a, \beta \in \mathbb{N}$  για τους οποίους ισχύει :

$$Μ.Κ.Δ.(a, \beta) = 1$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.14 ΑΞΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Ο άξονας των πραγματικών αριθμών είναι μια αριθμημένη ευθεία στην οποία βρίσκονται όλοι οι πραγματικοί αριθμοί τοποθετημένοι σε αύξουσα σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά.




Σχήμα 1.1: Ευθεία των αριθμών

- Η θέση ενός αριθμού πάνω στην ευθεία σχεδιάζεται με ένα σημείο.
- Ο αριθμός που βρίσκεται στη θέση αυτή ονομάζεται **τετμημένη** του σημείου.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.15 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ**

Απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού ορίζεται να είναι η απόσταση της εικόνας του αριθμού αυτού από το 0 και συμβολίζεται με  $|a|$ .



Σχήμα 1.2: Απόλυτη τιμή

- Η απόλυτη τιμή ενός πραγματικού αριθμού είναι θετικός αριθμός αφού εξ' ορισμού παριστάνει απόσταση, που σαν μέγεθος παίρνει μόνο θετικές τιμές.
- Απόλυτη τιμή της διαφοράς δύο αριθμών είναι η απόσταση μεταξύ τους.

$$|a - \beta| = d(a, \beta)$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.16 ΔΙΑΤΑΞΗ**

Διάταξη ονομάζεται η ιδιότητα του συνόλου των πραγματικών αριθμών κατά την οποία μπορούμε να τους συγκρίνουμε και να τους τοποθετήσουμε σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Οι σχέσεις διάταξης που χρησιμοποιούμε είναι

$<$  : μικρότερο ,  $>$  : μεγαλύτερο ,  $\leq$  μικρότερο ίσο ,  $\geq$  μεγαλύτερο ίσο









**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.17 ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΟ - ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Διάστημα ονομάζεται κάθε υποσύνολο του συνόλου των πραγματικών αριθμών του οποίου τα στοιχεία βρίσκονται ανάμεσα από δύο πραγματικούς αριθμούς  $a, \beta$  που ονομάζονται **άκρα** του διαστήματος.

- Κάθε διάστημα μπορεί να εκφραστεί σαν ανισότητα.
- Το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών  $x \in \mathbb{R}$  με  $a \leq x \leq \beta$  ονομάζεται **κλειστό διάστημα**  $[a, \beta]$ .
- Αν από το κλειστό διάστημα παραλείψουμε τα άκρα  $a, \beta$  τότε διάστημα που προκύπτει ονομάζεται **ανοιχτό διάστημα**  $(a, \beta)$ .
- Το διάστημα στη μεριά των απείρων  $(\pm\infty)$  είναι πάντα ανοιχτό καθώς πρόκειται για έννοιες και όχι πραγματικούς αριθμούς.

- Ο αριθμός  $x = \frac{a+\beta}{2}$  ονομάζεται **κέντρο** και ο αριθμός  $\rho = \frac{\beta-a}{2}$  **ακτίνα** του διαστήματος.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε όλους τους τύπους διαστημάτων, τη γραφική παράστασή τους καθώς και το πως παριστάνεται το καθένα σαν ανισότητα.

Διάστημα	Ανισότητα	Σχήμα	Περιγραφή
$[a, \beta]$	$a \leq x \leq \beta$		Κλειστό $a, \beta$
$(a, \beta)$	$a < x < \beta$		Ανοιχτό $a, \beta$
$[a, \beta)$	$a \leq x < \beta$		Κλειστό $a$ ανοιχτό $\beta$
$(a, \beta]$	$a < x \leq \beta$		Ανοιχτό $a$ κλειστό $\beta$
$[a, +\infty)$	$x \geq a$		Κλειστό $a$ συν άπειρο
$(a, +\infty)$	$x > a$		Ανοιχτό $a$ συν άπειρο
$(-\infty, a]$	$x \leq a$		Μείον άπειρο $a$ κλειστό
$(-\infty, a)$	$x < a$		Μείον άπειρο $a$ ανοιχτό

Πίνακας 1.3: Διαστήματα αριθμών

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.18 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ - ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ**

- Ένας αριθμός  $a$  ονομάζεται **μεγαλύτερος** από έναν αριθμό  $\beta$  όταν ισχύει  $a - \beta > 0$  και γράφουμε  $a > \beta$ .
- Ένας αριθμός  $a$  ονομάζεται **μικρότερος** από έναν αριθμό  $\beta$  όταν ισχύει  $a - \beta < 0$  και γράφουμε  $a < \beta$ .

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.19 ΚΛΑΣΜΑ**

Κλάσμα ονομάζεται ένας αριθμός της μορφής  $\frac{a}{\beta}$ , όπου  $a, \beta$  ακέραιοι αριθμοί.

- Με το κλάσμα εκφράζουμε ένα μέρος μιας ποσότητας.
- Ο αριθμός  $a$  ονομάζεται **αριθμητής** ενώ ο  $\beta$  **παρονομαστής** του κλάσματος.
- Το κλάσμα σαν πράξη είναι διαίρεση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή.
- Ο παρονομαστής του κλάσματος δεν πρέπει να είναι  $0 : \beta \neq 0$ .
- Τα σύμβολα των πράξεων (+, −, ·, :) μεταξύ κλασμάτων σε μια αριθμητική παράσταση καθώς και τα σύμβολα σχέσεων (=, >, <) γράφονται στην ίδια ευθεία με τη γραμμή κλάσματος.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.20 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Κλασματική μονάδα ονομάζεται το κλάσμα το οποίο έχει αριθμητή τον αριθμό 1 :  $\frac{1}{\nu}$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.21 ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ

Δεκαδικό ονομάζεται το κλάσμα το οποίο έχει παρονομαστή μια δύναμη του 10.

$$\frac{a}{10^{\nu}}, \quad \nu \in \mathbb{N}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.22 ΙΣΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Ίσα ονομάζονται δύο ή περισσότερα κλάσματα που εκφράζουν ίσα μέρη μιας ποσότητας ή ίσων ποσοτήτων.

$$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.23 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

Απλοποίηση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία, ένα κλάσμα το μετατρέπουμε σε ένα ισοδύναμό του με μικρότερους όρους, διαιρώντας τους αρχικούς με το  $M.K.\Delta$  τους.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.24 ΑΝΑΓΩΓΟ ΚΛΑΣΜΑ

Ανάγωγο ονομάζεται ένα κλάσμα το οποίο δεν απλοποιείται. Ο  $M.K.\Delta$  αριθμητή και παρονομαστή ενός ανάγωγου κλάσματος είναι το 1.

$$\frac{a}{\beta} : \text{ανάγωγο} \Leftrightarrow M.K.\Delta.(a, \beta) = 1$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.25 ΟΜΩΝΥΜΑ - ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Ομώνυμα ονομάζονται δύο ή περισσότερα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή ενώ ετερώνυμα ονομάζονται τα κλάσματα με διαφορετικούς παρονομαστές.

$$\text{Ομώνυμα : } \frac{a}{\gamma}, \frac{\beta}{\gamma} \quad \text{Ετερώνυμα : } \frac{a}{\beta}, \frac{\gamma}{\delta}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.26 ΜΕΙΚΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Μεικτός ονομάζεται ο αριθμός ο οποίος είναι άθροισμα ενός ακεραίου και ενός κλάσματος μικρότερου της μονάδας.

$$\text{Μεικτός : } a + \frac{\beta}{\gamma} = a\frac{\beta}{\gamma}, \quad \frac{\beta}{\gamma} < 1$$

Το άθροισμα αυτό μετατρέπεται σε μεικτό παραλείποντας το σύμβολο της πρόσθεσης.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.27 ΣΥΝΘΕΤΟ ΚΛΑΣΜΑ

Σύνθετο ονομάζεται ένα κλάσμα του οποίου ένας τουλάχιστον από τους δύο όρους του είναι κλάσμα.

$$\frac{\frac{a}{\beta}}{\frac{\gamma}{\delta}}, \quad \frac{a}{\frac{\beta}{\gamma}}, \quad \frac{\frac{a}{\beta}}{\gamma}$$

Σε κάθε σύνθετο κλάσμα, η κύρια κλασματική γραμμή σχεδιάζεται μεγαλύτερη από αυτές των απλών κλασμάτων, ώστε να διακρίνονται οι όροι του καθώς και ποιοί από αυτούς είναι κλάσματα ή ακέραιοι.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.28 ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Δύναμη ενός φυσικού αριθμού  $a$  ονομάζεται το γινόμενο  $n$  ίσων παραγόντων του αριθμού αυτού. Συμβολίζεται με  $a^n$  όπου  $n \in \mathbb{N}$  είναι το πλήθος των ίσων παραγόντων.

$$\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n = a^n$$

$n$  παράγοντες

- Ο αριθμός  $a$  ονομάζεται **βάση** και ο αριθμός  $n$  **εκθέτης** της δύναμης.
- Η δύναμη  $a^2$  ονομάζεται και  **$a$  στο τετράγωνο**.
- Η δύναμη  $a^3$  ονομάζεται και  **$a$  στον κύβο**.
- Σε μία αριθμητική παράσταση, η σειρά με την οποία γίνονται οι πράξεις είναι
  1. Δυνάμεις
  2. Πολλαπλασιασμοί - Διαιρέσεις
  3. Προσθέσεις - Αφαιρέσεις
- Η σειρά αυτή γίνεται πρώτα μέσα στις παρενθέσεις αν υπάρχουν και μετά απ' έξω από τις παρενθέσεις.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.29 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ

Τετραγωνική ρίζα ενός θετικού αριθμού  $x$  ονομάζεται ο **θετικός** αριθμός  $a$  που αν υψωθεί στο τετράγωνο δίνει τον αριθμό  $x$  (υπόριζο) και συμβολίζεται με  $\sqrt{x}$ .

$$\sqrt{x} = a, \quad \text{όπου } x \geq 0 \text{ και } a \geq 0$$

Δεν ορίζεται ρίζα αρνητικού αριθμού.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.30 ΡΙΖΑ Ν-ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

Ρίζα  $n$ -οστής τάξης ενός θετικού αριθμού  $x$  ονομάζεται ο **θετικός** αριθμός  $a$  που αν υψωθεί στη δύναμη  $n$  δίνει αποτέλεσμα  $x$  (υπόριζο) και συμβολίζεται με  $\sqrt[n]{x}$ .

$$\sqrt[n]{x} = a, \quad \text{όπου } x \geq 0 \text{ και } a \geq 0$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.31 ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΡΗΤΟ ΕΚΘΕΤΗ**

Δύναμη ενός μη αρνητικού αριθμού  $a$  με εκθέτη ένα ρητό αριθμό  $\frac{\mu}{\nu}$  ορίζεται να είναι η ρίζα  $\nu$ -τάξης του αριθμού  $a$  υψωμένο στη δύναμη  $\mu$

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^{\mu}}$$

όπου  $a \geq 0$ ,  $\mu \in \mathbb{Z}$  και  $\nu \in \mathbb{Z}^+$ .

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.32 ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ**

Δεκαδικός ονομάζεται ένας αριθμός ο οποίος αποτελείται από ακέραιο και δεκαδικό μέρος χωρισμένα με ένα κόμμα που ονομάζεται υποδιαστολή.

- Ακέραιο μέρος ονομάζεται το μέρος ενός δεκαδικού αριθμού το οποίο αποτελείται από εκείνα τα ψηφία τα οποία βρίσκονται αριστερά από την υποδιαστολή.
- Δεκαδικό ονομάζεται το μέρος ενός δεκαδικού αριθμού το οποίο βρίσκεται δεξιά από την υποδιαστολή και αποτελείται από εκείνα τα ψηφία που είναι υποπολλαπλάσια της μονάδας.
- Τα μηδενικά τα οποία βρίσκονται στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός δεκαδικού αριθμού δε δίνουν αξία στον αριθμό και μπορούν να παραλείπονται.
- Τα ψηφία αυτά προκύπτουν από διαιρέσεις τις μονάδας με δυνάμεις του 10 και ονομάζονται από τα από τα δεκαδικά κλάσματα με την αντίστοιχη δύναμη του 10 : δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, δεκάκις χιλιοστά...

Μέρος	Ακέραιο Μέρος								Δεκαδικό Μέρος		
Όνομα ψηφίου	Εκατομύρια	Εκατοντάδες Χιλιάδες	Δεκάδες Χιλιάδες	Χιλιάδες	Εκατοντάδες	Δεκάδες	Μονάδες	Υποδιαστολή	Δέκατα	Εκατοστά	Χιλιοστά
Συμβ.	Εκ	ΕΧ	ΔΧ	Χ	Ε	Δ	Μ	,	δεκ	εκ	χιλ
Αξία	$10^6$	$10^5$	$10^4$	$10^3$	$10^2$	10	1		$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$
Παράδ.	3	7	5	4	8	0	2	,	9	6	1

*Πίνακας 1.4:* Ψηφία δεκαδικού αριθμού

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.33 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ**

Τυποποιημένη ονομάζεται η μορφή  $a \cdot 10^{\nu}$  στην οποία μπορεί να γραφτεί οποιοσδήποτε αριθμός ως γινόμενο ενός αριθμού  $a$  επί μιας δύναμης του 10.

$$A = a \cdot 10^{\nu}, \quad 1 < a < 10$$

- Ο αριθμός  $a$  είναι δεκαδικός αριθμός μικρότερος του 10.

- Η μορφή αυτή γραφής ενός αριθμού, ονομάζεται και επιστημονική.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.34 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**

Μονάδες μέτρησης ονομάζονται τα μεγέθη - ποσότητες τα οποία χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση άλλων όμοιών τους ποσοτήτων.


Τα κυριότερα ποσά που συναντάμε είναι το μήκος, η επιφάνεια, ο όγκος, το βάρος, ο χρόνος, η θερμοκρασία, και άλλα. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται μερικά απ' αυτά.

**ΜΗΚΟΣ**

Μονάδα Μέτρησης	Συμβολισμός	Σχέσεις μεταξύ Μ.Μ.
Χιλιόμετρο	$1km$	$1km = 1000m$
Μέτρο	$1m$	$1m = 10dm = 100cm = 1000mm$
Δεκατόμετρο	$1dm$	$\frac{1}{10}m = 1dm = 10cm = 100mm$
Εκατοστόμετρο	$1cm$	$\frac{1}{100}m = \frac{1}{10}dm = 1cm = 10mm$
Χιλιοστόμετρο	$1mm$	$\frac{1}{1000}m = \frac{1}{100}dm = \frac{1}{10}cm = 1mm$

Πίνακας 1.5: Μονάδες μέτρησης μήκους

Στο διάγραμμα φαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των μονάδων μέτρησης και ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε μια ποσότητα από τη μια μονάδα μέτρησης στην άλλη :



Σχήμα 1.3: Μετατροπές μονάδων μέτρησης μήκους


**ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**

Μονάδα Μέτρησης	Συμβολισμός	Σχέσεις μεταξύ Μ.Μ.
Τ.Χιλιόμετρο	$1km^2$	$1km^2 = 1000 \text{ στρέμματα} = 10^6m^2$
Στρέμμα	1 στρέμμα	$\frac{1}{1000}km^2 = 1 \text{ στρέμμα} = 1000m^2$
Τ.Μέτρο	$1m^2$	$1m^2 = 100dm^2 = 10^4cm^2 = 10^6mm^2$
Τ.Δεκατόμετρο	$1dm^2$	$\frac{1}{100}m^2 = 1dm^2 = 100cm^2 = 10^4mm^2$
Τ.Εκατοστόμετρο	$1cm^2$	$\frac{1}{10^4}m^2 = \frac{1}{100}dm^2 = 1cm^2 = 100mm^2$
Τ.Χιλιοστόμετρο	$1mm^2$	$\frac{1}{10^6}m^2 = \frac{1}{10^4}dm^2 = \frac{1}{100}cm^2 = 1mm^2$

Πίνακας 1.6: Μονάδες μέτρησης επιφάνειας



Οι σχέσεις μεταξύ των μονάδων μέτρησης επιφάνειας και ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε μια ποσότητα από μια μονάδα μέτρησης σε άλλη φαίνονται στο διάγραμμα :




Σχήμα 1.4: Μετατροπές μονάδων μέτρησης επιφάνειας

## ΟΓΚΟΣ

Μονάδα Μέτρησης	Συμβολισμός	Σχέσεις μεταξύ Μ.Μ.
<b>Κ.Χιλιόμετρο</b>	$1km^3$	$1km^3 = 10^9m^3$
<b>Κ.Μέτρο</b>	$1m^3$	$1m^3 = 1000dm^3 = 10^6cm^3 = 10^9mm^3$
<b>Κ.Δεκατόμετρο</b>	$1dm^3$	$\frac{1}{1000}m^3 = 1dm^3 = 1000cm^3 = 10^6mm^3$
<b>Κ.Εκατοστόμετρο</b>	$1cm^3$	$\frac{1}{10^6}m^3 = \frac{1}{1000}dm^3 = 1cm^3 = 1000mm^3$
<b>Κ.Χιλιοστόμετρο</b>	$1mm^3$	$\frac{1}{10^9}m^3 = \frac{1}{10^6}dm^3 = \frac{1}{1000}cm^3 = 1mm^3$

Πίνακας 1.7: Μονάδες μέτρησης όγκου

Οι σχέσεις μεταξύ των μονάδων μέτρησης επιφάνειας και ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε μια ποσότητα από τη μια μονάδα μέτρησης στην άλλη φαίνονται στο διάγραμμα



Σχήμα 1.5: Μετατροπές μονάδων μέτρησης όγκου


Το κυβικό δεκατόμετρο ( $dm^3$ ) ονομάζεται και **λίτρο** και συμβολίζεται :  $lt$  ενώ το κυβικό εκατοστόμετρο ( $cm^3$ ) ονομάζεται και **χιλιοστόλιτρο** και συμβολίζεται :  $1ml$ .

## ΜΑΖΑ

Μονάδα Μέτρησης	Συμβολισμός	Σχέσεις μεταξύ Μ.Μ.
<b>Τόνος</b>	$1\tau$	$1\tau = 1000kg = 10^6g = 10^9mg$
<b>Κιλό</b>	$1kg$	$\frac{1}{1000}\tau = 1kg = 1000g = 10^6mg$
<b>Γραμμάριο</b>	$1dm^3$	$\frac{1}{10^6}\tau = \frac{1}{1000}kg = 1g = 1000mg$
<b>Χιλιοστόγραμμα</b>	$1cm^3$	$\frac{1}{10^9}\tau = \frac{1}{10^6}kg = \frac{1}{1000}g = 1mg$

Πίνακας 1.8: Μονάδες μέτρησης μάζας

Στο διάγραμμα φαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των μονάδων μέτρησης μάζας και ο τρόπος μετατροπής ενός μεγέθους από τη μία στην άλλη :




Σχήμα 1.6: Μετατροπές μονάδων μέτρησης μάζας

## ΧΡΟΝΟΣ

Μονάδα Μέτρησης	Συμβολισμός	Σχέσεις μεταξύ Μ.Μ.
<b>Έτος</b>	1 έτος	1 έτος = 12 μήνες $\simeq$ 52 εβδομάδες = 365d
<b>Μήνας</b>	1 μήνας	1 μήνας $\simeq$ 30d
<b>Εβδομάδα</b>	1 εβδομάδα	1 εβδομάδα = 7d = 168h
<b>Ημέρα</b>	1d	1d = 24h = 1440min = 86400s
<b>Ώρα</b>	1h	1h = 60min = 3600s
<b>Λεπτό</b>	1min	$\frac{1}{60}h = 1min = 60s$
<b>Δευτερόλεπτο</b>	1s	$\frac{1}{3600}h = \frac{1}{60}min = 1s$

Πίνακας 1.9: Μονάδες μέτρησης χρόνου

Στο παρακάτω διάγραμμα έχουμε τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων μέτρησης χρόνου :



Επιπλέον μονάδες μέτρησης χρόνου είναι

- η δεκαετία
- ο αιώνας (100 χρόνια)
- η χιλιετία.

Στις μετατροπές που κάνουμε ανάμεσα στις μονάδες μέτρησης χρόνου χρησιμοποιούμε, όπου η μετατροπή δεν είναι ακριβής, προσεγγιστικά τους αριθμούς που φαίνονται στο διπλανό διάγραμμα όπως στην περίπτωση της μετατροπής ενός χρονικού διαστήματος από μέρες σε μήνες.

Σχήμα 1.7: Μετατροπές μονάδων μέτρησης χρόνου

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.35 ΠΟΣΟΣΤΟ

Ποσοστό ονομάζεται ο λόγος ο οποίος εκφράζει μέρος μιας ποσότητας.

$$\text{Ποσοστό} = \frac{\text{Μέρος μιας Ποσότητας}}{\text{Ολόκληρη Ποσότητα}}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.36 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 100

Ποσοστό επί τις 100 ονομάζεται ένα κλάσμα το οποίο έχει παρονομαστή το 100.

$$\text{Ποσοστό τοις 100} : \frac{a}{100} = a\%$$

- Συμβολίζεται με  $a\%$  όπου  $a$  ο αριθμητής του κλάσματος.
- Το ποσοστό τις χιλίους είναι το κλάσμα  $\frac{a}{1000}$  και συμβολίζεται με  $a\%$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.37 ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Αναλογία ονομάζεται η ισότητα δύο ή περισσότερων λόγων.

$$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$$

- Οι όροι  $a, \delta$  ονομάζονται **άκροι** όροι, ενώ οι  $\beta, \gamma$  **μέσοι** όροι της αναλογίας.
- Μια αναλογία ονομάζεται **συνεχής** αν οι μέσοι όροι της είναι ίσοι.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.38 ΚΛΙΜΑΚΑ

Κλίμακα ονομάζεται ο λόγος της απόστασης δύο σημείων στην εικόνα ενός αντικειμένου,

προς την πραγματική απόσταση των σημείων αυτών.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.39 ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ**

Ανάλογα ονομάζονται δύο ποσά  $x, y$  όταν ο λόγος των αντίστοιχων τιμών τους παραμένει σταθερός.

- Για τα ανάλογα ποσά αυτά ισχύει η σχέση  $\frac{y}{x} = a$  όπου ο σταθερός αριθμός  $a$  ονομάζεται **συντελεστής αναλογίας**.
- Ισχύει η ισοδυναμία  $\frac{y}{x} = a \Leftrightarrow y = a \cdot x$  που μας δίνει τη σχέση που συνδέει τα ανάλογα ποσά.
- Εάν πολλαπλασιάσουμε τις τιμές του ενός ποσού με έναν αριθμό, θα πολλαπλασιαστούν οι τιμές του άλλου με τον **ίδιο** αριθμό.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.40 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ**

Αντιστρόφως ανάλογα ονομάζονται δύο ποσά  $x, y$  όταν το γινόμενό τους είναι σταθερό.

- Για τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά ισχύει η σχέση  $y \cdot x = a$
- Εάν πολλαπλασιάσουμε τις τιμές του ενός ποσού με έναν αριθμό, θα **διαιρεθούν** οι τιμές του άλλου με τον **ίδιο** αριθμό.

**ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ**

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις βασικές ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.

Ιδιότητα	Πρόσθεση	Πολλαπλασιασμός
Αντιμεταθετική	$a + \beta = \beta + a$	$a \cdot \beta = \beta \cdot a$
Προσεταιριστική	$a + (\beta + \gamma) = (a + \beta) + \gamma$	$a \cdot (\beta \cdot \gamma) = (a \cdot \beta) \cdot \gamma$
Ουδέτερο στοιχείο	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
Επιμεριστική	$a \cdot (\beta \pm \gamma) = a \cdot \beta \pm a \cdot \gamma$	

Πίνακας 1.10: Κανόνες διαιρερότητας

Ισχύουν επίσης :

- Για κάθε πραγματικό αριθμό  $a$  ισχύει  $a \cdot 0 = 0$
- Δύο αριθμοί που έχουν άθροισμα 0 λέγονται **αντίθετοι**.
- Το 0 λέγεται **ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης**.

- Δύο αριθμοί που έχουν γινόμενο 1 λέγονται **αντίστροφοι**.
- Το 1 λέγεται **ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού**.
- Το 0 δεν έχει αντίστροφο.

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.2 ΓΙΝΟΜΕΝΟ - ΠΗΛΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Για οποιουσδήποτε δύο πραγματικούς  $a, \beta \in \mathbb{R}$  ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις :

- Εάν  $a, \beta$  ομόσημοι τότε το γινόμενο και το πηλίκο τους είναι θετικό.
- Εάν  $a, \beta$  ετερόσημοι τότε το γινόμενο και το πηλίκο τους είναι αρνητικό.

$$a, \beta \text{ ομόσημοι} \Rightarrow a \cdot \beta > 0 \text{ και } \frac{a}{\beta} > 0$$

$$a, \beta \text{ ετερόσημοι} \Rightarrow a \cdot \beta < 0 \text{ και } \frac{a}{\beta} < 0$$

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Οι παρακάτω κανόνες μας επιτρέπουν να εξετάσουμε πότε ένας αριθμός διαιρείται με καθέναν από τους βασικούς διαιρέτες που φαίνονται στον πίνακα.

Κανόνας	Περιγραφή
<b>Κανόνας του 2</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 2 αν το τελευταίο ψηφίο του είναι ένα από τα 0,2,4,6,8.
<b>Κανόνας του 5</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 αν το τελευταίο ψηφίο του είναι 0 ή 5.
<b>Κανόνας του 10</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 10 αν το τελευταίο ψηφίο του είναι 0.
<b>Κανόνας του 3 (ή του 9)</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 3 (με το 9) αν το άθροισμα των ψηφίων του είναι πολλαπλάσιο του 3 (του 9).
<b>Κανόνας του 4 (ή του 25)</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 4 (το 25) αν το τελευταίο διψήφιο μέρος του είναι πολλαπλάσιο του 4 (του 25).
<b>Κανόνας του 6</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 6 διαιρείται συγχρόνως με το 2 και το 3.
<b>Κανόνας του 8</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 8 εαν τα τρία τελευταία ψηφία του διαιρούνται με το 8.
<b>Κανόνας του 12</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 12 εαν διαιρείται συγχρόνως με το 3 και το 4.
<b>Κανόνας του 14</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 14 εαν διαιρείται συγχρόνως με το 2 και το 7.
<b>Κανόνας του 15</b>	Ένας αριθμός διαιρείται με το 15 εαν διαιρείται συγχρόνως με το 3 και το 5.

*Πίνακας 1.11:* Κανόνες διαιρερότητας

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.4 ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Εαν το γινόμενο δύο αριθμών  $a, \beta \in \mathbb{R}$  είναι μηδενικό τότε τουλάχιστον ένας απ' αυτούς είναι 0.

$$a \cdot \beta = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ή } \beta = 0$$

Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να γενικευτεί και για γινόμενο περισσοτέρων των δύο παραγόντων. Για  $n$  πραγματικούς αριθμούς  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  έχουμε

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n = 0 \Leftrightarrow a_1 = 0 \text{ ή } a_2 = 0 \text{ ή } \dots \text{ ή } a_n = 0$$

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.5 ΜΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

Εαν το γινόμενο δύο αριθμών  $a, \beta \in \mathbb{R}$  είναι διάφορο του μηδενός τότε κανένας απ' αυτούς δεν είναι 0.

$$a \cdot \beta \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0 \text{ και } \beta \neq 0$$

Το ίδιο θα ισχύει και για το γινόμενο περισσότερων από δύο παραγόντων. Για  $n$  πραγματικούς αριθμούς  $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  θα ισχύει

$$a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \neq 0 \Leftrightarrow a_1 \neq 0 \text{ και } a_2 \neq 0 \text{ και } \dots \text{ και } a_n \neq 0$$

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.6 ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς  $a, x, y \in \mathbb{R}$  με  $a \neq 0$  ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις.

$$a + x = a + y \Rightarrow x = y \text{ και } a \cdot x = a \cdot y \Rightarrow x = y$$

Σύμφωνα με τις ιδιότητες αυτές, μπορούμε να διαγράψουμε από μια ισότητα το μη μηδενικό προσθετέο ή παράγοντα που βρίσκεται και στα δύο μέλη μαις ισότητας.

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.7 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για οποιουδήποτε πραγματικούς αριθμούς ισχύουν οι ιδιότητες όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ιδιότητα	Συνθήκη
Ανακλαστική	Για κάθε $x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \leq x \text{ ή } x \geq x$
Μεταβατική	$\text{Αν } x > y \text{ και } y > z \Rightarrow x > z$
Αντισυμμετρική	$\text{Αν } x \leq y \text{ και } x \geq y \Rightarrow x = y$

*Πίνακας 1.12:* Ιδιότητες διάταξης

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.8 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΣΟΤΗΤΩΝ

- Σε κάθε ισότητα εαν τοποθετήσουμε τον ίδιο αριθμό και στα δύο μέλη της με πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση, η σχέση που προκύπτει είναι ξανά ισότητα :

$$a = \beta \Leftrightarrow \begin{cases} a + \gamma = \beta + \gamma \\ a - \gamma = \beta - \gamma \\ a \cdot \gamma = \beta \cdot \gamma \\ \frac{a}{\gamma} = \frac{\beta}{\gamma} , \gamma \neq 0 \end{cases}$$

- Εαν δύο πραγματικοί αριθμοί  $a, \beta \in \mathbb{R}$  είναι ίσοι τότε και οι  $\nu$ -οστές δυνάμεις τους,  $\nu \in \mathbb{N}$ , θα είναι με ίσες και αντίστροφα.

$$a = \beta \Leftrightarrow a^\nu = \beta^\nu$$

- Εαν δύο θετικοί πραγματικοί αριθμοί  $a, \beta > 0$  είναι ίσοι τότε και οι  $\nu$ -οστές ρίζες τους,  $\nu \in \mathbb{N}$ , θα είναι με ίσες και αντίστροφα.

$$a = \beta \Leftrightarrow \sqrt[\nu]{a} = \sqrt[\nu]{\beta}$$

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.9 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΗ

Προσθέτοντας κατά μέλη κάθε ζεύγος ισοτήτων προκύπτει ισότητα, με 1<sup>ο</sup> μέλος το άθροισμα των 1<sup>ων</sup> μελών τους και 2<sup>ο</sup> μέλος το άθροισμα των 2<sup>ων</sup> μελών τους. Η ιδιότητα αυτή ισχύει και για αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση κατά μέλη.

$$a = \beta \text{ και } \gamma = \delta \Leftrightarrow \begin{cases} 1. \text{ Πρόσθεση κατά μέλη} & a + \gamma = \beta + \delta \\ 2. \text{ Αφαίρεση κατά μέλη} & a - \gamma = \beta - \delta \\ 3. \text{ Πολλαπλασιασμός κατά μέλη} & a \cdot \gamma = \beta \cdot \delta \\ 4. \text{ Διαίρεση κατά μέλη} & \frac{a}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta} , \gamma \cdot \delta \neq 0 \end{cases}$$

Ο κανόνας αυτός επεκτείνεται και για πράξεις κατα μέλη σε περισσότερες από δύο ισότητες, στις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού.

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.10 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

- Εαν σε μια ανισότητα προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό και απ' τα δύο μέλη της, προκύπτει ξανά ανισότητα με την ίδια φορά της αρχικής.

$$a > \beta \Leftrightarrow \begin{cases} a + \gamma > \beta + \gamma \\ a - \gamma > \beta - \gamma \end{cases}$$

- Για να πολλαπλασιάσουμε ή να διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο αριθμό διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :

1. Εάν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο **θετικό** αριθμό, τότε προκύπτει ανισότητα με την **ίδια** φορά της αρχικής.
2. Εάν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τα δύο μέλη μιας ανισότητας με τον ίδιο **αρνητικό** αριθμό, τότε προκύπτει ανισότητα με φορά **αντίθετη** της αρχικής.

$$\text{Αν } \gamma > 0 \text{ τότε } a > \beta \Leftrightarrow a \cdot \gamma > \beta \cdot \gamma \text{ και } \frac{a}{\gamma} > \frac{\beta}{\gamma}$$

$$\text{Αν } \gamma < 0 \text{ τότε } a > \beta \Leftrightarrow a \cdot \gamma < \beta \cdot \gamma \text{ και } \frac{a}{\gamma} < \frac{\beta}{\gamma}$$

- Για να υψώσουμε κάθε μέλος μιας ανισότητας  $a > \beta$  με  $a, \beta \in \mathbb{R}$  σε έναν ακέραιο εκθέτη  $\nu \in \mathbb{Z}$  διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Αν  $\nu > 0$  **άρτιος** εκθέτης και

- i.  $a, \beta > 0$  τότε  $a > \beta \Leftrightarrow a^\nu > \beta^\nu$  (Η φορά παραμένει ίδια.)
- ii.  $a, \beta < 0$  τότε  $a > \beta \Leftrightarrow a^\nu < \beta^\nu$  (Η φορά αλλάζει.)
- iii.  $a \cdot \beta < 0$  δηλαδή ετερόσημοι τότε δεν υψώνουμε σε δύναμη.

2. Αν  $\nu > 0$  **περιττός** εκθέτης τότε  $a > \beta \Leftrightarrow a^\nu > \beta^\nu$

- Εάν δύο θετικοί πραγματικοί αριθμοί  $a, \beta > 0$  είναι άνισοι τότε και οι  $\nu$ -οστές ρίζες τους,  $\nu \in \mathbb{N}$ , θα είναι με την ίδια φορά άνισες και αντίστροφα.

$$a > \beta \Leftrightarrow \sqrt[\nu]{a} > \sqrt[\nu]{\beta}$$

Τις περιπτώσεις όπου ο εκθέτης είναι αρνητικός θα τις δούμε αναλυτικά στο επόμενο θεώρημα. Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν και για τις ανισότητες  $a < \beta$ ,  $a \geq \beta$  και  $a \leq \beta$ .

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.11 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΩΝ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗ

Εάν αντιστρέψουμε τα μέλη μιας ανισότητας, τότε προκύπτει ανισότητα με φορά

- αντίθετη της αρχικής αν τα μέλη της είναι ομόσημα και
- ίδια της αρχικής αν τα μέλη της είναι ετερόσημα.

$$\text{Αν } a, \beta \text{ ομόσημοι τότε } a > \beta \Leftrightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{\beta}$$

$$\text{Αν } a, \beta \text{ ετερόσημοι τότε } a > \beta \Leftrightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{\beta}$$

Το θεώρημα αυτό είναι μια ειδική περίπτωση του **Θεωρήματος 1.10** όπου ο εκθέτης είναι **αρνητικός** και **περιττός** και πιο συγκεκριμένα  $\nu = -1$ . Μπορούμε λοιπόν να γενικεύσουμε τον κανόνα αυτό για αρνητικό εκθέτη, συνεχίζοντας να διακρίνουμε τις περιπτώσεις του προηγούμενου θεωρήματος.

3. Αν  $\nu > 0$  **άρτιος** εκθέτης και




- i.  $a, \beta > 0$  τότε  $a > \beta \Leftrightarrow a^{-\nu} < \beta^{-\nu}$  (Η φορά αλλάζει.)
- ii.  $a, \beta < 0$  τότε  $a > \beta \Leftrightarrow a^{-\nu} > \beta^{-\nu}$  (Η φορά παραμένει ίδια.)
- iii.  $a \cdot \beta < 0$  δηλαδή ετερόσημοι τότε δεν υψώνουμε σε δύναμη.

4. Αν  $\nu > 0$  **περιττός** εκθέτης και

- i.  $a, \beta$  ομόσημοι τότε  $a > \beta \Leftrightarrow a^{-\nu} < \beta^{-\nu}$  (Η φορά αλλάζει.)
- ii.  $a, \beta$  ετερόσημοι τότε  $a > \beta \Leftrightarrow a^{-\nu} > \beta^{-\nu}$  (Η φορά παραμένει ίδια.)

Οι περιπτώσεις αυτές φαίνονται πιο καθαρά και συγκεντρωτικά στο παρακάτω διάγραμμα.



Σχήμα 1.8: Δυνάμεις μελών ανίσωσης

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

Προσθέτοντας κατά μέλη κάθε ζεύγος ανισοτήτων προκύπτει ανισότητα, με 1<sup>ο</sup> μέλος το άθροισμα των 1<sup>ων</sup> μελών τους και 2<sup>ο</sup> μέλος το άθροισμα των 2<sup>ων</sup> μελών τους με φορά ίδια της αρχικής. Ομοίως πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη δύο ανισότητες προκύπτει ανισότητα με φορά ίδια της αρχικής. Για να πολλαπλασιαστούν δύο ανισότητες κατά μέλη πρέπει όλοι οι όροι τους να είναι θετικοί.

$$a > \beta \text{ και } \gamma > \delta \Leftrightarrow \begin{cases} 1. \text{ Πρόσθεση κατά μέλη} & a + \gamma > \beta + \delta \\ 2. \text{ Πολλαπλασιασμός κατά μέλη} & a \cdot \gamma > \beta \cdot \delta, \text{ με } a, \beta, \gamma, \delta > 0 \end{cases}$$

Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να διαιρέσουμε ανισότητες κατά μέλη.

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.13 ΔΥΝΑΜΗ ΜΕ ΑΡΤΙΟ ΕΚΘΕΤΗ**

Το τετράγωνο κάθε πραγματικού αριθμού  $a \in \mathbb{R}$  είναι μη αρνητικός αριθμός :

$$a^2 \geq 0$$

Η ιδιότητα ισχύει και για οποιοδήποτε άρτιο εκθέτη του αριθμού  $a$ .

$$a^{2\kappa} \geq 0 \quad , \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

Η ισότητα ισχύει όταν ο πραγματικός αριθμός, δηλαδή η βάση της δύναμης, είναι 0.

$$a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.14 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕ ΑΡΤΙΟ ΕΚΘΕΤΗ**

Το άθροισμα τετραγώνων οποιονδήποτε πραγματικών αριθμών  $a, \beta \in \mathbb{R}$  είναι μη αρνητικός αριθμός

$$a^2 + \beta^2 \geq 0$$

Η ισότητα ισχύει όταν οι βάσεις των δυνάμεων, είναι 0.

$$a^2 + \beta^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ και } \beta = 0$$

Η ιδιότητα αυτή γενικεύεται και για άθροισμα πολλών πραγματικών αριθμών υψωμένων σε οποιοδήποτε άρτιο εκθέτη.

$$a_1^{2\kappa_1} + a_2^{2\kappa_2} + \dots + a_\nu^{2\kappa_\nu} \geq 0 \quad , \quad \kappa_i \in \mathbb{Z} \quad , \quad i = 1, 2, \dots, \nu$$

Η ισότητα ισχύει όταν οι βάσεις των δυνάμεων είναι μηδενικές.

$$a_1^{2\kappa_1} + a_2^{2\kappa_2} + \dots + a_\nu^{2\kappa_\nu} = 0 \Leftrightarrow a_1 = a_2 = \dots = a_\nu = 0$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.15 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

Για κάθε δύναμη με βάση έναν αριθμό  $a \in \mathbb{R}$  ορίζουμε

$$a^1 = a \quad , \quad a^0 = 1 \quad , \quad \text{όπου } a \neq 0 \quad , \quad a^{-\nu} = \frac{1}{a^\nu} \quad , \quad \text{όπου } a \neq 0$$

Επίσης για κάθε δύναμη με βάση πραγματικούς αριθμούς  $a, \beta \in \mathbb{R}$  και φυσικούς εκθέτες  $\nu, \mu \in \mathbb{N}$  και εφόσον ορίζεται, ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες :

	Ιδιότητα	Συνθήκη
1	Γινόμενο δυνάμεων με κοινή βάση	$a^\nu \cdot a^\mu = a^{\nu+\mu}$
2	Πηλίκο δυνάμεων με κοινή βάση	$a^\nu : a^\mu = a^{\nu-\mu}$
3	Γινόμενο δυνάμεων με κοινό εκθέτη	$(a \cdot \beta)^\nu = a^\nu \cdot \beta^\nu$

---

4	Πηλίκο δυνάμεων με κοινό εκθέτη	$\left(\frac{a}{\beta}\right)^v = \frac{a^v}{\beta^v}, \beta \neq 0$
5	Δύναμη υψωμένη σε δύναμη	$(a^v)^\mu = a^{v \cdot \mu}$
6	Κλάσμα με αρνητικό εκθέτη	$\left(\frac{a}{\beta}\right)^{-v} = \left(\frac{\beta}{a}\right)^v, a, \beta \neq 0$

---

Πίνακας 1.13: Ιδιότητες δυνάμεων

Οι ιδιότητες 1 και 3 ισχύουν και για γινόμενο περισσότερων των δύο παραγόντων.

$$a^{v_1} \cdot a^{v_2} \cdot \dots \cdot a^{v_k} = a^{v_1 + v_2 + \dots + v_k}$$

$$(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_k)^v = a_1^v \cdot a_2^v \cdot \dots \cdot a_k^v$$

Για τις δυνάμεις με ρητό εκθέτη της μορφής  $a^{\frac{\mu}{v}}$ , όπου  $\mu \in \mathbb{Z}$  και  $v \in \mathbb{N}$  ισχύουν οι ιδιότητες 1 - 6 με την προϋπόθεση οι βάσεις να είναι θετικοί αριθμοί δηλαδή  $a, \beta > 0$ .

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.16 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς  $a, \beta \in \mathbb{R}$  ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες για τις απόλυτες τιμές τους :

	Ιδιότητα	Συνθήκη
1	Πρόσημο απόλυτης τιμής	$ a  =  -a  \geq 0$
2	Απόλυτη τιμή μηδενός	$ a  = 0 \Leftrightarrow a = 0$
3	Όρια αριθμού	$- a  \leq a \leq  a $
4	Απόλυτη τιμή γινομένου	$ a \cdot \beta  =  a  \cdot  \beta $
5	Απόλυτη τιμή πηλίκου	$\left \frac{a}{\beta}\right  = \frac{ a }{ \beta }$
6	Τετράγωνο απόλυτης τιμής	$ a ^2 = a^2$
7	Τριγωνική ανισότητα	$  a - \beta   \leq  a \pm \beta  \leq  a  +  \beta $

---

Πίνακας 1.14: Ιδιότητες απόλυτης τιμής

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.41 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΙΖΩΝ**

Για κάθε  $x, y \in \mathbb{R}$  πραγματικούς αριθμούς και  $\nu, \mu, \rho \in \mathbb{N}$  φυσικούς αριθμούς ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες για την τετραγωνική και  $\nu$ -οστή ρίζα τους.

Ιδιότητα		Συνθήκη
1	Τετράγωνο ρίζας	$(\sqrt{x})^2 = x \quad , \quad \forall x \geq 0$
2	$\nu$ -οστή δύναμη $\nu$ -οστής ρίζας	$(\sqrt[\nu]{x})^\nu = x \quad , \quad \forall x \geq 0$
3	Ρίζα τετραγώνου	$\sqrt{x^2} =  x  \quad , \quad \forall x \in \mathbb{R}$
4	$\nu$ -οστή ρίζα $\nu$ -οστής δύναμης	$\sqrt[\nu]{x^\nu} = \begin{cases}  x  & \forall x \in \mathbb{R} \text{ αν } \nu \text{ άρτιος} \\ x & \forall x \geq 0 \text{ και } \forall \nu \in \mathbb{N} \end{cases}$
5	Ρίζα γινομένου	$\sqrt{x \cdot y} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} \quad , \quad \forall x, y \geq 0$
		$\sqrt[\nu]{x \cdot y} = \sqrt[\nu]{x} \cdot \sqrt[\nu]{y} \quad , \quad \forall x, y \geq 0$
6	Ρίζα πηλίκου	$\sqrt{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} \quad , \quad \forall x \geq 0 \text{ και } y > 0$
		$\sqrt[\nu]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[\nu]{x}}{\sqrt[\nu]{y}} \quad , \quad \forall x \geq 0 \text{ και } y > 0$
7	$\mu$ -οστή ρίζα $\nu$ -οστής ρίζας	$\sqrt[\mu]{\sqrt[\nu]{x}} = \sqrt[\nu]{\sqrt[\mu]{x}} \quad , \quad \forall x \geq 0$
8	Απλοποίηση ρίζας	$\sqrt[\nu]{x^\nu \cdot y} = x \sqrt[\nu]{y} \quad , \quad \forall x, y \geq 0$
9	Απλοποίηση τάξης και δύναμης	$\sqrt[\mu \cdot \rho]{x^{\nu \cdot \rho}} = \sqrt[\mu]{x^\nu} \quad , \quad \forall x \geq 0$

*Πίνακας 1.15: Ιδιότητες ριζών*

- Η ιδιότητα 5 ισχύει και για γινόμενο περισσότερων των δύο παραγόντων.

$$\sqrt[\nu]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_\nu} = \sqrt[\nu]{x_1} \cdot \sqrt[\nu]{x_2} \cdot \dots \cdot \sqrt[\nu]{x_\nu}$$

όπου  $x_1, x_2, \dots, x_\nu \geq 0$  και  $\nu \in \mathbb{N}$ .

- Η ιδιότητα 7 ισχύει και για παραστάσεις που περιέχουν πολλές ρίζες διαφόρων τάξεων στις οποίες η μια ρίζα βρίσκεται μέσα στην άλλη.

$$\sqrt[\mu_1]{\sqrt[\mu_2]{\sqrt[\mu_3]{\dots \sqrt[\mu_\nu]{x}}}} = \sqrt[\mu_1 \cdot \mu_2 \cdot \dots \cdot \mu_\nu]{x}$$

με  $x \geq 0$  και  $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_\nu \in \mathbb{N}$ .

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.17 ΧΙΑΣΤΙ ΓΙΝΟΜΕΝΑ**

Δύο κλάσματα είναι ίσα αν και μόνο αν τα «χιαστί» γινομενά τους είναι ίσα.

$$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow a \cdot \delta = \beta \cdot \gamma, \quad \beta, \delta \neq 0$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.18 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ**

Για κάθε αναλογία με όρους  $a, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$  πραγματικούς αριθμούς με  $a\beta, \gamma, \delta \neq 0$  ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες :

Ιδιότητα		Συνθήκη
1	Χιαστί γινόμενα	$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow a \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$
2	Εναλλαγή μέσων και άκρων όρων	$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{a}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta} \quad \text{και} \quad \frac{\delta}{\beta} = \frac{\gamma}{a}$
3	Άθροισμα - Διαφορά στους αριθμητές	$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{a \pm \beta}{\beta} = \frac{\gamma \pm \delta}{\delta}$
4	Άθροισμα - Διαφορά στους παρονομαστές	$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{a}{a \pm \beta} = \frac{\gamma}{\gamma \pm \delta}$
5	Άθροισμα - Διαφορά αριθμ. και παρονομ.	$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{a \pm \beta}{\gamma \pm \delta}$

*Πίνακας 1.16: Ιδιότητες αναλογιών*

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.19 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 1**

Για τη σύγκριση ενός κλάσματος  $\frac{a}{\beta}$  με τον αριθμό 1 έχουμε

- Αν σε ένα κλάσμα, ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή τότε το κλάσμα είναι μεγαλύτερο του 1.

$$a > \beta \Leftrightarrow \frac{a}{\beta} > 1$$

- Αν σε ένα κλάσμα, ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή τότε το κλάσμα είναι μικρότερο του 1.

$$a < \beta \Leftrightarrow \frac{a}{\beta} < 1$$

- Αν σε ένα κλάσμα, ο αριθμητής είναι ίσος με τον παρονομαστή τότε το κλάσμα είναι ίσο με το 1.

$$a = \beta \Leftrightarrow \frac{a}{\beta} = 1$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.20 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ**

Για τη σύγκριση κλασμάτων μεταξύ τους έχουμε :

- Αν δύο κλάσματα είναι ομώνυμα τότε μεγαλύτερο είναι εκείνο με το μεγαλύτερο αριθμητή.

$$a > \beta \Leftrightarrow \frac{a}{\gamma} > \frac{\beta}{\gamma} \quad , \quad \gamma \neq 0$$

- Αν δύο κλάσματα έχουν κοινό αριθμητή, μεγαλύτερο είναι εκείνο με το μικρότερο παρονομαστή.

$$a > \beta \Leftrightarrow \frac{\gamma}{a} < \frac{\gamma}{\beta} \quad , \quad a, \beta, \gamma \neq 0$$

- Για να συγκρίνουμε δύο ετερόνυμα κλάσματα με διαφορετικούς αριθμητές, τα μετατρέπουμε σε ομώνυμα οπότε τα συγκρίνουμε όπως στην πρώτη περίπτωση.

---

## 1.2 Αλγεβρικές Παραστάσεις - Εξισώσεις - Ανισώσεις

---

### ΟΡΙΣΜΟΙ

---

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.42 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ**

Μεταβλητή ονομάζεται το γράμμα ή το σύμβολο που χρησιμοποιούμε για να συμβολίσουμε έναν άγνωστο αριθμό. Χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε γράμμα του ελληνικού ή του λατινικού αλφαβήτου όπως  $a, \beta, x, y, \dots$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.43 ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ**

Αλγεβρική ονομάζεται κάθε παράσταση η οποία περιέχει πράξεις με αριθμούς και μεταβλητές.

- Τιμή μιας αλγεβρικής παράστασης ονομάζεται ο αριθμός που προκύπτει ύστερα από πράξεις εαν αντικατασταθούν οι μεταβλητές της με αριθμούς.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.44 ΑΚΕΡΑΙΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ**

Ακέραια ονομάζεται μια αλγεβρική παράσταση που περιέχει μόνο τις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού ανάμεσα στις μεταβλητές οι οποίες έχουν εκθέτες φυσικούς αριθμούς.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.45 ΜΟΝΩΝΥΜΟ**

Μονώνυμο ονομάζεται η ακέραια αλγεβρική παράσταση η οποία έχει ανάμεσα στις μεταβλητές μόνο την πράξη του πολλαπλασιασμού.

$$\text{Συντελεστής} \longrightarrow a \cdot \underbrace{x^{\nu_1} y^{\nu_2} \dots z^{\nu_k}}_{\text{κύριο μέρος}} \quad , \quad \nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k \in \mathbb{Z}$$

- Το γινόμενο των μεταβλητών ενός μονωνύμου ονομάζεται **κύριο μέρος**.

- Ο σταθερός αριθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζουμε το κύριο μέρος ενός μονωνύμου ονομάζεται **συντελεστής**.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.46 ΒΑΘΜΟΣ ΜΟΝΩΝΥΜΟΥ

Βαθμός μονωνύμου, ως προς μια μεταβλητή, ονομάζεται ο εκθέτης της μεταβλητής.

- Βαθμός ενός μονωνύμου ως προς όλες τις μεταβλητές του είναι το άθροισμα των βαθμών κάθε μεταβλητής.
- Οι πραγματικοί αριθμοί ονομάζονται **σταθερά** μονώνυμα και είναι μηδενικού βαθμού, ενώ το 0 ονομάζεται **μηδενικό** μονώνυμο και δεν έχει βαθμό.

$$a \cdot x^{\nu} y^{\mu}$$

←  $\begin{array}{l} \nu \text{ βαθμού ως προς } x \\ \mu \text{ βαθμού ως προς } y \\ \nu + \mu \text{ βαθμού ως προς } x \text{ και } y \end{array}$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.47 ΟΜΟΙΑ - ΊΣΑ - ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΟΝΩΝΥΜΑ

- Όμοια ονομάζονται τα μονώνυμα που έχουν το ίδιο κύριο μέρος.
- Ίσα ονομάζονται δύο ή περισσότερα όμοια μονώνυμα που έχουν ίσους συντελεστές.
- Αντίθετα ονομάζονται δύο όμοια μονώνυμα που έχουν αντίθετους συντελεστές.

$$a \cdot x^{\nu} y^{\mu} , \beta \cdot x^{\nu} y^{\mu}$$

← Όμοια μονώνυμα

$$a \cdot x^{\nu} y^{\mu} , a \cdot x^{\nu} y^{\mu}$$

← Ίσα μονώνυμα

$$a \cdot x^{\nu} y^{\mu} , -a \cdot x^{\nu} y^{\mu}$$

← Αντίθετα μονώνυμα

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.48 ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ

Πολύωνυμο ονομάζεται η ακέραια αλγεβρική παράσταση η οποία είναι άθροισμα ανόμοιων μονωνύμων.

- Κάθε μονώνυμο μέσα σ' ένα πολυώνυμο ονομάζεται όρος του πολυωνύμου.
- Το πολυώνυμο με 3 όρους ονομάζεται **τριώνυμο**.
- Οι αριθμοί ονομάζονται σταθερά πολυώνυμα ενώ το 0 μηδενικό πολυώνυμο.
- Τα πολυώνυμα τα συμβολίζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα όπως:  $P(x)$ ,  $Q(x)$ ,  $A(x)$ ,  $B(x)$  κτλ. και δίπλα σε μια παρένθεση γράφουμε τη μεταβλητή τους.
- Βαθμός ενός πολυωνύμου είναι ο βαθμός του μεγιστοβάθμιου όρου.
- Τα πολυώνυμα μιας μεταβλητής τα γράφουμε κατά φθίνουσες δυνάμεις της μεταβλητής δηλαδή από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη.
- Οι αριθμοί λέγονται **σταθερά** πολυώνυμα ενώ το 0 **μηδενικό** πολυώνυμο.

$$P(x) = a_{\nu} x^{\nu} + a_{\nu-1} x^{\nu-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.49 ΤΙΜΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ

Τιμή ενός πολυωνύμου  $P(x)$  ονομάζεται ο πραγματικός αριθμός που προκύπτει ύστερα από

πράξεις αν αντικαταστήσουμε τη μεταβλητή του πολυνύμου με έναν αριθμό  $x_0$ . Συμβολίζεται με  $P(x_0)$  και είναι ίσο με :

$$P(x_0) = a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + 0 + a_0$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.50 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΝΩΜΟΥ

Ρίζα ενός πολυνύμου  $P(x)$  ονομάζεται κάθε πραγματικός αριθμός  $\rho \in \mathbb{R}$  ο οποίος μηδενίζει το πολυνώνιο.

$$\rho \text{ ρίζα του } P(x) \Leftrightarrow P(\rho) = 0$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.51 ΑΝΑΓΩΓΗ ΟΜΟΙΩΝ ΟΡΩΝ

Αναγωγή ομοίων όρων ονομάζεται η διαδικασία με την οποία απλοποιούμε μια αλγεβρική παράσταση προσθέτοντας ή αφαιρώντας τους όμοιους όρους της.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.52 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ταυτότητα ονομάζεται κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και επαληθεύεται για κάθε τιμή των μεταβλητών.

### ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

#### 1. Άθροισμα στο τετράγωνο

$$(a + \beta)^2 = a^2 + 2a\beta + \beta^2$$

#### 2. Διαφορά στο τετράγωνο

$$(a - \beta)^2 = a^2 - 2a\beta + \beta^2$$

#### 3. Άθροισμα στον κύβο

$$(a + \beta)^3 = a^3 + 3a^2\beta + 3a\beta^2 + \beta^3$$

#### 4. Διαφορά στον κύβο

$$(a - \beta)^3 = a^3 - 3a^2\beta + 3a\beta^2 - \beta^3$$

#### 5. Γινόμενο αθροίσματος επί διαφορά

$$(a + \beta)(a - \beta) = a^2 - \beta^2$$

#### 6. Άθροισμα κύβων

$$(a + \beta)(a^2 - a\beta + \beta^2) = a^3 + \beta^3$$

#### 7. Διαφορά κύβων

$$(a - \beta)(a^2 + a\beta + \beta^2) = a^3 - \beta^3$$

Εκτός τις βασικές συναντούμε επίσης και τις παρακάτω εξίσου αξιοσημείωτες ταυτότητες μερικές των οποίων γράφονται με τη βοήθεια των βασικών :

#### 8. Άθροισμα τετραγώνων δύο όρων

$$a^2 + \beta^2 = (a + \beta)^2 - 2a\beta = (a - \beta)^2 + 2a\beta$$

#### 9. Άθροισμα τετραγώνων τριών όρων

$$a^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (a + \beta + \gamma)^2 - 2(a\beta + \beta\gamma + a\gamma)$$

#### 10. Άθροισμα κύβων

$$a^3 + \beta^3 = (a + \beta)^3 - 3a\beta(a + \beta)$$

#### 11. Διαφορά κύβων

$$a^3 - \beta^3 = (a - \beta)^3 + 3a\beta(a - \beta)$$

#### 12. Τετράγωνο τριωνύμου

$$(a + \beta + \gamma)^2 = a^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2a\beta + 2\beta\gamma + 2a\gamma$$



**13. Κύβος τριωνύμου**

$$(a + \beta + \gamma)^3 = a^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(a + \beta)(\beta + \gamma)(a + \gamma)$$

**14. Τετράγωνο πολυνύμου**

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_v)^2 = \sum_{i=1}^v x_i^2 + 2 \sum_{i,j=1}^v x_i x_j, \quad i \neq j$$

**15. Άθροισμα - Διαφορά ν-οστών δυνάμεων**

$$x^v \pm y^v = (x \pm y) (x^{v-1} \mp x^{v-2}y + x^{v-3}y^2 \mp \dots \mp xy^{v-2} + y^{v-1})$$

**16. Τριώνυμο**

$$(x + a)(x + \beta) = x^2 + (a + \beta)x + a\beta$$

**17. Ταυτότητα Lagrange**

$$(a^2 + \beta^2)(x^2 + y^2) = (ax + \beta y)^2 + (ay - \beta x)^2$$

**18. Διώνυμο Newton**

$$(x + y)^v = \sum_{i=1}^v \binom{v}{v-i} x^{v-i} y^i$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.53 ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ**

Παραγοντοποίηση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία μετατρέπουμε μια αλγεβρική παράσταση από άθροισμα, σε γινόμενο παραγόντων.

**ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ****1. Κοινός Παράγοντας**

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται όταν σ' όλους τους όρους της παράστασης υπάρχει κοινός παράγοντας.

**2. Ομαδοποίηση**

Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δεν υπάρχει σε όλους τους όρους μιας παράστασης κοινός παράγοντας οπότε μοιράζονται οι όροι σε ομάδες έτσι ώστε κάθε ομάδα να έχει δικό της κοινό παράγοντα.

**3. Διαφορά Τετραγώνων**

Κάθε σχέση της μορφής  $a^2 - \beta^2$  έχει παραγοντοποιημένη μορφή την :

$$a^2 - \beta^2 = (a - \beta)(a + \beta)$$

**4. Διαφορά - Άθροισμα Κύβων**

Κάθε σχέση της μορφής  $a^3 - \beta^3$  ή  $a^3 + \beta^3$  έχει παραγοντοποιημένη μορφή την :

$$a^3 - \beta^3 = (a - \beta)(a^2 + a\beta + \beta^2)$$

$$a^3 + \beta^3 = (a + \beta)(a^2 - a\beta + \beta^2)$$

**5. Ανάπτυγμα Τετραγώνου**

Κάθε σχέση της μορφής  $a^2 \pm 2a\beta + \beta^2$  έχει παραγοντοποιημένη μορφή την :

$$a^2 + 2a\beta + \beta^2 = (a + \beta)^2$$

$$a^2 - 2a\beta + \beta^2 = (a - \beta)^2$$

**6. Τριώνυμο**

Κάθε σχέση της μορφής  $x^2 + (a + \beta)x + a\beta$  έχει παραγοντοποιημένη μορφή την :

$$x^2 + (a + \beta)x + a\beta = (x + a)(x + \beta)$$

Αν το τριώνυμο είναι της μορφής  $ax^2 + \beta x + \gamma$  τότε υπολογίζοντας τις ρίζες του, με τον τρόπο που βλέπουμε στη Μέθοδο... παραγοντοποιείται ως εξής :

$$ax^2 + \beta x + \gamma = a(x - x_1)(x - x_2)$$

**7. Ανάπτυγμα Κύβου**

$$a^3 + 3a^2\beta + 3a\beta^2 + \beta^3 = (a + \beta)^3$$

$$a^3 - 3a^2\beta + 3a\beta^2 - \beta^3 = (a - \beta)^3$$

**8. Ανάπτυγμα Τετραγώνου Τριωνύμου**

$$a^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2a\beta + 2\beta\gamma + 2a\gamma = (a + \beta + \gamma)^2$$

**9. Ανάπτυγμα Κύβου Τριωνύμου**

$$a^3 + \beta^3 + \gamma^3 + 3(a + \beta)(\beta + \gamma)(a + \gamma) = (a + \beta + \gamma)^3$$

**10. Άθροισμα - Διαφορά ν-οστών δυνάμεων**

$$x^n \pm y^n = (x \pm y) (x^{n-1} \mp x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 \mp \dots \mp xy^{n-1} + y^{n-1})$$

Σε γενικές γραμμές, κάθε ταυτότητα μας δίνει μια μορφή παραγοντοποίησης εαν μετατρέψουμε το ανάπτυγμα της στην αρχική του μορφή η οποία αποτελεί γινόμενο παραγόντων.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.54 ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ**

Ευκλείδεια διαίρεση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία για κάθε ζεύγος πολυωνύμων  $\Delta(x)$ ,  $\delta(x)$  (Διαιρετέος και διαιρέτης αντίστοιχα) προκύπτουν μοναδικά πολυώνυμα  $\pi(x)$ ,  $\nu(x)$  (πηλίκο και υπόλοιπο) για τα οποία ισχύει :

$$\Delta(x) = \delta(x) \cdot \pi(x) + \nu(x)$$

- Η παραπάνω ισότητα ονομάζεται **ταυτότητα της ευκλείδειας διαίρεσης**.
- Εάν  $\nu(x) = 0$  τότε η διαίρεση ονομάζεται **τέλεια** ενώ η ταυτότητα της διαίρεσης είναι

$$\Delta(x) = \delta(x) \cdot \pi(x)$$

- Στην τέλεια διαίρεση τα πολυώνυμα  $\delta(x)$ ,  $\pi(x)$  ονομάζονται **παράγοντες** ή **διαιρέτες**.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.55 Ε.Κ.Π. ΚΑΙ Μ.Κ.Δ. ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

1. Ε.Κ.Π. δύο ή περισσότερων πολυωνύμων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο παραγόντων ονομάζεται το πολυώνυμο που αποτελείται από τους κοινούς και μη κοινούς παράγοντες τους, υψωμένους στον μεγαλύτερο εκθέτη.
2. Μ.Κ.Δ. δύο ή περισσότερων πολυωνύμων που έχουν αναλυθεί σε γινόμενο παραγόντων ονομάζεται το πολυώνυμο που αποτελείται μόνο από τους κοινούς παράγοντες τους, υψωμένους τον καθένα στο μικρότερο εκθέτη.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.56 ΡΗΤΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ρητή ονομάζεται κάθε αλγεβρική παράσταση η οποία έχει τη μορφή κλάσματος. Είναι δηλαδή της μορφής

$$\frac{P(x)}{Q(x)}, \quad P(x), Q(x) \text{ πολυώνυμα με } Q(x) \neq 0$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.57 ΑΡΡΗΤΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Άρρητη ονομάζεται κάθε αλγεβρική παράσταση η οποία δεν είναι ρητή. Είναι της μορφής

$$\sqrt[n]{A(x)}$$

περιέχει δηλαδή τουλάχιστον μια ρίζα οποιασδήποτε τάξης.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.58 ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Μεταβλητή ονομάζεται το σύμβολο το οποίο χρησιμοποιούμε για εκφράσουμε έναν άγνωστο αριθμό. Η μεταβλητή μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μια εξίσωση και γενικά σε μια αλγεβρική παράσταση. Συμβολίζεται με ένα γράμμα όπως  $a, \beta, x, y, \dots$  κ.τ.λ.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.59 ΕΞΙΣΩΣΗ

Εξίσωση ονομάζεται κάθε ισότητα που περιέχει τουλάχιστον μια μεταβλητή δηλαδή κάθε σχέση της μορφής :

$$P(x, y, \dots, z) = 0$$

όπου  $P(x, y, \dots, z)$  είναι μια αλγεβρική παράσταση πολλών μεταβλητών.

- Εξίσωση με έναν άγνωστο ονομάζεται μια ισότητα η οποία περιέχει μια μεταβλητή.
- Μια εξίσωση αποτελείται από **2 μέλη**, τα οποία είναι τα μέρη της δεξιά και αριστερά του  $=$ .
- **Άγνωστοι** ονομάζονται οι όροι της εξίσωσης οι οποίοι περιέχουν τη μεταβλητή, ενώ **γνωστοί** ονομάζονται οι αριθμοί δηλαδή οι σταθεροί όροι της εξίσωσης.
- Κάθε αριθμός που επαληθεύει μια εξίσωση ονομάζεται **λύση** της.
- Η διαδικασία με την οποία βρίσκουμε τη λύση μιας εξίσωσης ονομάζεται **επίλυση**.
- Δύο ή περισσότερες εξισώσεις που έχουν ακριβώς τις ίδιες λύσεις ονομάζονται **ισοδύναμες**.

- Εάν μια εξίσωση έχει λύσεις όλους τους πραγματικούς αριθμούς ονομάζεται **ταυτότητα** ή **αόριστη**.
- Εάν μια εξίσωση δεν έχει καμία λύση ονομάζεται **αδύνατη**.
- Εάν σε μια εξίσωση πολλών μεταβλητών, ορίσουμε ένα μέρος των μεταβλητών αυτών ως κύριες μεταβλητές της εξίσωσης τότε οι επιπλέον μεταβλητές ονομάζονται **παράμετροι** ενώ η εξίσωση λέγεται **παραμετρική**.
- Η διαδικασία με την οποία υπολογίζουμε το πλήθος των λύσεων μιας παραμετρικής εξίσωσης ονομάζεται **διερεύνηση**.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.60 ΕΞΙΣΩΣΗ 1<sup>ΟΥ</sup> ΒΑΘΜΟΥ

Εξίσωση 1<sup>ου</sup> βαθμού με έναν άγνωστο ονομάζεται κάθε πολυωνυμική εξίσωση της οποίας η αλγεβρική παράσταση είναι πολυώνυμο 1<sup>ου</sup> βαθμού. Είναι της μορφής :

$$ax + \beta = 0$$

Όπου  $a, \beta \in \mathbb{R}$ . Αν ο συντελεστής της μεταβλητής  $x$  είναι διάφορος του 0 τότε η εξίσωση έχει μοναδική λύση την  $x = -\frac{\beta}{a}$ . Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι είτε αδύνατη είτε αόριστη.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.61 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Επαλήθευση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία εξετάζουμε αν ένας αριθμός είναι λύση μιας εξίσωσης, αντικαθιστώντας τη μεταβλητή της εξίσωσης με τον αριθμό αυτό.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.62 ΑΝΑΓΩΓΗ ΟΜΟΙΩΝ ΟΡΩΝ

Αναγωγή ομοίων όρων ονομάζεται η διαδικασία με την οποία απλοποιούμε μια αλγεβρική παράσταση προσθέτοντας ή αφαιρώντας τους όμοιους όρους μεταξύ τους κάνοντας πράξεις με τους συντελεστές τους.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.63 ΕΞΙΣΩΣΗ 2<sup>ΟΥ</sup> ΒΑΘΜΟΥ

Εξίσωση 2<sup>ου</sup> βαθμού με έναν άγνωστο ονομάζεται κάθε πολυωνυμική εξίσωση της οποίας η αλγεβρική παράσταση είναι πολυώνυμο 2<sup>ου</sup> βαθμού. Είναι της μορφής :

$$ax^2 + \beta x + \gamma = 0 \quad , \quad a \neq 0$$

- Οι πραγματικοί αριθμοί  $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  ονομάζονται **συντελεστές** της εξίσωσης.
- Ο συντελεστής  $\gamma \in \mathbb{R}$  ονομάζεται **σταθερός όρος**.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.64 ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΣΑ

Διακρίνουσα ενός τριωνύμου 2<sup>ου</sup> βαθμού ονομάζεται ο πραγματικός αριθμός

$$\Delta = \beta^2 - 4a\gamma$$

Το πρόσημό της μάς επιτρέπει να διακρίνουμε το πλήθος των ριζών του τριωνύμου.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.65 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Κλασματική ονομάζεται μια εξίσωση η οποία περιέχει τουλάχιστον μια ρητή αλγεβρική παράσταση. Γενικά έχει τη μορφή :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} + R(x) = 0$$

όπου  $P(x), Q(x), R(x)$  πολυώνυμα με  $Q(x) \neq 0$ .

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.66 ΑΡΡΗΤΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Άρρητη ονομάζεται κάθε εξίσωση που περιέχει τουλάχιστον μια άρρητη αλγεβρική παράσταση. Θα είναι

$$\sqrt[n]{P(x)} + Q(x) = 0$$

όπου  $P(x), Q(x)$  πολυώνυμα με  $P(x) \geq 0$ .

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.67 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ Ν

Πολυωνυμική εξίσωση ν-οστού βαθμού ονομάζεται κάθε πολυωνυμική εξίσωση της οποίας η αλγεβρική παράσταση είναι πολυώνυμο ν-οστού βαθμού.

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

όπου  $a_k \in \mathbb{R}$  ,  $k = 0, 1, 2, \dots, n$ .

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.68 ΔΙΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Διτετράγωνη ονομάζεται κάθε εξίσωση 4<sup>ου</sup> βαθμού της μορφής :

$$ax^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$$

με  $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  ,  $a \neq 0$  η οποία έχει μόνο άρτιες δυνάμεις του  $x$ . Οι εκθέτες του τριωνόμου είναι διπλάσιοι απ' αυτούς της εξίσωσης 2<sup>ου</sup> βαθμού.

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.69 ΔΙΩΝΥΜΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Διώνυμη εξίσωση ονομάζεται κάθε πολυωνυμική εξίσωση η οποία περιέχει 2 όρους και είναι της μορφής :

$$ax^\nu + \beta x^\mu = 0$$

όπου οι συντελεστές είναι πραγματικοί αριθμοί  $\nu > \mu$  ,  $\mu \in \mathbb{N}$  με  $a \neq 0$ .

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.70 ΤΡΙΩΝΥΜΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Τριώνυμη ονομάζεται κάθε πολυωνυμική εξίσωση με πολυώνυμο 3 όρων της μορφής :

$$ax^\nu + \beta x^\mu + \gamma x^\kappa = 0$$

όπου οι συντελεστές είναι πραγματικοί αριθμοί  $\nu > \mu > \kappa$  ,  $\mu, \kappa \in \mathbb{N}$  με  $a \neq 0$ .

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.71 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ



Γραμμικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο άγνωστους ονομάζεται η σύζευξη ενός ζεύγους γραμμικών εξισώσεων. Είναι της μορφής :

$$\begin{cases} a_1x + \beta_1y = \gamma_1 \\ a_2x + \beta_2y = \gamma_2 \end{cases}$$

- Οι συντελεστές είναι πραγματικοί αριθμοί  $a_1, a_2, \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 \in \mathbb{R}$ .
- Κάθε διατεταγμένο ζεύγος αριθμών  $(x_0, y_0)$  το οποίο επαληθεύει και τις δύο εξισώσεις ονομάζεται **λύση** του γραμμικού συστήματος  $2 \times 2$ .
- Τα συστήματα τα οποία έχουν ακριβώς τις ίδιες λύσεις ονομάζονται **ισοδύναμα**.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.75 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επαλήθευση ενός συστήματος εξισώσεων ονομάζεται η διαδικασία με την οποία εξετάζουμε εάν ένα ζεύγος αριθμών  $(x_0, y_0)$  είναι λύση του, αντικαθιστώντας τους αριθμούς στη θέση των μεταβλητών.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.76 ΟΡΙΖΟΥΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ορίζουσα ενός  $2 \times 2$  συστήματος ονομάζεται ο αριθμός  $a\beta' - a'\beta$  ή οποία συμβολίζεται με

$$D = \begin{vmatrix} a & \beta \\ a' & \beta' \end{vmatrix}$$

$D_x, D_y$  είναι οι ορίζουσες που προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε στην ορίζουσα  $D$  τους συντελεστές των μεταβλητών  $x, y$  αντίστοιχα με τους σταθερούς όρους  $\gamma, \gamma'$ .

$$D_x = \begin{vmatrix} \gamma & \beta \\ \gamma' & \beta' \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a & \gamma \\ a' & \gamma' \end{vmatrix}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.77 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ $3 \times 3$

Γραμμικό σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις άγνωστους ονομάζεται ένας συνδυασμός από τρεις γραμμικές εξισώσεις της μορφής

$$\begin{cases} a_1x + \beta_1y + \gamma_1z = \delta_1 \\ a_2x + \beta_2y + \gamma_2z = \delta_2 \\ a_3x + \beta_3y + \gamma_3z = \delta_3 \end{cases}$$

με  $a_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, 2, 3$ . Κάθε διατεταγμένη τριάδα αριθμών  $(x_0, y_0, z_0)$  η οποία επαληθεύει και τις τρεις εξισώσεις ονομάζεται **λύση** του γραμμικού συστήματος  $3 \times 3$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.78 ΑΝΙΣΩΣΗ

Ανίσωση ονομάζεται κάθε ανισότητα η οποία περιέχει τουλάχιστον μια μεταβλητή, κάθε σχέση δηλαδή της μορφής :

$$P(x, y, \dots, z) > 0, \quad P(x, y, \dots, z) < 0$$

όπου  $P(x, y, \dots, z)$  είναι μια αλγεβρική παράσταση πολλών μεταβλητών.

- Ανισώσεις αποτελούν και οι σχέσεις με σύμβολα ανισοϊσότητας  $\leq, \geq$ .
- Κάθε αριθμός που επαληθεύει μια ανίσωση ονομάζεται **λύση** της. Κάθε ανίσωση έχει λύσεις ένα **σύνολο αριθμών**.
- Αν μια ανίσωση έχει λύσεις όλους τους αριθμούς ονομάζεται **αόριστη**.
- Αν μια ανίσωση δεν έχει καθόλου λύσεις ονομάζεται **αδύνατη**.
- Σχέσεις τις μορφής  $Q(x) \leq P(x) \leq R(x)$  λέγονται **διπλές ανισώσεις** όπου  $P(x), Q(x), R(x)$  αλγεβρικές παρατάσεις. Αποτελείται από δύο ανισώσεις, με κοινό μέλος το πολώνυμο  $P(x)$ , οι οποίες συναληθεύουν.
- **Κοινές λύσεις** μιας διπλής ανίσωσης ή δύο ή περισσότερων ανισώσεων ονομάζονται οι αριθμοί που επαληθεύουν όλες τις ανισώσεις συγχρόνως.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.79 ΑΝΙΣΩΣΗ 1<sup>ΟΥ</sup> ΒΑΘΜΟΥ

Ανίσωση 1<sup>ου</sup> βαθμού με έναν άγνωστο ονομάζεται κάθε πολωνυμική ανίσωση της οποίας η αλγεβρική παράσταση είναι πολώνυμο 1<sup>ου</sup> βαθμού. Είναι της μορφής :

$$ax + \beta > 0 \quad , \quad ax + \beta < 0$$

με πραγματικούς συντελεστές  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.80 ΑΝΙΣΩΣΗ 2<sup>ΟΥ</sup> ΒΑΘΜΟΥ

Ανίσωση 2<sup>ου</sup> βαθμού με έναν άγνωστο ονομάζεται κάθε πολωνυμική ανίσωση της οποίας η αλγεβρική παράσταση είναι πολώνυμο 2<sup>ου</sup> βαθμού. Είναι της μορφής :

$$ax^2 + \beta x + \gamma > 0 \quad . \quad ax^2 + \beta x + \gamma < 0$$

με πραγματικούς συντελεστές  $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$  και  $a \neq 0$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.81 ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΩΣΗ

Κλασματική ανίσωση ονομάζεται κάθε ανίσωση η οποία περιέχει τουλάχιστον μια ρητή αλγεβρική παράσταση. Κάθε κλασματική ανίσωση μπορεί να πάρει τη μορφή :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} + R(x) > 0 \quad , \quad \frac{P(x)}{Q(x)} + R(x) < 0$$

όπου  $P(x), Q(x), R(x)$  πολώνυμα με  $Q(x) \neq 0$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.82 ΑΡΡΗΤΗ ΑΝΙΣΩΣΗ

Άρρητη ονομάζεται κάθε ανίσωση που περιέχει τουλάχιστον μια άρρητη αλγεβρική παράσταση. Θα είναι

$$\sqrt[n]{P(x)} + Q(x) > 0 \quad , \quad \sqrt[n]{P(x)} + Q(x) < 0$$

όπου  $P(x), Q(x)$  πολώνυμα με  $P(x) \geq 0$ .



## ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.21 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 1<sup>ΟΥ</sup> ΒΑΘΜΟΥ

Έστω  $ax + \beta = 0$  μια εξίσωση 1<sup>ου</sup> βαθμού με  $a, \beta \in \mathbb{R}$  τότε διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις για τις λύσεις της ανάλογα με την τιμή των συντελεστών της  $a, \beta$  :

- Αν  $a \neq 0$  τότε η εξίσωση έχει **μοναδική λύση** την  $x = -\frac{\beta}{a}$ .
- Αν  $a = 0$  και
  - $\beta = 0$  τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή  $0x = 0$  η οποία έχει λύσεις όλους τους αριθμούς οπότε είναι **αόριστη**.
  - $\beta \neq 0$  τότε η εξίσωση παίρνει τη μορφή  $0x = \beta$  η οποία δεν έχει καμία λύση άρα είναι **αδύνατη**.

Συντελεστές		Λύσεις
$a \neq 0$		$x = -\frac{\beta}{a}$ μοναδική λύση
$a = 0$	$\beta = 0$	$0x = 0$ αόριστη - άπειρες λύσεις
	$\beta \neq 0$	$0x = \beta$ αδύνατη - καμία λύση

*Πίνακας 1.17:* Λύσεις εξίσωσης 1<sup>ου</sup> βαθμού

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.22 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

1. Για κάθε εξίσωση της μορφής  $|x| = a$  διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις για τις λύσεις της :

- Αν  $a > 0$  τότε η εξίσωση έχει 2 αντίθετες λύσεις :

$$|x| = a \Leftrightarrow x = \pm a$$

- Αν  $a = 0$  τότε η εξίσωση έχει λύση το 0 :

$$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

- Αν  $a < 0$  τότε η εξίσωση είναι αδύνατη.

2. Για τις εξισώσεις της μορφής  $|x| = |a|$  ισχύει :

$$|x| = |a| \Leftrightarrow x = \pm a$$

3. Με τη βοήθεια των παραπάνω, μπορούμε να λύσουμε και εξισώσεις της μορφής  $|f(x)| = g(x)$  και  $|f(x)| = |g(x)|$  όπου  $f(x), g(x)$  αλγεβρικές παραστάσεις :

$$|f(x)| = g(x) \Leftrightarrow f(x) = \pm g(x) \quad , \quad \text{με } g(x) \geq 0$$

$$|f(x)| = |g(x)| \Leftrightarrow f(x) = \pm g(x)$$

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.23 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ $x^\nu = a$

Για τις λύσεις των εξισώσεων της μορφής  $x^\nu = a$  διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις για το είδος του εκθέτη  $\nu$  και του πραγματικού αριθμού  $a$ .

1. Για  $\nu$  άρτιο έχουμε :

- i. Αν  $a \geq 0$  τότε η εξίσωση έχει 2 λύσεις αντίθετες :

$$x^\nu = a \Leftrightarrow x = \pm a$$

- ii. Αν  $a < 0$  τότε η εξίσωση είναι αδύνατη.

2. Για  $\nu$  περιττό έχουμε :


- i. Αν  $a \geq 0$  τότε η εξίσωση έχει 1 θετική λύση :

$$x^\nu = a \Leftrightarrow x = a$$

- ii. Αν  $a < 0$  τότε η εξίσωση έχει 1 αρνητική λύση :

$$x^\nu = a \Leftrightarrow x = -\sqrt[\nu]{a}$$

Οι λύσεις των εξισώσεων της μορφής  $x^\nu = a$  φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα για κάθε μια από τις περιπτώσεις που αναφέραμε :



Σχήμα 1.10: Λύσεις εξίσωσης  $x^\nu = a$

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.24 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ $x^\nu = a^\nu$

Για τις λύσεις των εξισώσεων της μορφής  $x^\nu = a^\nu$  όπου  $\nu \in \mathbb{N}^*$  θα ισχύουν τα παρακάτω :


- Αν  $n$  άρτιος τότε η εξίσωση έχει δύο αντίθετες λύσεις :

$$x^n = a^n \Leftrightarrow x = \pm a$$

- Αν  $n$  περιττός τότε η εξίσωση έχει μια λύση :

$$x^n = a^n \Leftrightarrow x = a$$

Οι λύσεις των εξισώσεων αυτών φαίνονται στο αντίστοιχο διάγραμμα :



Σχήμα 1.11: Λύσεις εξίσωσης  $x^n = a^n$

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.25 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ<sup>2</sup> 2ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Αν  $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$  με  $a \neq 0$  μια εξίσωση 2<sup>ου</sup> βαθμού τότε με βάση το πρόσημο της διακρίνουσας έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις για το πλήθος των λύσεων της :

1. Αν  $\Delta > 0$  τότε η εξίσωση έχει δύο άνισες λύσεις οι οποίες δίνονται από τον τύπο :

$$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. Αν  $\Delta = 0$  τότε η εξίσωση έχει μια διπλή λύση

$$x = -\frac{\beta}{a}$$

3. Αν  $\Delta < 0$  τότε η εξίσωση είναι αδύνατη στο σύνολο  $\mathbb{R}$ .

Οι περιπτώσεις αυτές φαίνονται επίσης στον πίνακα :

Διακρίνουσα	Πλήθος λύσεων	Λύσεις
$\Delta > 0$	2 πραγματικές άνισες λύσεις	$x_{1,2} = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	1 διπλή πραγματική λύση	$x = -\frac{\beta}{a}$
$\Delta < 0$	Καμία πραγματική λύση - Αδύνατη στο $\mathbb{R}$	

Πίνακας 1.18: Λύσεις εξίσωσης 2<sup>ου</sup> βαθμού

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.26 ΤΥΠΟΙ VΙΕΤΑ**

Έστω  $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$  με  $a \neq 0$  μια εξίσωση 2<sup>ου</sup> βαθμού. Αν  $x_1, x_2$  είναι οι λύσεις της εξίσωσης τότε το άθροισμα  $S$  και το γινόμενο τους  $P$  δίνονται από τους τύπους :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{\beta}{a} \quad , \quad P = x_1 \cdot x_2 = \frac{\gamma}{a}$$

οι οποίοι ονομάζονται τύποι του Vieta.

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.27 ΕΞΙΣΩΣΗ 2<sup>ΟΥ</sup> ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ**

Εαν  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  είναι δύο πραγματικοί αριθμοί τότε η εξίσωση 2<sup>ου</sup> βαθμού η οποία έχει λύσεις τους αριθμούς αυτούς δίνεται από τον τύπο :

$$x^2 - Sx + P = 0$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.28 ΕΙΔΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 2<sup>ΟΥ</sup> ΒΑΘΜΟΥ**

Εαν  $ax^2 + \beta x + \gamma = 0$  με  $a \neq 0$  μια εξίσωση 2<sup>ου</sup> βαθμού,  $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$  είναι οι λύσεις της,  $S$  το άθροισμα και  $P$  το γινόμενο τους τότε ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες για το είδος των λύσεων της :

$\Delta$	$P$	$S$	Είδος λύσεων	Συμβολισμός
$\Delta > 0$	$P > 0$	$S > 0$	Δύο θετικές πραγματικές	$x_1 > x_2 > 0$
		$S < 0$	Δύο αρνητικές λύσεις	$x_1 < x_2 < 0$
		$S = 0$	Αδύνατη περίπτωση	
	$P < 0$	$S > 0$	Ετερόσημες (όχι αντίθετες)	$x_1 < 0 < x_2$ , $ x_2  <  x_1 $
		$S < 0$		$x_1 < 0 < x_2$ , $ x_1  <  x_2 $
		$S = 0$	Αντίθετες	$x_1 = -x_2$
	$P = 0$	$S > 0$	Μηδενική και θετική	$x_1 = 0$ , $x_2 > 0$
		$S < 0$	Μηδενική και αρνητική	$x_1 = 0$ , $x_2 < 0$
		$S = 0$	Αδύνατη περίπτωση	
	$P = 1$		Αντίστροφες	$x_1 = \frac{1}{x_2}$
	$P > 0$	$S > 0$	Θετικές και ίσες	$x_1 = x_2 > 0$

$\Delta = 0$		$S < 0$	Αρνητικές και ίσες	$x_1 = x_2 < 0$
	$P = 0$	$S = 0$	Μηδενικές	$x_1 = x_2 = 0$
$\Delta < 0$	Αδύνατη στο $\mathbb{R}$			

**Πίνακας 1.19:** Είδη λύσεων εξίσωσης 2<sup>ου</sup> βαθμού

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.29 ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ

Δύο πολυώνυμα  $P(x)$ ,  $Q(x)$  είναι ίσα  $\forall x \in \mathbb{R}$  αν και μόνο αν οι συντελεστές των ομοβάθμιων όρων τους είναι ίσοι. Αν  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  και  $Q(x) = \beta_\mu x^\mu + \beta_{\mu-1} x^{\mu-1} + \dots + \beta_1 x + \beta_0$  με  $a_n, \beta_\mu \neq 0$  βαθμών  $n$  και  $\mu$  αντίστοιχα, με  $\mu \geq n$ , τότε

$$P(x) \equiv Q(x) \Leftrightarrow a_\kappa = \beta_\kappa \quad , \quad \kappa = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$\beta_\lambda = 0 \quad , \quad \lambda = n + 1, n + 2, \dots, \mu$$

Ένα πολυώνυμο  $P(x)$  είναι ίσο με το μηδενικό πολυώνυμο αν και μόνο αν όλοι οι συντελεστές του είναι ίσοι με το 0. Αν  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$  τότε

$$P(x) \equiv 0 \Leftrightarrow a_\kappa = 0 \quad , \quad \kappa = 0, 1, 2, \dots, n$$

## 1.3 Τριγωνομετρία

### ΟΡΙΣΜΟΙ

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.83 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Έστω  $AB\Gamma$  ένα ορθογώνιο τρίγωνο, με  $A = 90^\circ$  τότε οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των οξείων γωνιών του τριγώνου ορίζονται ως εξής :

**1. Ημίτονο**

Ημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου ονομάζεται ο λόγος της απέναντι κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα.

$$\text{Ημίτονο} = \frac{\text{Απέναντι Κάθετη}}{\text{Υποτείνουσα}}, \quad \eta\mu\omega = \frac{A\Gamma}{B\Gamma}$$

**2. Συνημίτονο**

Συνημίτονο μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου ονομάζεται ο λόγος της προσκείμενης κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα.

$$\text{Συνημίτονο} = \frac{\text{Προσκείμενη Κάθετη}}{\text{Υποτείνουσα}}, \quad \sigma\upsilon\nu\omega = \frac{A\Gamma}{B\Gamma}$$

**3. Εφαπτομένη**


Εφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου ονομάζεται ο λόγος της απέναντι κάθετης πλευράς προς την προσκείμενη κάθετη.

$$\text{Εφαπτομένη} = \frac{\text{Απέναντι Κάθετη}}{\text{Προσκείμενη Κάθετη}}, \quad \epsilon\varphi\omega = \frac{A\Gamma}{A\Gamma}$$

**4. Συνεφαπτομένη**

Συνεφαπτομένη μιας οξείας γωνίας ενός ορθογωνίου τριγώνου ονομάζεται ο λόγος της προσκείμενης κάθετης πλευράς προς την απέναντι κάθετη.

$$\text{Συνεφαπτομένη} = \frac{\text{Προσκείμενη Κάθετη}}{\text{Απέναντι Κάθετη}}, \quad \sigma\varphi\omega = \frac{A\Gamma}{A\Gamma}$$



**Σχήμα 1.12:** Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.84 ΤΡΙΓ. ΑΡ. ΓΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ**

Έστω  $Oxy$  ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων και  $M(x, y)$  ένα σημείο του. Ενώνοντας το σημείο  $M$  με την αρχή των αξόνων, το ευθύγραμμο τμήμα που προκύπτει δημιουργεί μια γωνία  $\omega$  με το θετικό οριζόντιο ημιάξονα  $Ox$ . Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος  $OM$  είναι :

$$OM = \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας αυτής ορίζονται με τη βοήθεια των συντεταγμένων του σημείου και είναι :

**1. Ημίτονο**


Ημίτονο της γωνίας ονομάζεται ο λόγος της τεταγμένης του σημείου προς την απόσταση του από την αρχή των αξόνων.

$$\eta\mu\omega = \frac{AM}{OM} = \frac{y}{\rho}$$

**2. Συνημίτονο**

Συνημίτονο της γωνίας ονομάζεται ο λόγος της τεταγμένης του σημείου προς την απόσταση του από την αρχή των αξόνων.

$$\sigma\eta\nu\omega = \frac{BM}{OM} = \frac{x}{\rho}$$



**Σχήμα 1.13:** Τριγωνομετρικοί αριθμοί σε σύστημα συντεταγμένων

**3. Εφαπτομένη**

Εφαπτομένη της γωνίας τριγώνου ονομάζεται ο λόγος της τεταγμένης του σημείου προς την τεταγμένη του.

$$\epsilon\phi\omega = \frac{AM}{BM} = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0$$

**4. Συνεφαπτομένη**

Συνεφαπτομένη της γωνίας ονομάζεται ο λόγος της τεταγμένης του σημείου προς την τεταγμένη του.

$$\sigma\phi\omega = \frac{BM}{AM} = \frac{x}{y}, \quad y \neq 0$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.85 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΩΝΙΩΝ - ΤΟΞΩΝ**

Με τις μονάδες μέτρησης γωνιών - τόξων μετράμε το άνοιγμα των πλευρών μιας γωνίας ή αντίστοιχα το μέτρο ενός τόξου. Οι βασικές μονάδες μέτρησης για τη μέτρηση γωνιών ή τόξων είναι :

**1. Μοίρα**

Μοίρα ονομάζεται το τόξο το οποίο είναι ίσο με το  $\frac{1}{360}$  του τόξου ενός κύκλου. Εναλλακτικά μπορούμε να ορίσουμε τη μοίρα ως τη γωνία η οποία αν γίνει επίκεντρη σε κύκλο, βαίνει σε τόξο ίσο με το  $\frac{1}{360}$  του τόξου του κύκλου.

- Συμβολίζεται με  $1^\circ$ .
- Μια μοίρα υποδιαιρείται σε 60 πρώτα λεπτά ( $60'$ ) και κάθε λεπτό σε 60 δεύτερα λεπτά ( $60''$ ).

**2. Ακτίνο**










Ακτίνο ονομάζεται το τόξο ενός κύκλου του οποίου το μήκος είναι ίσο με την ακτίνα

του κύκλου. Ορίζεται και ως η γωνία που αν γίνει επίκεντρη, βαίνει σε τόξο με μήκος ίσο με την ακτίνα του κύκλου. Συμβολίζεται με 1rad.

Αν  $\mu$  είναι το μέτρο μιας γωνίας σε μοίρες και  $a$  το μέτρο της ίδιας γωνίας σε ακτίνια, η σχέση που τα συνδέει και με την οποία μπορούμε να μετατρέψουμε το μέτρο μιας γωνίας από μοίρες σε ακτίνια και αντίστροφα είναι :

$$\frac{\mu}{180^\circ} = \frac{a}{\pi}$$

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε το μέτρο μερικών βασικών γωνιών δοσμένο σε μοίρες και ακτίνια αλλά και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών αυτών.

Βασικές Γωνίες									
Μοίρες	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Ακτίνια	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\pi$
Σχήμα									
ημω	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
συνω	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
εφω	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	Δεν ορίζεται	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
σφω	Δεν ορίζεται	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	Δεν ορίζεται


Πίνακας 1.20: Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.86 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ**


Τριγωνομετρικός κύκλος ονομάζεται ο κύκλος με ακτίνα και κέντρο την αρχή των αξόνων ενός ορθογωνίου συστήματος συντεταγμένων, στους άξονες του οποίου παίρνουν τιμές οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών.



# Τριγωνομετρικός Κύκλος



**Σχήμα 1.14:** Τριγωνομετρικός κύκλος



**Σχήμα 1.15:** Βασικές γωνίες

- Κάθε γωνία  $\omega$  έχει πλευρές, τον θετικό ημιάξονα  $Ox$  και την ακτίνα  $\rho$  του κύκλου, μετρώντας τη γωνία αυτή αριστερόστροφα, φορά που ορίζεται ως **θετική**.
- Ο οριζόντιος άξονας  $x'x$  είναι ο άξονας συνημιτόνων ενώ ο κατακόρυφος  $y'y$  ο άξονας ημιτόνων.
- Κάθε σημείο  $M$  του κύκλου έχει συντεταγμένες  $M(\eta\mu\omega, \sigma\upsilon\nu\omega)$ .
- Η τετμημένη του σημείου είναι ίση με το συνημίτονο της γωνίας, ενώ η τεταγμένη ίση με το ημίτονο της.

$$x = \sigma \nu \omega \quad , \quad y = \eta \mu \omega$$

- Η εφαπτόμενη ευθεία στον κύκλο στο σημείο  $A(1, 0)$  είναι ο **άξονας των εφαπτομένων**. Η εφαπτομένη της γωνίας  $\omega$  είναι η τεταγμένη του σημείου τομής της ευθείας  $\varepsilon_1$  με το φορέα  $\delta$  της ακτίνας.

$$y_K = \varepsilon \varphi \omega$$

- Η εφαπτόμενη ευθεία στον κύκλο στο σημείο  $B(0, 1)$  είναι ο **άξονας των συνεφαπτομένων**. Η συνεφαπτομένη της γωνίας  $\omega$  είναι η τετμημένη του σημείου τομής της ευθείας  $e_2$  με το φορέα  $\delta$  της ακτίνας.

$$x_K = \sigma\varphi\omega$$

Πιο κάτω βλέπουμε τα τέσσερα τεταρτημόρια στα οποία χωρίζουν οι άξονες το επίπεδο και τον τριγωνομετρικό κύκλο καθώς και το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών σε κάθε τεταρτημόριο.

**ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ**  
**ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.30 ΑΚΡΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ**

Το ημίτονο και το συνημίτονο οποιασδήποτε γωνίας  $\omega$  παίρνει τιμές από  $-1$  μέχρι  $1$ .

$$-1 \leq \eta\mu\omega \leq 1, \quad -1 \leq \sigma\upsilon\nu\omega \leq 1$$

ή ισοδύναμα  $|\eta\mu\omega| \leq 1, \quad |\sigma\upsilon\nu\omega| \leq 1$ .

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ**

Για οποιαδήποτε γωνία  $\omega$  ισχύουν οι παρακάτω βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες :

$$1. \eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$$

$$2. \varepsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}$$

$$3. \sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}$$

$$4. \varepsilon\varphi\omega \cdot \sigma\varphi\omega = 1$$

$$5. \sigma\upsilon\nu^2\omega = \frac{1}{1 + \varepsilon\varphi^2\omega}$$

$$6. \eta\mu^2\omega = \frac{\varepsilon\varphi^2\omega}{1 + \varepsilon\varphi^2\omega}$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.32 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ**


Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί αντίθετων, παραπληρωματικών, συμπληρωματικών γωνιών, καθώς και γωνιών που διαφέρουν κατά  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  ή  $360^\circ$  ανάγονται σε τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνιών του 1<sup>ου</sup> τεταρτημορίου σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους.

**1. Παραπληρωματικές γωνίες (2<sup>ο</sup> τεταρτημόριο)**

Εαν  $\omega$  είναι μια γωνία του 1<sup>ου</sup> τεταρτημορίου τότε η παραπληρωματική της θα είναι της μορφής  $180^\circ - \omega$ . Οι σχέσεις μεταξύ των τριγωνομετρικών τους αριθμών φαίνονται παρακάτω

- $\eta\mu(180^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$
- $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$
- $\sigma\varphi(180^\circ - \omega) = -\sigma\varphi\omega$


Οι παραπληρωματικές γωνίες έχουν ίσα ημίτονα και αντίθετους όλους τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Τα σημεία  $M, N$  του τριγωνομετρικού κύκλου, των γωνιών  $\omega$  και  $180^\circ - \omega$  αντίστοιχα, είναι συμμετρικά ως προς άξονα  $y'y$  και κατά συνέπεια έχουν αντίθετες τετμημένες.



Σχήμα 1.16: Παραπληρωματικές γωνίες

**2. Γωνίες με διαφορά  $180^\circ$** 

Εαν  $\omega$  είναι μια γωνία του 1<sup>ου</sup> τεταρτημορίου, η γωνία η οποία διαφέρει από την  $\omega$  κατά  $180^\circ$  θα είναι της μορφής  $180^\circ - \omega$ . Οι σχέσεις που συνδέουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των δύο γωνιών θα είναι

Σχήμα 1.17: Γωνίες με διαφορά  $180^\circ$ 

- $\eta\mu(180^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(180^\circ + \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$
- $\epsilon\varphi(180^\circ + \omega) = \epsilon\varphi\omega$
- $\sigma\varphi(180^\circ + \omega) = \sigma\varphi\omega$


Οι γωνίες με διαφορά  $180^\circ$  έχουν αντίθετα ημίτονα και συνημίτονα ενώ έχουν ίσες εφαπτομένες και συνεφαπτομένες. Τα σημεία  $M, N$  του τριγωνομετρικού κύκλου, των γωνιών  $\omega$  και  $180^\circ + \omega$  αντίστοιχα, είναι συμμετρικά ως προς την αρχή των αξόνων και κατά συνέπεια έχουν αντίθετες συντεταγμένες.

### 3. Αντίθετες γωνίες - Γωνίες με άθροισμα ( $4^\circ$ Τεταρτημόριο)

Η αντίθετη γωνία, μιας γωνίας  $\omega$  του  $1^{\text{ου}}$  τεταρτημορίου, ορίζεται να είναι η γωνία η οποία έχει ίσο μέτρο με τη γωνία  $\omega$ , με φορά αντίθετη απ' αυτήν και θα έχει τη μορφή  $-\omega$ . Επίσης η γωνία η οποία έχει με τη γωνία  $\omega$ , άθροισμα  $360^\circ$  θα είναι  $360^\circ - \omega$ .


- $\eta\mu(-\omega) = \eta\mu(360^\circ - \omega) = -\eta\mu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(-\omega) = \sigma\upsilon\nu(360^\circ - \omega) = -\sigma\upsilon\nu\omega$
- $\epsilon\varphi(-\omega) = \epsilon\varphi(360^\circ - \omega) = \epsilon\varphi\omega$
- $\sigma\varphi(-\omega) = \sigma\varphi(360^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$

Οι γωνίες με άθροισμα  $360^\circ$  καθώς και οι αντίθετες έχουν ίσα συνημίτονα και αντίθετους όλους τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Τα σημεία  $M, N$  του τριγωνομετρικού κύκλου, των γωνιών  $\omega$  και  $360^\circ - \omega$  αντίστοιχα, είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα  $x'x$  και κατά συνέπεια έχουν αντίθετες τεταγμένες. Τα σημεία του κύκλου των γωνιών  $360^\circ - \omega$  και  $-\omega$  καθώς και οι ακτίνες τους ταυτίζονται.

Σχήμα 1.18: Αντίθετες γωνίες - Γωνίες με άθροισμα  $360^\circ$ 

### 4. Συμπληρωματικές γωνίες

Η συμπληρωματική γωνία μιας οξείας γωνίας  $\omega$  θα είναι της μορφής  $90^\circ - \omega$  η οποία ανήκει και αυτή στο  $1^\circ$  τεταρτημόριο.



Σχήμα 1.19: Συμπληρωματικές γωνίες

- $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \omega) = \eta\mu\omega$
- $\epsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$
- $\sigma\varphi(90^\circ - \omega) = \epsilon\varphi\omega$


Για δύο συμπληρωματικές γωνίες έχουμε ότι το ημίτονο της μιας είναι ίσο με το συνημίτονο της άλλης και η εφαπτομένη της μιας είναι ίση με τη συνεφαπτομένη της άλλης. Τα σημεία  $M, N$  του τριγωνομετρικού κύκλου, των γωνιών  $\omega$  και  $90^\circ - \omega$  αντίστοιχα, είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία  $y = x$  οπότε έχουν συμμετρικές συντεταγμένες.

### 5. Γωνίες με διαφορά $90^\circ$

Γωνίες οι οποίες διαφέρουν κατά  $90^\circ$  έχουν τη μορφή  $\omega$  και  $90^\circ + \omega$ , με την  $\omega$  να βρίσκεται στο  $1^\circ$  τεταρτημόριο.

- $\eta\mu(90^\circ + \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(90^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$
- $\epsilon\varphi(90^\circ + \omega) = -\sigma\varphi\omega$
- $\sigma\varphi(90^\circ + \omega) = -\epsilon\varphi\omega$


Για δύο γωνίες με διαφορά  $90^\circ$  ισχύει ότι το ημίτονο της αμβλείας είναι ίσο με το συνημίτονο της οξείας, ενώ συνημίτονο, εφαπτομένη και συνεφαπτομένη της αμβλείας γωνίας είναι αντίθετα με τα ημίτονο, συνεφαπτομένη και εφαπτομένη αντίστοιχα, της οξείας γωνίας.



Σχήμα 1.20: Συμπληρωματικές γωνίες

### 6. Γωνίες με διαφορά $\kappa \cdot 360^\circ$

Εαν σε μια γωνία  $\omega$  του  $1^\circ$  τεταρτημορίου προσθέσουμε γωνία της μορφής  $\kappa \cdot 360^\circ$  με  $\kappa \in \mathbb{Z}$  δηλαδή ακέραια πολλαπλάσια ενός κύκλου προκύπτει γωνία του τύπου  $\kappa \cdot 360^\circ + \omega$ . Γωνίες αυτής της μορφής διαφέρουν από την  $\omega$  κατά πολλαπλάσια ενός κύκλου.


Σχήμα 1.21: Γωνίες με διαφορά  $\kappa \cdot 360^\circ$ 

- $\eta\mu(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$
- $\sigma\upsilon\nu(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = -\eta\mu\omega$
- $\epsilon\varphi(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = -\sigma\varphi\omega$
- $\sigma\varphi(\kappa \cdot 360^\circ + \omega) = -\epsilon\varphi\omega$

Οι γωνίες με διαφορά  $\kappa \cdot 360^\circ$  έχουν ίσους όλους τους τριγωνομετρικούς τους αριθμούς καθώς ταυτίζονται και τα σημεία των γωνιών πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο και οι ακτίνες των γωνιών.

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.33 ΤΡΙΓ. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΦΟΡΑΣ**

Έστω  $\omega, \varphi$  δύο γωνίες. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί του αθροίσματος  $\varphi + \omega$  και της διαφοράς τους  $\varphi - \omega$  δίνονται με τη βοήθεια των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών  $\omega, \varphi$  από τους παρακάτω τύπους.



Σχήμα 1.22: Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς γωνιών

**ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ**

- |                                                                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $\sin(\varphi + \omega) = \sin\varphi \cdot \cos\omega + \cos\varphi \cdot \sin\omega$ | 3. $\tan(\varphi + \omega) = \frac{\tan\varphi + \tan\omega}{1 - \tan\varphi \cdot \tan\omega}$ |
| 2. $\cos(\varphi + \omega) = \cos\varphi \cdot \cos\omega - \sin\varphi \cdot \sin\omega$ | 4. $\cot(\varphi + \omega) = \frac{\cot\varphi \cot\omega - 1}{\cot\varphi + \cot\omega}$       |

**ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΩΝΙΩΝ**

- |                                                                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. $\sin(\varphi - \omega) = \sin\varphi \cdot \cos\omega - \cos\varphi \cdot \sin\omega$ | 3. $\tan(\varphi - \omega) = \frac{\tan\varphi - \tan\omega}{1 + \tan\varphi \cdot \tan\omega}$ |
| 2. $\cos(\varphi - \omega) = \cos\varphi \cdot \cos\omega + \sin\varphi \cdot \sin\omega$ | 4. $\cot(\varphi - \omega) = \frac{\cot\varphi \cot\omega + 1}{\cot\varphi - \cot\omega}$       |

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.34 ΤΡΙΓ. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΝ ΓΩΝΙΑΣ**

Οι τριγωνομετρικοί των ακέραιων πολλαπλασίων  $k \cdot \varphi$  μιας γωνίας  $\varphi$  γράφονται με τη βοήθεια των τριγωνομετρικών αριθμών της αρχικής γωνίας και δίνονται από τους παρακάτω τύπους.

**ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ**

- |                                                                                                                          |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. $\sin 2\varphi = 2\sin\varphi \cdot \cos\varphi$                                                                      | 3. $\tan 2\varphi = \frac{2\tan\varphi}{1 - \tan^2\varphi}$ |
| 2. $\cos 2\varphi = \begin{cases} \cos^2\varphi - \sin^2\varphi \\ 1 - 2\sin^2\varphi \\ 2\cos^2\varphi - 1 \end{cases}$ | 4. $\cot 2\varphi = \frac{\cot^2\varphi - 1}{2\cot\varphi}$ |

### ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

$$1. \eta\mu 3\varphi = 3\eta\mu\varphi - 4\eta\mu^3\varphi$$

$$3. \varepsilon\varphi 3\varphi = \frac{3\varepsilon\varphi\varphi - \varepsilon\varphi^3\varphi}{1 - 3\varepsilon\varphi^2\varphi}$$

$$2. \sigma\upsilon\nu 3\varphi = 4\sigma\upsilon\nu^3\varphi - 3\sigma\upsilon\nu\varphi$$

$$4. \sigma\varphi 3\varphi = \frac{\sigma\varphi^3\varphi - 3\sigma\varphi\varphi}{3\sigma\varphi^2\varphi - 1}$$

### ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑΣ

$$1. \eta\mu(\kappa \cdot \varphi) = 2\sigma\upsilon\nu\varphi \cdot \sigma\upsilon\nu(\kappa - 1)\varphi - \sigma\upsilon\nu(\kappa - 2)\varphi, \quad \kappa = 2, 3, \dots$$

$$2. \sigma\upsilon\nu(\kappa \cdot \varphi) = 2\sigma\upsilon\nu\varphi \cdot \eta\mu(\kappa - 1)\varphi - \eta\mu(\kappa - 2)\varphi, \quad \kappa = 2, 3, \dots$$

$$3. \varepsilon\varphi(\kappa \cdot \varphi) = \frac{\varepsilon\varphi(\kappa - 1)\varphi + -\varepsilon\varphi\varphi}{1 - \varepsilon\varphi(\kappa - 1)\varphi \cdot \varepsilon\varphi\varphi}, \quad \kappa = 2, 3, \dots$$

$$4. \sigma\varphi(\kappa \cdot \varphi) = \frac{\sigma\varphi(\kappa - 1)\varphi \cdot \sigma\varphi\varphi - 1}{\sigma\varphi(\kappa - 1)\varphi + \sigma\varphi\varphi}, \quad \kappa = 2, 3, \dots$$

## 1.4 Ακολουθίες αριθμών - Πρόοδοι

### ΟΡΙΣΜΟΙ

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.87 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ακολουθία πραγματικών αριθμών ονομάζεται κάθε συνάρτηση της μορφής  $a : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$  όπου κάθε φυσικός αριθμός  $\nu \in \mathbb{N}^*$ , εκτός του μηδενός, αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό αριθμό  $a(\nu) \in \mathbb{R}$  ή πιο απλά  $a_\nu$ .

- Η ακολουθία των πραγματικών αριθμών συμβολίζεται  $(a_\nu)$ .
- Οι πραγματικοί αριθμοί  $a_1, a_2, \dots, a_\nu$  ονομάζονται **όροι** της ακολουθίας.
- Ο όρος  $a_\nu$  ονομάζεται  **$\nu$ -οστός** ή **γενικός** όρος της ακολουθίας.
- Οι όροι μιας ακολουθίας μπορούν να δίνονται είτε από
  - έναν **γενικό τύπο** της μορφής  $a_\nu = f(\nu)$ , όπου δίνεται κατευθείαν ο γενικός όρος της
  - είτε από **αναδρομικό τύπο** όπου κάθε όρος δίνεται με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων προηγούμενων όρων. Θα είναι της μορφής

$$a_{\nu+i} = f(a_{\nu+i-1}, \dots, a_{\nu+1}, a_\nu), \quad a_1, a_2, \dots, a_i \text{ γνωστοί όροι.}$$

Στον αναδρομικό τύπο, ο αριθμός  $i \in \mathbb{N}$  είναι το πλήθος των προηγούμενων όρων από τους οποίους εξαρτάται ο όρος  $a_{\nu+i}$ . Είναι επίσης αναγκαίο να γνωρίζουμε τις τιμές των  $i$  πρώτων όρων της προκειμένου να υπολογίσουμε τους υπόλοιπους.

- Μια ακολουθία της οποίας όλοι οι όροι είναι ίσοι ονομάζεται **σταθερή**.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.88 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ**

Μονοτονία ονομάζεται η ιδιότητα μιας ακολουθίας η οποία δείχνει αν αυτή είναι **αύξουσα** ή **φθίνουσα**, **γνησίως αύξουσα** ή **γνησίως φθίνουσα**. Ειδικότερα μια ακολουθία  $(a_n)$  ονομάζεται

- Αύξουσα αν κάθε όρος της είναι **μεγαλύτερος ή ίσος** από τον προηγούμενο του δηλαδή  $a_{n+1} \geq a_n$  για κάθε  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- Φθίνουσα αν κάθε όρος της είναι **μικρότερος ή ίσος** από τον προηγούμενο του δηλαδή  $a_{n+1} \leq a_n$  για κάθε  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- Γνησίως αύξουσα αν κάθε όρος της είναι **μεγαλύτερος** από τον προηγούμενο του δηλαδή  $a_{n+1} > a_n$  για κάθε  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- Γνησίως φθίνουσα αν κάθε όρος της είναι **μικρότερο** από τον προηγούμενο του δηλαδή  $a_{n+1} < a_n$  για κάθε  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.89 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ**

Άθροισμα των όρων μιας ακολουθίας  $(a_n)$  ονομάζεται το άθροισμα  $a_1 + a_2 + \dots + a_n$  των  $n$  πρώτων όρων της. Συμβολίζεται  $S_n$  και είναι

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Ο φυσικός αριθμός  $n$  μας δείχνει το πλήθος των όρων του αθροίσματος.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.90 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ**

Αριθμητική πρόοδος ονομάζεται κάθε ακολουθία  $(a_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  πραγματικών αριθμών στην οποία κάθε όρος της προκύπτει από τον προηγούμενο, προσθέτοντας κάθε φορά τον ίδιο σταθερό αριθμό. Ισχύει δηλαδή

$$a_{n+1} = a_n + \omega$$

Ο αριθμός  $\omega = a_{n+1} - a_n$  ονομάζεται **διαφορά** της αριθμητικής προόδου και είναι σταθερός.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.91 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ**

Αριθμητικός μέσος τριών διαδοχικών όρων  $a, \beta, \gamma$  μιας αριθμητικής προόδου  $(a_n)$  ονομάζεται ο μεσαίος όρος  $\beta$  για τον οποίο έχουμε

$$2\beta = a + \gamma \quad \text{ή} \quad \beta = \frac{a + \gamma}{2}$$

Γενικότερα, αριθμητικός μέσος  $n$  διαδοχικών όρων  $a_1, a_2, \dots, a_n$  μιας αριθμητικής προόδου ονομάζεται ο πραγματικός αριθμός

$$\mu = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.92 ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ**

Αριθμητικοί ενδιάμεσοι δύο αριθμών  $a$  και  $\beta$ , ονομάζονται  $n$  σε πλήθος πραγματικοί αριθμοί  $x_1, x_2, \dots, x_n$  όταν αυτοί μπορούν να παρεμβληθούν μεταξύ των  $a$  και  $\beta$  ώστε οι πραγματικοί αριθμοί

$$a, x_1, x_2, \dots, x_n, \beta$$

να αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.93 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ**

Γεωμετρική πρόοδος ονομάζεται κάθε ακολουθία  $(a_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$  πραγματικών αριθμών στην οποία κάθε όρος της προκύπτει πολλαπλασιάζοντας κάθε φορά τον προηγούμενο όρο με τον ίδιο σταθερό αριθμό. Θα ισχύει

$$a_{n+1} = \lambda \cdot a_n$$

Ο αριθμός  $\lambda = \frac{a_{n+1}}{a_n}$  ονομάζεται **λόγος** της γεωμετρικής προόδου.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.94 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ**

Γεωμετρικός μέσος τριών διαδοχικών όρων  $a, \beta, \gamma$  μιας γεωμετρικής προόδου  $(a_n)$  ονομάζεται ο μεσαίος όρος  $\beta$  για τον οποίο ισχύει

$$\beta^2 = a \cdot \gamma$$

Πιο γενικά, ο γεωμετρικός μέσος  $n$  διαδοχικών όρων  $a_1, a_2, \dots, a_n$  γεωμετρικής προόδου ονομάζεται ο πραγματικός αριθμός  $\mu$  για τον οποίο ισχύει

$$\mu^n = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.95 ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ**

Γεωμετρικοί ενδιάμεσοι δύο αριθμών  $a$  και  $\beta$  ονομάζονται  $n$  σε πλήθος πραγματικοί αριθμοί  $x_1, x_2, \dots, x_n$  όταν αυτοί μπορούν να παρεμβληθούν μεταξύ των  $a$  και  $\beta$  ώστε οι πραγματικοί αριθμοί

$$a, x_1, x_2, \dots, x_n, \beta$$

να αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

---

**ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

---

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.35 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

Εαν  $(a_n)$  μια αριθμητική πρόοδος με διαφορά  $\omega$  τότε ο γενικός όρος της  $a_n$  θα δίνεται από τον τύπο

$$a_n = a_1 + (n - 1)\omega$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.36 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

Εαν  $(a_n)$  μια αριθμητική πρόοδος με διαφορά  $\omega \neq 0$ , τότε το άθροισμα των  $n$  πρώτων όρων της δίνεται από τους παρακάτω τύπους :

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \quad , \quad S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n - 1)\omega]$$



**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.37 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ**

Τρεις πραγματικοί αριθμοί  $a, \beta, \gamma$  αποτελούν διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου αν και μόνο αν ισχύει

$$2\beta = a + \gamma \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \beta = \frac{a + \gamma}{2}$$

Γενικά έχουμε ότι μια ακολουθία πραγματικών αριθμών  $(a_n)$  αποτελεί αριθμητική πρόοδο αν και μόνο αν για κάθε  $n \in \mathbb{N}^*$  ισχύει

$$2a_n = a_{n+1} + a_{n-1}$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.38 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ**

Εαν οι πραγματικοί αριθμοί  $x_1, x_2, \dots, x_n$  είναι αριθμητικοί ενδιάμεσοι δύο αριθμών  $a$  και  $\beta$  τότε η διαφορά της αριθμητικής προόδου στην οποία ανήκουν θα είναι

$$\omega = \frac{\beta - a}{n + 1}$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.39 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

Εαν  $(a_n)$  μια αριθμητική πρόοδος με διαφορά  $\omega$  τότε ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες για τους όρους της :

- i. Εαν  $a_1, a_2, \dots, a_n$  είναι  $n$  όροι αριθμητικής προόδου τότε ο  $\mu$ -οστός όρος από το τέλος βρίσκεται στη θέση  $n - \mu + 1$  και δίνεται από τον τύπο

$$a_{n-\mu+1} = a_n - (\mu - 1)\omega$$

- ii. Το άθροισμα  $S$  των  $\mu$  τελευταίων όρων μιας αριθμητικής προόδου  $(a_n)$  είναι

$$S = S_n - S_{n-\mu}$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.40 ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

Εαν  $(a_n)$  μια γεωμετρική πρόοδος με λόγο  $\lambda$  τότε ο γενικός όρος της  $a_n$  θα δίνεται από τον τύπο

$$a_n = a_1 \cdot \lambda^{n-1}$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.41 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΡΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ**

Εαν  $(a_n)$  μια γεωμετρική πρόοδος με λόγο  $\lambda \neq 1$ , τότε το άθροισμα των  $n$  πρώτων όρων της δίνεται από τους τύπους

$$S_n = \frac{a_n \cdot \lambda - a_1}{\lambda - 1}, \quad S_n = a_1 \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1}$$

Εαν ο λόγος είναι  $\lambda = 1$  τότε το άθροισμα θα δίνεται από τον τύπο  $S_n = na_1$ .

**ΘΕΩΡΗΜΑ 1.42 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ**

Τρεις πραγματικοί αριθμοί  $a, \beta, \gamma$  αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν ισχύει

$$\beta^2 = a \cdot \gamma$$

Εαν οι τρεις όροι  $a, \beta, \gamma$  είναι θετικοί έχουμε ισοδύναμα  $\beta = \sqrt{a \cdot \gamma}$ .

Γενικά έχουμε οτι μια ακολουθία πραγματικών αριθμών  $(a_n)$  αποτελεί γεωμετρική πρόοδο αν και μόνο αν για κάθε  $n \in \mathbb{N}^*$  ισχύει

$$a_n^2 = a_{n+1} \cdot a_{n-1}$$

### ΘΕΩΡΗΜΑ 1.43 ΛΟΓΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ

Εαν οι πραγματικοί αριθμοί  $x_1, x_2, \dots, x_n$  είναι γεωμετρικοί ενδιάμεσοι δύο αριθμών  $a, \beta \in \mathbb{R}^*$  τότε για το λόγο της γεωμετρικής προόδου στην οποία ανήκουν ισχύει :

1. Αν ο εκθέτης  $n + 1$  είναι άρτιος και  $a, \beta$  ομόσημοι τότε  $\lambda = \pm \sqrt[n+1]{\frac{\beta}{a}}$ .
2. Αν ο εκθέτης  $n + 1$  είναι περιττός έχουμε

i. Αν  $a, \beta$  ομόσημοι τότε  $\lambda = \sqrt[n+1]{\frac{\beta}{a}}$

ii. Αν  $a, \beta$  ετερόσημοι τότε  $\lambda = -\sqrt[n+1]{\left|\frac{\beta}{a}\right|}$

Στην περίπτωση όπου ο εκθέτης  $n + 1$  είναι άρτιος και  $a, \beta$  ετερόσημοι τότε δεν ορίζεται λόγος  $\lambda$  και κατά συνέπεια δε σχηματίζεται γεωμετρική πρόοδος.

## 1.5 Μιγαδικοί Αριθμοί

### ΟΡΙΣΜΟΙ

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.96 ΜΙΓΑΔΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Μιγαδικό σύνολο ονομάζεται το σύνολο των αριθμών για το οποίο έχουμε :

- Είναι **υπερσύνολο** των πραγματικών αριθμών  $(\mathbb{R})$  και συμβολίζεται με  $\mathbb{C}$ .
- Περιέχει όλες τις ιδιότητες των πράξεων που ισχύουν και στο  $\mathbb{R}$ .
- Περιέχει το στοιχείο  $i$  που ικανοποιεί τη σχέση  $i^2 = -1$  το οποίο ονομάζεται **φανταστική μονάδα**.
- Τα στοιχεία του συνόλου  $\mathbb{C}$  ονομάζονται **μιγαδικοί αριθμοί**.
- Η ιδιότητα της διάταξης που ισχύει στο σύνολο  $\mathbb{R}$  των πραγματικών αριθμών **δεν** μεταφέρεται και στο σύνολο  $\mathbb{C}$  των μιγαδικών. Κατά συνέπεια αν  $z = a + \beta i$  είναι ένας μιγαδικός αριθμός τότε δεν έχει νόημα μια σχέση της μορφής  $z > 0$  παρά μόνο αν ο αριθμός  $z$  είναι πραγματικός ώστε να ισχύει η διάταξη δηλαδή έχουμε

$$z > 0 \Rightarrow a > 0 \text{ και } \beta = 0$$

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.97 ΜΙΓΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Μιγαδικός αριθμός ονομάζεται κάθε στοιχείο  $z \in \mathbb{C}$  του μιγαδικού συνόλου και είναι της μορφής  $z = a + \beta i$  με  $a, \beta \in \mathbb{R}$ .

- Ο αριθμός  $a \in \mathbb{R}$  λέγεται **πραγματικό μέρος** του μιγαδικού αριθμού  $z$ .

- Ο αριθμός  $\beta \in \mathbb{R}$  λέγεται **φανταστικό μέρος** του μιγαδικού αριθμού  $z$ .

Συμβολίζονται ως εξής :

$$a = \operatorname{Re}(z) \qquad \beta = \operatorname{Im}(z)$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.98 ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Φανταστικό ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων  $z$  της μορφής  $\beta i$  τα οποία ονομάζονται **φανταστικοί αριθμοί** και συμβολίζεται με  $\mathbb{I}$ .

$$\mathbb{I} = \{\beta i \mid \beta \in \mathbb{R}\}$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.99 ΣΥΖΥΓΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ

Αν  $z = a + \beta i$  είναι ένας μιγαδικός αριθμός τότε ο μιγαδικός


$$\bar{z} = a - \beta i$$

ονομάζεται **συζυγής** του  $z$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.100 ΜΙΓΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μιγαδικό επίπεδο ονομάζεται το ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων στους άξονες του οποίου παίρνουν τιμές τα μέρη των μιγαδικών αριθμών.

- Ο οριζόντιος άξονας λέγεται **πραγματικός** και είναι ο άξονας των πραγματικών μερών των μιγαδικών αριθμών
- ο κατακόρυφος άξονας λέγεται **φανταστικός** και είναι ο άξονας των φανταστικών μερών των μιγαδικών αριθμών.
- Κάθε μιγαδικός αριθμός  $z = a + \beta i$  παριστάνεται γραφικά με δύο τρόπους




Σχήμα 1.23: Μιγαδικό επίπεδο - Εικόνα μιγαδικού

- Σαν σημείο με συντεταγμένες  $(a, \beta)$  το οποίο ονομάζεται **εικόνα** του μιγαδικού.
- Σαν διάνυσμα με αρχή την αρχή των αξόνων και πέρας την εικόνα του μιγαδικού.

Ονομάζεται **διανυσματική ακτίνα** του  $z$ .

Εαν  $z = a + \beta i$  είναι ένας μιγαδικός αριθμός τότε

- η εικόνα του συζυγή του  $\bar{z} = a - \beta i$  είναι συμμετρική με τον  $z$  ως προς τον πραγματικό άξονα
- η εικόνα του αντίθετου  $-z = -a - \beta i$  είναι συμμετρική με τον  $z$  ως προς την αρχή των αξόνων  $O$ .
- η εικόνα του αντίθετου του συζυγή  $-\bar{z} = -a + \beta i$  είναι συμμετρική με τον  $z$  ως προς τον φανταστικό άξονα.



Σχήμα 1.24: Εικόνες συζυγή, αντίθετου και συζυγή του αντίθετου

## 1.6 Πίνακες

### ΟΡΙΣΜΟΙ

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.101 ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας ονομάζεται μια ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες. Αν  $\nu$  είναι το πλήθος των γραμμών και  $\mu$  το πλήθος των στηλών της διάταξης, τότε ο πίνακας ονομάζεται **πίνακας  $\nu \times \mu$** . Κάθε πίνακας συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα όπως  $A, B$ , κ.τ.λ.

$$\begin{array}{c} j\text{-στήλη} \\ \downarrow \\ A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1\mu} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2\mu} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{i\mu} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{\nu 1} & a_{\nu 2} & \dots & a_{\nu j} & \dots & a_{\nu \mu} \end{bmatrix} \leftarrow i\text{-γραμμή} \end{array}$$

- Οι αριθμοί που βρίσκονται μέσα στον πίνακα ονομάζεται **στοιχεία** του πίνακα.
- Τη θέση ενός στοιχείου στον πίνακα την προσδιορίζουμε συνδυάζοντας τον αριθμό της γραμμής με τον αριθμό της στήλης στην οποία βρίσκεται.
- Κάθε στοιχείο ενός πίνακα συμβολίζεται με μικρό γράμμα π.χ.  $a$  με δείκτη  $ij$  δηλαδή  $a_{ij}$ . Ο αριθμός  $i$  με  $i \in \{1, 2, \dots, \nu\}$  μας δίνει τη θέση της γραμμής στην οποία βρίσκεται το στοιχείο  $a_{ij}$  ενώ ο αριθμός  $j$  με  $j \in \{1, 2, \dots, \mu\}$  μας δίνει τη θέση της στήλης στην οποία βρίσκεται. Ένας  $\nu \times \mu$  πίνακας  $A$  συμβολίζεται εν συντομία  $A = [a_{ij}]$  με  $i \in \{1, 2, \dots, \nu\}$  και  $j \in \{1, 2, \dots, \mu\}$ .

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.102 ΕΙΔΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Για ειδικές τιμές των αριθμών  $\nu$  και  $\mu$  καθώς και για συνθήκες που αφορούν τα στοιχεία  $a_{ij}$  ενός πίνακα και τους δίκτες  $i, j$  προκύπτουν οι παρακάτω ειδικά είδη πινάκων.

##### 1. Πίνακας γραμμή

Αν για ένα  $\nu \times \mu$  πίνακα  $A$  έχουμε  $\nu = 1$  τότε ο  $1 \times \mu$  πίνακας που προκύπτει έχει μια γραμμή και τη μορφή

$$A = [a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1\mu}] \quad , \quad \text{Πίνακας } 1 \times \mu$$

##### 2. Πίνακας στήλη

Αν για ένα  $\nu \times \mu$  πίνακα  $A$  έχουμε  $\mu = 1$  τότε ο  $\nu \times 1$  πίνακας που προκύπτει έχει μια στήλη και τη μορφή

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{\nu 1} \end{bmatrix} \quad , \quad \text{Πίνακας } \nu \times 1$$

### 3. Πίνακας στοιχείο

Αν σε ένα  $\nu \times \mu$  πίνακα  $A$  θέσουμε  $\mu = 1$  και  $\mu = 1$  τότε ο  $1 \times 1$  πίνακας που προκύπτει έχει ένα στοιχείο και τη μορφή

$$A = [a_{11}] \quad , \quad \text{Πίνακας } 1 \times 1$$

### 4. Άνω κλιμακωτός - Κάτω κλιμακωτός

Αν για ένα  $\nu \times \mu$  πίνακα  $A$  ισχύει η σχέση  $a_{ij} = 0$  για κάθε  $i > j$  τότε ο πίνακας λέγεται **άνω κλιμακωτός**. Αντίστοιχα αν ισχύει  $a_{ij}$  για κάθε  $i < j$  ονομάζεται **κάτω κλιμακωτός**. Οι πίνακες αυτοί είναι της μορφής

$$\begin{array}{c} \text{Άνω κλιμακωτός} \\ \left[ \begin{array}{cccccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1\mu} \\ 0 & a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2\mu} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{ij} & \dots & a_{i\mu} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & a_{\nu\mu} \end{array} \right] \end{array} , \quad \begin{array}{c} \text{Κάτω κλιμακωτός} \\ \left[ \begin{array}{cccccc} a_{11} & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{\nu 1} & a_{\nu 2} & \dots & a_{\nu j} & \dots & a_{\nu\mu} \end{array} \right] \end{array}$$

### 5. Τετραγωνικός πίνακας

Ένας  $\nu \times \mu$  πίνακας ονομάζεται τριγωνικός εαν έχει τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών δηλαδή  $\nu = \mu$ . Ο πίνακας ονομάζεται **τάξης  $\nu$** . Τα στοιχεία ενός τετραγωνικού πίνακα  $\nu \times \nu$  της μορφής  $a_{ii}$  με  $i \in \{1, 2, \dots, \nu\}$  δηλαδή σε θέση όπου ο αριθμός της γραμμής και της στήλης είναι ίδιος, αποτελούν την **κύρια διαγώνιο** του πίνακα.

$$\left[ \begin{array}{ccccc} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1\nu} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ii} & \dots & a_{i\nu} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\nu 1} & \dots & a_{\nu j} & \dots & a_{\nu\nu} \end{array} \right] , \quad \text{Πίνακας } \nu \times \nu$$

### 6. Άνω τριγωνικός - Κάτω τριγωνικός

Ένας κλιμακωτός και τετραγωνικός  $\nu \times \nu$  πίνακας ονομάζεται **άνω τριγωνικός** ή **κάτω τριγωνικός** εαν είναι άνω κλιμακωτός ή κάτω κλιμακωτός αντίστοιχα.

$$\begin{array}{c} \text{Άνω τριγωνικός} \\ \left[ \begin{array}{ccccc} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1\nu} \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & a_{ii} & \dots & a_{i\nu} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & a_{\nu\nu} \end{array} \right] \end{array} , \quad \begin{array}{c} \text{Κάτω τριγωνικός} \\ \left[ \begin{array}{ccccc} a_{11} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ii} & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\nu 1} & \dots & a_{\nu j} & \dots & a_{\nu\nu} \end{array} \right] \end{array}$$

**7. Διαγώνιος πίνακας**

Ένας τετραγωνικός πίνακας  $n \times n$  ονομάζεται **διαγώνιος** εαν όλα τα στοιχεία του εκτός της κύριας διαγωνίου είναι μηδενικά. Δηλαδή  $a_{ij} = 0$ ,  $\forall i \neq j$  με  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ .

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & a_{ii} & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

**8. Μοναδιαίος πίνακας**

Ένας τετραγωνικός πίνακας  $n \times n$  ονομάζεται **μοναδιαίος** αν είναι διαγώνιος με τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου να είναι ίσα με τη μονάδα. Δηλαδή  $a_{ij} = 0$ ,  $\forall i \neq j$  και  $a_{ii} = 1$  με  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Συμβολίζεται με  $I_n$ .

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.103 ΙΣΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Ίσοι ονομάζονται δύο  $n \times m$  πίνακες  $A = [a_{ij}]$  και  $B = [\beta_{ij}]$  όταν όλα τα στοιχεία τους στις αντίστοιχες θέσεις είναι ίσα μεταξύ τους.

$$A = B \text{ εαν } a_{ij} = \beta_{ij}, \forall i, j$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.104 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ**

Άθροισμα δύο  $n \times n$  τετραγωνικών πινάκων  $A = [a_{ij}]$  και  $B = [\beta_{ij}]$  ίδιας τάξης  $n$  ονομάζεται ο τετραγωνικός πίνακας  $\Gamma = [\gamma_{ij}]$  ο οποίος έχει στοιχεία τα αθροίσματα των αντίστοιχων στοιχείων των  $A$  και  $B$ .

$$\Gamma = A + B \text{ με } \gamma_{ij} = a_{ij} + \beta_{ij}, \forall i, j$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.105 ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Αντίθετος ενός  $n \times m$  πίνακα  $A = [a_{ij}]$  ονομάζεται ο  $n \times m$  πίνακας  $-A$  του οποίου τα στοιχεία είναι αντίθετα από τα αντίστοιχα στοιχεία του  $A$

$$-A = [-a_{ij}], \forall i, j$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.106 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ**


Γινόμενο ενός αριθμού  $\lambda \in \mathbb{R}$  με έναν  $n \times m$  πίνακα  $A = [a_{ij}]$  ονομάζεται ο  $n \times m$  πίνακας  $\lambda A$  του οποίου τα στοιχεία είναι πολλαπλάσια των αντιστοιχων στοιχείων του  $A$ .

$$\lambda A = [\lambda a_{ij}], \forall i, j$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.107 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΩΝ**

Γινόμενο ενός  $\nu \times \mu$  πίνακα  $A = [a_{ij}]$  με έναν  $\mu \times \rho$  πίνακα  $B = [\beta_{jk}]$  ονομάζεται ο  $\nu \times \rho$  πίνακας  $\Gamma = [\gamma_{ik}]$  του οποίου κάθε στοιχείο  $\gamma_{ik}$  αποτελεί το άθροισμα των γινομένων των στοιχείων της  $i$ -γραμμής του πίνακα  $A$  με τα αντίστοιχα στοιχεία της  $k$ -στήλης του  $B$ .

Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε πως τα στοιχεία του πίνακα  $A$  σε μια γραμμή  $i$  πολλαπλασιάζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία της  $k$  στήλης του πίνακα  $B$ . Αυτό αναλυτικά σημαίνει ότι θα πολλαπλασιαστεί το πρώτο στοιχείο της γραμμής με το αντίστοιχο πρώτο της στήλης, το δεύτερο με το δεύτερο κ.τ.λ. Το άθροισμα των γινομένων αυτών αποτελεί το στοιχείο  $\gamma_{ik}$  του πίνακα  $\Gamma$ .



Σχήμα 1.25: Γινόμενο πινάκων

- Κάθε στοιχείο του πίνακα γινόμενο θα είναι

$$\gamma_{ij} = a_{i1} \cdot \beta_{1k} + a_{i2} \cdot \beta_{2k} + \dots + a_{i\mu} \cdot \beta_{\mu k} = \sum_{j=1}^{\mu} a_{ij} \cdot \beta_{jk}$$

- Το γινόμενο δύο πινάκων  $A, B$  ορίζεται όταν ο πρώτος πίνακας  $A$  έχει αριθμό στηλών ίσο με τον αριθμό των γραμμών του δεύτερου πίνακα  $B$ .

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.108 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Αντίστροφος πίνακας ενός τετραγωνικού πίνακα  $A$  τάξης  $\nu$  ονομάζεται ο  $\nu \times \nu$  πίνακας  $A^{-1}$  ο οποίος αν πολλαπλασιαστεί με τον  $A$  μας δίνει το μοναδιαίο πίνακα  $I_\nu$ .

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_\nu$$

Αντιστρέψιμος ονομάζεται ο τετραγωνικός πίνακας ο οποίος έχει αντίστροφο.

Ο αντίστροφος ενός  $2 \times 2$  πίνακα  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$  θα είναι της μορφής

$$A^{-1} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

όπου  $D$  είναι η ορίζουσα του πίνακα  $A$  με  $D \neq 0$ .

## 1.7 Μαθηματική Λογική

### ΟΡΙΣΜΟΙ

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.109 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μαθηματική πρόταση ονομάζεται κάθε λογική και σαφής έκφραση με πλήρες νόημα που περιέχει μαθηματικές έννοιες.

- Κάθε μαθηματική πρόταση δέχεται τους χαρακτηρισμούς **αληθής** και **ψευδής** τα οποία ονομάζονται **τιμές** μιας πρότασης.
- Οι μαθηματικές προτάσεις συμβολίζονται με τη χρήση μεταβλητών όπως  $p, q, r, s \dots$
- Προτάσεις που κατασκευάζονται από συνδυασμό απλών προτάσεων με τη χρήση συνδέσμων, ονομάζονται **σύνθετες** προτάσεις.

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.110 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Σύνδεσμοι προτάσεων ονομάζονται οι πράξεις με τις οποίες συνδέονται απλές μαθηματικές προτάσεις, κατασκευάζοντας έτσι σύνθετες λογικές προτάσεις. Συγκεκριμένα οι σύνδεσμοι μεταξύ προτάσεων είναι :

##### 1. Διάζευξη

Ο σύνδεσμος **ή** μεταξύ δύο προτάσεων  $p, q$  ονομάζεται **διάζευξη** και δηλώνει ότι η σύνθετη πρόταση  $p$  ή  $q$  που προκύπτει είναι αληθής αν **τουλάχιστον μια** από τις δύο προτάσεις  $p$  και  $q$  είναι αληθής.

##### 2. Αποκλειστική διάζευξη

Ο σύνδεσμος **είτε** μεταξύ δύο προτάσεων  $p, q$  ονομάζεται **αποκλειστική διάζευξη** και δηλώνει ότι η σύνθετη πρόταση  $p$  είτε  $q$  που προκύπτει είναι αληθής αν **μόνο μια** από τις δύο προτάσεις  $p$  και  $q$  είναι αληθής.

##### 3. Σύζευξη

Ο σύνδεσμος **και** μεταξύ δύο προτάσεων  $p, q$  ονομάζεται **σύζευξη** και δηλώνει ότι η σύνθετη πρόταση  $p$  και  $q$  που προκύπτει είναι αληθής αν αληθεύουν **συγχρόνως** οι προτάσεις  $p$  και  $q$ .

##### 4. Συνεπαγωγή

Ο σύνδεσμος  $\Rightarrow$  της **συνεπαγωγής** μεταξύ δύο προτάσεων  $p, q$  συνθέτει την πρόταση  $p \Rightarrow q$  στην οποία η ισχύς της  $p$  **συνεπάγεται**, έχει σαν συμπέρασμα δηλαδή, την ισχύ της  $q$ .



- Η πρόταση  $p \Rightarrow q$  μας δίνει τη δομή ενός θεωρήματος όπου η πρόταση  $p$  είναι η υπόθεση και η  $q$  το συμπέρασμα.
- Το θεώρημα  $q \Rightarrow p$  ονομάζεται **αντίστροφο** του  $p \Rightarrow q$  το οποίο έχει ως υπόθεση την πρόταση  $q$  και ως θεώρημα την πρόταση  $p$ .
- Η πρόταση  $p$  ονομάζεται **ικανή** συνθήκη της  $q$ . Η  $q$  λέγεται **αναγκαία** της  $p$ .
- Ο σύνδεσμος  $\Rightarrow$  της συνεπαγωγής διαβάζεται και **τότε**.

### 5. Ισοδυναμία ή Διπλή συνεπαγωγή

Ο σύνδεσμος  $\Leftrightarrow$  της διπλής συνεπαγωγής εκφράζει **ισοδυναμία** μεταξύ δύο προτάσεων  $p, q$  και συμβολίζεται  $p \Leftrightarrow q$ .

- Στην πρόταση αυτή, η  $p$  συνεπάγεται την  $q$  και αντίστροφα. Κάθε πρόταση από τις  $p, q$  αποτελεί **ικανή και αναγκαία** συνθήκη για την άλλη.
- Ο σύνδεσμος  $\Leftrightarrow$  της ισοδυναμίας διαβάζεται και **αν και μόνο αν**.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.111 ΤΑΥΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΦΑΣΗ

Ταυτολογία ονομάζεται μια σύνθετη πρόταση που αληθεύει για κάθε τιμή των απλών προτάσεων της. Αντίφαση ονομάζεται μια σύνθετη πρόταση που είναι ψευδής για κάθε τιμή των απλών προτάσεων της.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 1.112 ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Προτασιακός τύπος μεταβλητών ονομάζεται κάθε έκφραση που περιέχει μια ή περισσότερες μεταβλητές οι οποίες αν αντικατασταθούν από οποιαδήποτε στοιχεία δοσμένων συνόλων μετατρέπουν τον προτασιακό τύπο σε μαθηματική πρόταση. Συμβολίζονται με

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

όπου  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$  είναι μεταβλητές του προτασιακού τύπου. Αν  $p(x_1, \dots, x_n)$  ένας προτασιακός τύπος με  $n$  μεταβλητές τότε :

- Το σύνολο  $\Omega_i$  από το οποίο παίρνει τιμές μια μεταβλητή  $x_i$  με  $i = 1, \dots, n$  λέγεται **σύνολο αναφοράς** της μεταβλητής.
- Κάθε  $n$ -άδα μεταβλητών παίρνει τιμές από το σύνολο  $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$  το οποίο λέγεται **σύνολο αναφοράς του προτασιακού τύπου**.
- Αν για μια  $n$ -άδα τιμών  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  η πρόταση  $p(a_1, a_2, \dots, a_n)$  είναι αληθής τότε λέμε ότι το στοιχείο  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  επαληθεύει τον προτασιακό τύπο.
- Το σύνολο των στοιχείων που επαληθεύει ένα προτασιακό τύπο λέγεται **σύνολο αληθείας**.

Στην απλή περίπτωση ενός προτασιακού τύπου  $p(x)$  μιας μεταβλητής οι παραπάνω έννοιες έχουν ως εξής.

- Το σύνολο  $\Omega$  των τιμών της μεταβλητής είναι το σύνολο αναφοράς.
- Το στοιχείο  $a \in \Omega$  επαληθεύει τον  $p(x)$  αν η πρόταση είναι  $p(a)$  είναι αληθής.
- Το σύνολο  $A = \{x \in \Omega | p(x) \text{ αληθής}\}$  είναι το σύνολο αληθείας.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.113 ΠΟΣΟΔΕΙΚΤΕΣ**

Ποσοδείκτες ονομάζονται τα σύμβολα  $\forall, \exists$  με τα οποία εκφράζουμε το πλήθος των στοιχείων για τα οποία ένας προτασιακός τύπος είναι αληθής, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων του συνόλου αληθείας.

**1. Γενικός ποσοδείκτης :  $\forall$  “για κάθε”**

Αν το σύνολο αληθείας ταυτίζεται με το σύνολο αναφοράς ενός προτασιακού τύπου τότε χρησιμοποιείται ο ποσοδείκτης  $\forall$  ο οποίος διαβάζεται **για κάθε** και εκφράζει την ισχύ του τύπου για κάθε τιμή της μεταβλητής.

**2. Υπαρξιακός ποσοδείκτης :  $\exists$  “υπάρχει”**

Αν το σύνολο αληθείας είναι υποσύνολο του συνόλου αναφοράς ενός προτασιακού τύπου τότε χρησιμοποιείται ο ποσοδείκτης  $\exists$  ο οποίος διαβάζεται **υπάρχει** και εκφράζει την ισχύ του τύπου για τουλάχιστον μια τιμή της μεταβλητής.

Αν ο προτασιακός τύπος δεν είναι αληθής για καμία τιμή της μεταβλητής τότε χρησιμοποιείται ο ποσοδείκτης  $\nexists$  και διαβάζεται **δεν υπάρχει**.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 1.114 ΑΠΟΔΕΙΞΗ**

Απόδειξη μιας πρότασης ονομάζεται η διαδικασία με την οποία θεμελιώνουμε την ισχύ της κάνοντας χρήση ορισμών, αξιωμάτων, θεωρημάτων με γνωστή ισχύ και άλλων βασικών μαθηματικών εννοιών. Με λογικούς κανόνες και συμπεράσματα συνδέουμε τις μαθηματικές έννοιες μεταξύ τους και συνθέτουμε τη μεθοδολογία της ώστε να οδηγηθούμε στο ζητούμενο. Στη **Μέθοθο...** θα δούμε αναλυτικά την γνωστές μεθόδους απόδειξης προτάσεων.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ

## ΓΕΩΜΕΤΡΑ

# 2

### 2.1 Ευθείες - Ημιευθείες - Ευθύγραμμα τμήματα

#### ΟΡΙΣΜΟΙ

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.1 ΣΗΜΕΙΟ

Σημείο ονομάζεται το σχήμα που δηλώνει θέση στο επίπεδο ή στο χώρο. Παριστάνεται με τελεία, δεν έχει διαστάσεις και συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα του ελληνικού ή λατινικού αλφαβήτου.

°  
A

Σχήμα 2.1: Σημείο

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.2 ΓΡΑΜΜΗ

Γραμμή ονομάζεται το σχήμα που προκύπτει από το σύνολο των θέσεων ενός μετακινούμενου σημείου στο επίπεδο ή στο χώρο. Η γραμμή έχει μόνο μια διάσταση, το μήκος.

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Επιφάνεια ονομάζεται το σύνολο των σημείων ενός σώματος που ορίζουν το εξωτερικό σχήμα του. Εναλλακτικά επιφάνεια μπορεί να ονομαστεί το σύνολο των θέσεων μιας μετακινούμενης γραμμής στο χώρο.

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Γεωμετρικό σχήμα ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων ενός σχήματος στοιχεία του οποίου αποτελούν τα σημεία οι γραμμές και οι επιφάνειες του.

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.5 ΕΙΚΟΝΑ

Εικόνα ενός σχήματος ονομάζεται το σχήμα, το οποίο προκύπτει από μετατόπιση του αρχικού χωρίς να αλλοιωθεί.

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.6 ΕΠΙΠΕΔΟ

Επίπεδο ονομάζεται μια λεία ομοιόμορφη επιφάνεια στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως μια ευθεία γραμμή. Το επίπεδο έχει δύο διαστάσεις μήκος και πλάτος.

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.7 ΗΜΙΕΠΙΠΕΔΟ

Ημιεπίπεδο ονομάζεται καθένα από τα μέρη ενός επιπέδου στα οποία χωρίζεται από μια ευθεία γραμμή.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.8 ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ

Ευθεία ονομάζεται η γραμμή με το ελάχιστο μήκος η οποία διέρχεται από δύο σημεία. Συμβολίζεται με ένα μικρό γράμμα του ελληνικού ή λατινικού αλφαβήτου.



Σχήμα 2.2: Ευθεία γραμμή

### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.9 ΗΜΙΕΥΘΕΙΑ

Ημιευθεία ονομάζεται η γραμμή η οποία αποτελεί τμήμα μιας ευθείας, με αρχή ένα σημείο της η οποία επεκτείνεται απεριόριστα. Συμβολίζεται με το γράμμα του σημείου της αρχής και ένα μικρό γράμμα προς το μέρος που επεκτείνεται.




Σχήμα 2.3: Ημιευθεία

### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.10 ΦΟΡΕΑΣ

Φορέας μιας ημιευθείας ή ενός ευθύγραμμου τμήματος ονομάζεται η ευθεία γραμμή η οποία φέρει πάνω της την ημιευθεία ή το ευθύγραμμο τμήμα.

### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.11 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΗΜΙΕΥΘΕΙΕΣ

Αντικείμενες ονομάζονται δυο ημιευθείες με κοινή αρχή και κοινό φορέα.



Σχήμα 2.4: Αντικείμενες ημιευθείες

### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.12 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΜΗΜΑ

Ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται το τμήμα μιας ευθείας γραμμής το οποίο βρίσκεται ανάμεσα από δύο σταθερά σημεία αυτής. Τα σταθερά αυτά σημεία ονομάζονται **άκρα** του ευθύγραμμου τμήματος.



Σχήμα 2.5: Ευθύγραμμο τμήμα

### ΟΡΙΣΜΟΣ 2.13 ΜΕΣΟ

Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος, ονομάζεται το εσωτερικό σημείο του, το οποίο το χωρίζει σε δύο ίσα μέρη.



Σχήμα 2.6: Μέσο τμήματος

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ

## ΠΙΘΑΝΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ

# 3

### 3.1 Σύνολα - Δειγματικός Χώρος - Ενδεχόμενα

#### ΟΡΙΣΜΟΙ

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο ονομάζεται μια συλλογή όμοιων αντικειμένων, τα οποία είναι καλά ορισμένα και διακριτά μεταξύ τους.

- Τα αντικείμενα ενός συνόλου ονομάζονται **στοιχεία**.
- Τα σύνολα τα συμβολίζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα.

##### Βασικά σύνολα αριθμών

- Φυσικοί Αριθμοί** :  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
- Ακέραιοι Αριθμοί** :  $\mathbb{Z} = \{\dots, -1, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Ρητοί Αριθμοί** :  $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{\beta} \mid a, \beta \in \mathbb{Z}, \beta \neq 0 \right\}$
- Πραγματικοί Αριθμοί** :  $\mathbb{R} = \{\text{όλοι οι αριθμοί}\}$

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 3.2 ΙΣΑ ΣΥΝΟΛΑ

Ίσα ονομάζονται δύο σύνολα  $A, B$  τα οποία έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία. Ισοδύναμα, τα σύνολα  $A, B$  λέγονται ίσα εαν ισχύουν οι σχέσεις :

- Κάθε στοιχείο του  $A$  είναι και στοιχείο του  $B$
- Κάθε στοιχείο του  $B$  είναι και στοιχείο του  $A$ .

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 3.3 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

Ένα σύνολο  $A$  λέγεται υποσύνολο ενός συνόλου  $B$  όταν κάθε στοιχείο του  $A$  είναι και στοιχείο του  $B$ .

$$A \subseteq B$$

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 3.4 ΚΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κενό ονομάζεται το σύνολο που δεν έχει κανένα στοιχείο. Συμβολίζεται με  $\emptyset$  ή  $\{\}$ .

##### ΟΡΙΣΜΟΣ 3.5 ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


Βασικό ονομάζεται το σύνολο το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία που μπορούμε να επιλέξουμε, από τα οποία φτιάχνουμε άλλα σύνολα. Συμβολίζεται με  $\Omega$ .

**ΟΡΙΣΜΟΣ 3.6 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΟΛΩΝ****1. Ένωση**

Ένωση δύο υποσυνόλων  $A, B$  ενός βασικού συνόλου  $\Omega$  ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων του  $\Omega$  τα οποία ανήκουν σε τουλάχιστον ένα από τα σύνολα  $A$  και  $B$ . Συμβολίζεται με  $A \cup B$ .

$$A \cup B = \{x \in \Omega \mid x \in A \text{ ή } x \in B\}$$

Η ένωση των συνόλων  $A$  και  $B$  περιέχει τα κοινά και μη κοινά στοιχεία των δύο συνόλων. Τα κοινά στοιχεία αναγράφονται μια φορά.




Σχήμα 3.1: Ένωση

**2. Τομή**

Τομή δύο υποσυνόλων  $A, B$  ενός βασικού συνόλου  $\Omega$  ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων του  $\Omega$  τα οποία ανήκουν και στα δύο σύνολα  $A$  και  $B$ . Συμβολίζεται με  $A \cap B$ .

$$A \cap B = \{x \in \Omega \mid x \in A \text{ και } x \in B\}$$

Η τομή των συνόλων  $A$  και  $B$  περιέχει μόνο τα κοινά στοιχεία των δύο συνόλων.




Σχήμα 3.2: Τομή

**3. Συμπλήρωμα**

Συμπλήρωμα ενός συνόλου  $A$  ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων του βασικού συνόλου  $\Omega$  τα οποία **δεν** ανήκουν στο σύνολο  $A$ . Συμβολίζεται με  $A'$ .

$$A' = \{x \in \Omega \mid x \notin A\}$$

Ονομάζεται συμπλήρωμα του  $A$  γιατί η ένωσή του με το σύνολο αυτό μας δίνει το βασικό σύνολο  $\Omega$ .




Σχήμα 3.3: Συμπλήρωμα

**4. Διαφορά**

Διαφορά ενός συνόλου  $B$  από ένα σύνολο  $A$  ονομάζεται το σύνολο των στοιχείων του βασικού συνόλου  $\Omega$  τα οποία ανήκουν μόνο στο σύνολο  $A$ , το πρώτο σύνολο της διαφοράς. Συμβολίζεται με  $A - B$ .

$$A - B = \{x \in \Omega \mid x \in A \text{ και } x \notin B\}$$



Σχήμα 3.4: Διαφορά συνόλων

**ΟΡΙΣΜΟΣ 3.7 ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΥΧΗΣ**

Πείραμα τύχης ονομάζεται κάθε πείραμα του οποίου το αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη βεβαιότητα όσες φορές κι αν αυτό επαναληφθεί, κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 3.8 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ**

Δειγματικός χώρος ονομάζεται το σύνολο το οποίο περιέχει όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης. Ο δειγματικός αποτελεί βασικό σύνολο.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 3.9 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ**

Ενδεχόμενο ονομάζεται το σύνολο το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία του δειγματικού χώρου ενός πειράματος.

- Κάθε ενδεχόμενο είναι υποσύνολο του δειγματικού του χώρου.
- Συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα π.χ. :  $A, B, \dots$
- Τα ενδεχόμενα που έχουν ένα στοιχείο ονομάζονται **απλά** ενδεχόμενα, ενώ αν περιέχουν περισσότερα στοιχεία ονομάζονται **σύνθετα**.
- Εάν το αποτέλεσμα ενός πειράματος είναι στοιχείο ενός ενδεχομένου τότε το ενδεχόμενο **πραγματοποιείται**.
- Τα στοιχεία ενός ενδεχομένου ονομάζονται ευνοϊκές περιπτώσεις.
- Ο δειγματικός χώρος  $\Omega$  ονομάζεται **βέβαιο** ενδεχόμενο, ενώ το κενό σύνολο ονομάζεται **αδύνατο** ενδεχόμενο.
- Εάν δύο ενδεχόμενα  $A, B$  δεν έχουν κοινά στοιχεία τότε ονομάζονται **ασυμβίβαστα** ή ξένα μεταξύ τους δηλαδή :

$$A, B \text{ ασυμβίβαστα} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 3.10 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ****1. Ένωση**

Ένωση δύο ενδεχομένων  $A, B$  ονομάζεται το ενδεχόμενο το οποίο περιέχει τα κοινά και μη κοινά στοιχεία των δύο ενδεχομένων. Η ένωση πραγματοποιείται όταν πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα ενδεχόμενα  $A$  ή  $B$ .

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ ή } x \in B$$

**2. Τομή**

Τομή δύο ενδεχομένων  $A, B$  ονομάζεται το ενδεχόμενο το οποίο περιέχει τα κοινά στοιχεία των δύο ενδεχομένων. Η τομή πραγματοποιείται όταν πραγματοποιούνται συγχρόνως και τα δύο ενδεχόμενα  $A$  και  $B$ .

$$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ και } x \in B$$

**3. Συμπλήρωμα**

Συμπλήρωμα ενός ενδεχομένου  $A$  ονομάζεται το ενδεχόμενο το οποίο περιέχει τα στοιχεία εκείνα τα οποία **δεν** ανήκουν στο σύνολο  $A$ . Το συμπλήρωμα πραγματοποιείται όταν δεν πραγματοποιείται το  $A$ .










$$x \in A' \Leftrightarrow x \notin A$$

**4. Διαφορά**

Διαφορά ενός ενδεχομένου  $A$  από ένα ενδεχόμενο  $B$  ονομάζεται το ενδεχόμενο που περιέχει τα στοιχεία που ανήκουν μόνο στο ενδεχόμενο  $A$ . Η διαφορά πραγματοποιείται όταν πραγματοποιείται μόνο το ενδεχόμενο  $A$ .

$$x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \text{ και } x \notin B$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ενδεχόμενα, οι πράξεις μεταξύ δύο ενδεχομένων  $A, B$ , οι συμβολισμοί τους, λεκτική περιγραφή καθώς και διάγραμμα για κάθε περίπτωση.

Συμβολισμός	Ενδεχόμενο	Περιγραφή	Διάγραμμα
$x \in A$	Ενδεχόμενο $A$	Το ενδεχόμενο $A$ πραγματοποιείται	
$x \in A'$	Συμπλήρωμα του $A$	Το ενδεχόμενο $A$ <b>δεν</b> πραγματοποιείται	
$x \in A \cup B$	Ένωση του $A$ με το $B$	Πραγματοποιείται ένα <b>τουλάχιστον</b> από τα ενδεχόμενα $A$ και $B$ .	
$x \in A \cap B$	Τομή του $A$ με το $B$	Πραγματοποιούνται <b>συγχρόνως</b> τα ενδ. $A$ και $B$ .	
$x \in A - B$	Διαφορά του $B$ απ' το $A$	Πραγματοποιείται <b>μόνο</b> το ενδεχόμενο $A$	
$x \in B - A$	Διαφορά του $A$ απ' το $B$	Πραγματοποιείται <b>μόνο</b> το ενδεχόμενο $B$	
$x \in (A - B) \cup (B - A)$	Ένωση διαφορών	Πραγματοποιείται <b>μόνο</b> ένα από τα δύο σύνολα (ή μόνο το $A$ ή μόνο το $B$ ).	
$x \in (A \cap B)'$	Συμπλήρωμα τομής	<b>Δεν</b> πραγματοποιούνται <b>συγχρόνως</b> τα ενδ. $A$ και $B$ .	
$x \in (A \cup B)'$	Συμπλήρωμα ένωσης	<b>Δεν</b> πραγματοποιείται <b>κανένα</b> από τα ενδ. $A$ και $B$ .	

Πίνακας 3.1: Πράξεις συνόλων



# ΚΕΦΑΛΑΙΟ

## ΑΝΑΛΥΣΗ

# 4

### 4.1 Συναρτήσεις

#### ΟΡΙΣΜΟΙ


##### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Συνάρτηση ονομάζεται η διαδικασία (αντιστοίχιση) με την οποία κάθε στοιχείο  $x$  ενός συνόλου  $A$  αντιστοιχεί σε **ένα μόνο** στοιχείο  $y$  ενός συνόλου  $B$ .

Συμβολίζεται με οποιοδήποτε γράμμα του λατινικού ή και του ελληνικού αλφαβήτου  $f, g, h, t, s, \sigma \dots$  και γράφουμε :

$$f : A \rightarrow B$$

Είναι η σχέση που συνδέει δύο μεταβλητές  $x, y$  όπου κάθε τιμή της πρώτης ( $x \in A$ ) αντιστοιχεί σε μόνο μια τιμή της δεύτερης ( $y \in B$ ).



Σχήμα 4.1: Συνάρτηση

- Η μεταβλητή  $x$  του συνόλου  $A$  ονομάζεται **ανεξάρτητη** ενώ η  $y$  **εξαρτημένη**.
- Το  $y$  ονομάζεται **τιμή** της  $f$  στο  $x$  και συμβολίζεται  $y = f(x)$ .
- Το σύνολο  $A$  λέγεται **πεδίο ορισμού** της συνάρτησης  $f$  και συμβολίζεται  $D_f$ .
- Το σύνολο με στοιχεία όλες της τιμές  $f(x)$  για κάθε  $x \in D_f$  λέγεται **σύνολο τιμών** της  $f$ , συμβολίζεται  $f(D_f)$  και ισχύει  $f(D_f) \subseteq B$ .
- Μια συνάρτηση συμβολίζεται επίσης με τους εξής τρόπους :

$$x \xrightarrow{f} f(x) \quad , \quad D_f \xrightarrow{f} f(D_f)$$

- Για το συμβολισμό της ανεξάρτητης μεταβλητής ή της συνάρτησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε γράμμα στη θέση του  $x$  ή του  $f$  αντίστοιχα.

$$f(x) \quad , \quad g(t) \quad , \quad h(s) \dots$$

- Για να ορίσουμε μια συνάρτηση θα πρέπει να γνωρίζουμε
  1. Το πεδίο ορισμού  $D_f$ .
  2. Το σύνολο  $B$ .
  3. Τον τύπο  $f(x)$  της συνάρτησης, για κάθε  $x \in D_f$ .
- Εάν τα σύνολα  $A, B$  είναι υποσύνολα του συνόλου των πραγματικών αριθμών τότε μιλάμε για **πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής**.

### ΕΙΔΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα βασικά είδη συναρτήσεων τον τύπο τους καθώς και το πεδίο ορισμού τους.

Είδος	Τύπος	Πεδίο Ορισμού
<b>Πολυωνυμική</b>	$f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$	$D_f = \mathbb{R}$
<b>Ρητή</b>	$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$
<b>Άρρητη</b>	$f(x) = \sqrt{A(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid A(x) \geq 0\}$
	$f(x) = \eta \mu x, \quad \sigma \upsilon \nu x$	$D_f = \mathbb{R}$
<b>Τριγωνομετρική</b>	$f(x) = \epsilon \varphi x$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \kappa \pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z}\}$
	$f(x) = \sigma \varphi x$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \kappa \pi, \kappa \in \mathbb{Z}\}$
<b>Εκθετική</b>	$f(x) = a^x, \quad a > 0$	$D_f = \mathbb{R}$
<b>Λογαριθμική</b>	$f(x) = \log x, \quad \ln x$	$D_f = (0, +\infty)$


*Πίνακας 4.1:* Είδη συναρτήσεων

### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.2 ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ - ΟΡΘΟΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων ονομάζεται το σχήμα που αποτελείται από δύο κάθετα τοποθετημένους μεταξύ τους άξονες αρίθμησης πάνω στους οποίους παίρνουν τιμές δύο μεταβλητές.

- Το σημείο τομής των δύο αξόνων ονομάζεται **αρχή των αξόνων**.
- Σε κάθε άξονα του συστήματος, επιλέγουμε αυθαίρετα ένα μήκος το οποίο ορίζουμε ως μονάδα μέτρησης.
- Εάν σε κάθε άξονα θέσουμε την ίδια μονάδα μέτρησης το σύστημα ονομάζεται **ορθοκανονικό**.
- Ο οριζόντιος άξονας ονομάζεται **άξονας τετμημένων** και συμβολίζεται με  $x'$ .

- Ο κατακόρυφος άξονας ονομάζεται **άξονας τεταγμένων** και συμβολίζεται με  $y'y$ .
- Κάθε σημείο του επιπέδου του συστήματος συντεταγμένων αντιστοιχεί σε ένα ζευγάρι αριθμών της μορφής  $(x, y)$ . Αντίστροφα, κάθε ζευγάρι αριθμών  $(x, y)$  αντιστοιχεί σε ένα σημείο του επιπέδου.
- Το ζεύγος αριθμών  $(x, y)$  ονομάζεται **διατεταγμένο** ζεύγος αριθμών διότι έχει σημασία η σειρά με την οποία γράφονται οι αριθμοί.
- Οι αριθμοί  $x, y$  ονομάζονται **συντεταγμένες** του σημείου στο οποίο αντιστοιχούν. Ο αριθμός  $x$  ονομάζεται **τετμημένη** του σημείου ενώ ο  $y$  **τεταγμένη**.
- Στον οριζόντιο άξονα  $x'x$ , δεξιά της αρχής των αξόνων, βρίσκονται οι θετικές τιμές της μεταβλητής  $x$  ενώ αριστερά, οι αρνητικές.
- Αντίστοιχα στον κατακόρυφο άξονα  $y'y$ , πάνω από την αρχή των αξόνων βρίσκονται οι θετικές τιμές της μεταβλητής  $y$ , ενώ κάτω οι αρνητικές τιμές.
- Οι άξονες χωρίζουν το επίπεδο σε τέσσερα μέρη τα οποία ονομάζονται **τεταρτημόρια**. Ως 1<sup>ο</sup> τεταρτημόριο ορίζουμε το μέρος εκείνο στο οποίο ανήκουν οι θετικοί ημιάξονες  $Ox$  και  $Oy$ .




Σχήμα 4.2: Ορθοκανονικό Σύστημα Συντεταγμένων

### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.3 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  ονομάζεται το σύνολο των σημείων του επιπέδου με συντεταγμένες

$$x \in A, \quad y = f(x)$$











- Συμβολίζεται με  $C_f$  και το σύνολο των σημείων της παριστάνει σχήμα.
- Τα σημεία της γραφικής παράστασης είναι της μορφής  $M(x, f(x))$ .
- Η εξίσωση  $y = f(x)$  είναι η εξίσωση της γραφικής παραστασης την οποία επαληθεύουν οι συντεταγμένες των σημείων της.
- Κάθε κατακόρυφη ευθεία  $\varepsilon \parallel y'y$  της μορφής  $x = \kappa$  τέμνει τη  $C_f$  σε ένα το πολύ σημείο.



Σχήμα 4.3: Γραφική παράσταση

### ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις μερικών βασικών συναρτήσεων καθώς και το είδος τους.

Συνάρτηση	Γρ. Παράσταση	Συνάρτηση	Γρ. Παράσταση
<b>Πολυωνυμική</b> $f(x) = ax + \beta$ $a, \beta \in \mathbb{R}$		<b>Πολυωνυμική</b> $f(x) = ax^2$ $a > 0$ — $a < 0$ ---	
<b>Πολυωνυμική</b> $f(x) = ax^3$ $a > 0$ — $a < 0$ ---		<b>Ρητή</b> $f(x) = \frac{a}{x}$ $a > 0$ — $a < 0$ ---	
<b>Τριγωνομετρική</b> $f(x) = \eta\mu x$		<b>Τριγωνομετρική</b> $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$	
<b>Τριγωνομετρική</b> $f(x) = \epsilon\varphi x$		<b>Λογαριθμική</b> $f(x) = \log_a x$ $a > 1$ — $0 < a < 1$ ---	
<b>Εκθετική</b> $f(x) = a^x$ $a > 1$ — $0 < a < 1$ ---		<b>Άρρητη</b> $f(x) = \sqrt{x}$	

Πίνακας 4.2: Γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων

**ΟΡΙΣΜΟΣ 4.4 ΑΡΤΙΑ - ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ****1. Άρτια συνάρτηση**

Άρτια ονομάζεται μια συνάρτηση  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  για την οποία ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες :



- $\forall x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$
- $f(-x) = f(x)$  ,  $\forall x \in D_f$

**2. Περιττή συνάρτηση**

Περιττή ονομάζεται μια συνάρτηση  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  για την οποία ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες :

- $\forall x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$
- $f(-x) = -f(x)$  ,  $\forall x \in D_f$

Η γραφική παράσταση μιας άρτιας συνάρτησης είναι συμμετρική ως προς τον κατακόρυφο άξονα  $y'y$  ενώ η γραφική παράσταση μιας περιττής συνάρτησης είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων.

**ΑΡΤΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ****Σχήμα 4.4:** Άρτια συνάρτηση**ΠΕΡΙΤΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ****Σχήμα 4.5:** Περιττή συνάρτηση**ΟΡΙΣΜΟΣ 4.5 ΙΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ**

Δύο συναρτήσεις  $f, g$  ονομάζονται ίσες εαν

- έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού δηλαδή  $D_f = D_g$  και ισχύει
- $f(x) = g(x)$  ,  $\forall x \in D_f, D_g$ .

**ΟΡΙΣΜΟΣ 4.6 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ**

Αν  $f, g$  δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού  $D_f, D_g$  αντίστοιχα τότε οι πράξεις μεταξύ των δύο συναρτήσεων ορίζονται ως εξής.

Τύπος	Πεδίο ορισμού
$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_{f+g} = \{x \in \mathbb{R}   x \in D_f \cap D_g\}$
$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$D_{f-g} = \{x \in \mathbb{R}   x \in D_f \cap D_g\}$
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$	$D_{f \cdot g} = \{x \in \mathbb{R}   x \in D_f \cap D_g\}$
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$D_{\frac{f}{g}} = \{x \in \mathbb{R}   x \in D_f \cap D_g \text{ και } g(x) \neq 0\}$

**Πίνακας 4.3:** Πράξεις συναρτήσεων

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.7 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ


Έστω  $f, g$  δύο συναρτήσεις με πεδία ορισμού  $D_f, D_g$  αντίστοιχα. Σύνθεση της  $f$  με την  $g$  ονομάζεται η συνάρτηση  $g \circ f$  με τύπο

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

και πεδίο ορισμού το σύνολο των στοιχείων του πεδίου ορισμού  $D_f$  της συνάρτησης  $f$  των οποίων οι τιμές ανήκουν στο πεδίο ορισμού  $D_g$  της συνάρτησης  $g$ .

$$D_{g \circ f} = \{x \in \mathbb{R} | x \in D_f \text{ και } f(x) \in D_g\}$$

Με τη σύνθεση  $g \circ f$ , κάθε τιμή της μεταβλητής  $x$  αντιστοιχεί σε μια μόνο τιμή της  $f(x)$  η οποία με τη σειρά της αντιστοιχεί σε μια μόνο τιμή της  $g(f(x))$ .



**Σχήμα 4.6:** Σύνθεση συναρτήσεων

- Η σύνθεση  $g \circ f$  ορίζεται αν  $f(D_f) \cap D_g \neq \emptyset$ .
- Η σύνθεση της  $g$  με την  $f$  συμβολίζεται αντίστοιχα με  $f \circ g$ , έχει τύπο  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$  και πεδίο ορισμού  $D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R} | x \in D_g \text{ και } g(x) \in D_f\}$ .

## 4.2 Όρια - Συνέχεια

## ΟΡΙΣΜΟΙ

### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.8 ΟΡΙΟ

Όριο μιας συνάρτησης  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  σε ένα σημείο  $x_0$  ονομάζεται η προσέγγιση της μεταβλητής  $f(x)$  καθώς το  $x$  πλησιάζει την τιμή  $x_0$ . Συμβολίζεται με

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

Το όριο μιας συνάρτησης, αν υπάρχει, μπορεί να είναι πραγματικός αριθμός ή  $\pm\infty$ .

### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.9 ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΟΡΙΑ

#### 1. Όριο από αριστερά

Όριο από αριστερά μιας συνάρτησης  $f$  στο  $x_0$  ονομάζεται το όριο της καθώς το πλησιάζει την τιμή  $x_0$  από τιμές μικρότερες αυτής. Συμβολίζεται

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

#### 2. Όριο από δεξιά

Όριο από δεξιά μιας συνάρτησης  $f$  στο  $x_0$  ονομάζεται το όριο της καθώς το πλησιάζει την τιμή  $x_0$  από τιμές μεγαλύτερες αυτής. Συμβολίζεται

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.10 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ

Μια συνάρτηση  $f$  ονομάζεται συνεχής σε ένα σημείο  $x_0$  του πεδίου ορισμού της όταν το όριο της στο  $x_0$  είναι ίσο με την τιμή της στο σημείο αυτό. Δηλαδή

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.11 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ

#### 1. Συνέχεια σε ανοιχτό διάστημα

Μια συνάρτηση  $f$  ονομάζεται συνεχής σε ένα ανοιχτό διάστημα  $(a, \beta)$  εαν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του διαστήματος.

#### 2. Συνέχεια σε κλειστό διάστημα

Μια συνάρτηση  $f$  ονομάζεται συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα  $[a, \beta]$  εαν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του ανοιχτού διαστήματος  $(a, \beta)$  και επιπλέον ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ και } \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$$

#### 3. Συνέχεια σε σύνολο

Μια συνάρτηση  $f$  θα λέμε ότι είναι συνεχής εαν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της.

**ΟΡΙΣΜΟΣ 4.12 ΜΟΝΟΤΟΝΗ - ΓΝΗΣΙΩΣ ΜΟΝΟΤΟΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ****1. Αύξουσα**

Μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$  ονομάζεται γνησίως αύξουσα στο  $\Delta$  εαν για κάθε ζεύγος αριθμών  $x_1, x_2 \in \Delta$  με  $x_1 < x_2$  ισχύει

$$f(x_1) \leq f(x_2)$$

**2. Φθίνουσα**

Μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$  ονομάζεται γνησίως φθίνουσα στο  $\Delta$  εαν για κάθε ζεύγος αριθμών  $x_1, x_2 \in \Delta$  με  $x_1 < x_2$  ισχύει

$$f(x_1) \geq f(x_2)$$

**3. Γνησίως αύξουσα**

Μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$  ονομάζεται γνησίως αύξουσα στο  $\Delta$  εαν για κάθε ζεύγος αριθμών  $x_1, x_2 \in \Delta$  με  $x_1 < x_2$  ισχύει

$$f(x_1) < f(x_2)$$

**4. Γνησίως φθίνουσα**

Μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$  ονομάζεται γνησίως φθίνουσα στο  $\Delta$  εαν για κάθε ζεύγος αριθμών  $x_1, x_2 \in \Delta$  με  $x_1 < x_2$  ισχύει

$$f(x_1) > f(x_2)$$

Μια συνάρτηση αύξουσα ή φθίνουσα, χαρακτηρίζεται ως **μονότονη**, ενώ μια γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα συνάρτηση ως **γνησίως μονότονη**. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αφορούν τη **μονοτονία** μιας συνάρτησης.

## ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

**ΘΕΩΡΗΜΑ 4.1 ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΟΡΙΑ**

Το όριο μιας συνάρτησης  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  σε ένα σημείο  $x_0$  υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός  $\uparrow \in \mathbb{R}$  αν και μόνο αν τα πλευρικά όρια της  $f$  στο  $x_0$  είναι ίσα με  $\uparrow$ .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \uparrow \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \uparrow$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 4.2 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ**

Εαν οι συναρτήσεις  $f, g$  είναι συνεχείς σε ένα κοινό σημείο  $x_0$  των πεδίων ορισμού τους τότε και οι συναρτήσεις

$$f + g, f - g, c \cdot f, f \cdot g, \frac{f}{g}, |f|, f^\nu \text{ και } \sqrt[\nu]{f}$$



είναι συνεχείς στο σημείο  $x_0$  εφόσον ορίζονται στο σημείο αυτό.

### ΘΕΩΡΗΜΑ 4.3 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Εαν η συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής σε ένα σημείο  $x_0$  και η συνάρτηση  $g$  είναι συνεχής στο σημείο  $f(x_0)$  η σύνθεση τους  $g \circ f$  είναι συνεχείς στο σημείο  $x_0$ .

### ΘΕΩΡΗΜΑ 4.4 ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO

Αν μια συνάρτηση  $f$ , ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα  $[a, \beta]$  είναι :

- συνεχής στο  $[a, \beta]$  και, επιπλέον, ισχύει
- $f(a) \cdot f(\beta) < 0$ .

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον,  $x_0 \in (a, \beta)$  τέτοιο, ώστε

$$f(x_0) = 0$$

### ΘΕΩΡΗΜΑ 4.5 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ BOLZANO

- Αν μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα διάστημα  $\Delta$  δεν μηδενίζεται πουθενά στο  $\Delta$  τότε αυτή θα διατηρεί το πρόσημό της στο διάστημα αυτό.

$$\text{Αν } f(x) \neq 0, \forall x \in \Delta \Rightarrow \begin{cases} f(x) > 0 & \forall x \in \Delta \\ f(x) < 0 & \forall x \in \Delta \end{cases}$$

Επιπλέον, αν  $\exists a \in \Delta$  ώστε  $f(a) > 0$  ή  $f(a) < 0$  τότε  $f(x) > 0$ ,  $\forall x \in \Delta$  ή  $f(x) < 0$ ,  $\forall x \in \Delta$  αντίστοιχα.


- Αν  $\rho_1, \rho_2$  είναι δύο διαδοχικές ρίζες μιας συνάρτησης  $f$  τότε αυτή διατηρεί το πρόσημό της στο διάστημα μεταξύ των ριζών.

### ΘΕΩΡΗΜΑ 4.6 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ BOLZANO

Αν μια συνάρτηση  $f$  ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα  $[a, \beta]$  είναι

- συνεχής στο  $[a, \beta]$  και, επιπλέον, ισχύει
- $f(a) \cdot f(\beta) < 0$ .

τότε η γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f$  τέμνει τον οριζόντιο άξονα  $x'x$  σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη  $x_0 \in (a, \beta)$ .



Σχήμα 4.7: Θεώρημα Bolzano

### ΘΕΩΡΗΜΑ 4.7 ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ


Εστω μια συνάρτηση  $f$ , η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα  $[a, \beta]$ . Αν :

- η  $f$  είναι συνεχής στο  $(a, \beta)$  και
- $f(a) \neq f(\beta)$

τότε, για κάθε αριθμό  $\eta$  μεταξύ των  $f(a)$  και  $f(\beta)$  υπάρχει ένας, τουλάχιστον  $x_0 \in (a, \beta)$  τέτοιος ώστε

$$f(x_0) = \eta$$

Το Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών αποτελεί γενίκευση του Θεωρήματος Bolzano.



Σχήμα 4.8: Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 4.8 ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Αν  $f$  είναι μια συνεχής συνάρτηση στο  $[a, \beta]$ , τότε η  $f$  παίρνει στο  $[a, \beta]$  μια **μέγιστη** τιμή  $M$  και μια **ελάχιστη** τιμή  $m$ .

Υπάρχουν δηλαδή  $x_1, x_2 \in [a, \beta]$  έτσι ώστε αν  $f(x_1) = m$  και  $f(x_2) = M$  να ισχύει :

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{για κάθε } x \in [a, \beta]$$

## 4.3 Διαφορικός Λογισμός

### ΟΡΙΣΜΟΙ

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.13 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ

Παράγωγος μιας συνάρτησης  $f$  στο σημείο  $x_0 \in D_f$  του πεδίου ορισμού της, ονομάζεται το όριο

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Συμβολίζεται με  $f'(x_0)$  και θα λέμε ότι η  $f$  είναι **παραγωγίσιμη** στο  $x_0$  αν το όριο της παραγώγου υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός.

Έχουμε δηλαδή

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- Το κλάσμα  $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  ονομάζεται **λόγος μεταβολής** της  $f$ .

- Θέτοντας  $h = x - x_0$  η παράγωγος της  $f$  στο σημείο  $x_0$  μετασχηματίζεται ως εξής


$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Η παράγωγος μιας συνάρτησης  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  σε ένα σημείο  $x_0 \in D_f$  παριστάνει το **συντελεστή διεύθυνσης** της εφαπτόμενης ευθείας στο σημείο επαφής  $M_0(x_0, f(x_0))$ .

$$\lambda = f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \varepsilon\varphi\varphi$$

Είναι ίση με την εφαπτομένη της γωνίας  $\varphi$  που σχηματίζει η εφαπτόμενη ευθεία  $\varepsilon$  με τον οριζόντιο άξονα  $x'x$ .



Σχήμα 4.9: Παράγωγος σε σημείο

Όσο πλησιάζει το  $x$  στο  $x_0$  τόσο αλλάζει η θέση του τυχαίου σημείου  $M$  ώστε να τείνει να ταυτιστεί με το  $M_0$ . Τότε η ευθεία  $MM_0$  τείνει να γίνει εφαπτόμενη στο σημείο  $M_0(x_0, f(x_0))$ .

## 4.4 Ολοκληρωτικός Λογισμός

### ΟΡΙΣΜΟΙ

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.15 ΑΡΧΙΚΗ Η ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Αρχική συνάρτηση ή παράγουσα συνάρτηση μιας συνάρτησης  $f$  ορισμένης σε ένα διάστημα  $\Delta$ , ονομάζεται κάθε παραγωγίσιμη συνάρτηση  $F$  για την οποία ισχύει

$$F'(x) = f(x) \quad , \quad \text{για κάθε } x \in \Delta$$

**ΟΡΙΣΜΟΣ 4.16 ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ**

Αόριστο ολοκλήρωμα μιας συνάρτησης  $f$  ονομάζεται το σύνολο όλων των αρχικών συναρτήσεων της  $f$  σε ένα διάστημα  $\Delta$ . Συμβολίζεται  $\int f(x)dx$  και ισχύει

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

όπου  $F$  είναι μια παράγουσα της  $f$  και  $c \in \mathbb{R}$ .


**ΟΡΙΣΜΟΣ 4.17 ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ**

Ορισμένο ολοκλήρωμα, μιας συνεχούς συνάρτησης  $f$  από το  $a$  ως το  $\beta$  ονομάζεται το όριο

$$\lim_{v \rightarrow \infty} \left( \sum_{\kappa=1}^v f(\xi_{\kappa}) \Delta x \right)$$

το οποίο συμβολίζεται με  $\int_a^{\beta} f(x)dx$  και για το οποίο έχουμε ότι :

- $\Delta x$  είναι το μήκος καθενός από τα ισομήκη  $v$  υποδιαστήματα, στα οποία χωρίσαμε το διάστημα  $[a, \beta]$  και ισχύει  $\Delta x = \frac{\beta-a}{v}$ .
- Τα  $v$  σημεία στα οποία χωρίστηκε το διάστημα  $[a, \beta]$  είναι  $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{v-1}, x_v = \beta$ .
- $f(\xi_{\kappa})$  είναι η τιμή ενός τυχαία επιλεγμένου σημείου  $\xi_{\kappa}$  σε καθένα από τα διαστήματα  $[x_{\kappa}, x_{\kappa+1}]$  με  $\kappa = 1, 2, \dots, v$ .
- Το γινόμενο  $f(\xi_{\kappa})\Delta x$  εκφράζει το εμβαδόν καθενός ορθογώνιου με διαστάσεις  $\Delta x$  και  $f(\xi_{\kappa})$ .



**Σχήμα 4.10:** Ορισμένο Ολοκλήρωμα

- Αθροίζοντας τα εμβαδά των ορθογώνιων και υπολογίζοντας το όριο του αθροίσματος για  $v \rightarrow \infty$  προκύπτει το ορισμένο ολοκλήρωμα της  $f$  από το  $a$  στο  $\beta$ .


$$S_v = \sum_{\kappa=1}^v f(\xi_{\kappa}) \Delta x, \quad \lim_{v \rightarrow \infty} S_v = \int_a^{\beta} f(x)dx$$

Κατά συνέπεια, το ορισμένο ολοκλήρωμα δηλώνει άθροισμα απείρων εμβαδών. Το άθροισμα  $S_n$  ονομάζεται άθροισμα Riemann.

- Οι αριθμοί  $a$  και  $\beta$  ονομάζονται **άκρα ολοκλήρωσης**.
- Στον τύπο  $\int_a^\beta f(x)dx$  του ολοκληρώματος, η μεταβλητή  $x$  ονομάζεται **βουβή μεταβλητή**, έννοια η οποία δηλώνει ότι μπορεί να αντικατασταθεί με οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή, χωρίς να αλλοιωθεί το ολοκλήρωμα.
- Η έκφραση  $dx$  μας δείχνει τη μεταβλητή ολοκλήρωσης.

#### ΟΡΙΣΜΟΣ 4.18 ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΙΟΥ

Έστω  $f : [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  μια συνεχής συνάρτηση. Αν  $f(x) \geq 0$  για κάθε  $x \in [a, \beta]$ , το εμβαδόν του χωρίου  $\Omega$ , που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης συνάρτησης  $f$ , του άξονα  $x'x$  και των κατακόρυφων ευθειών  $x = a$ ,  $x = \beta$  ορίζεται να είναι το ορισμένο ολοκλήρωμα της  $f$  από το  $a$  στο  $\beta$ .



Σχήμα 4.11: Εμβαδόν χωρίου

### ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ - ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

#### ΘΕΩΡΗΜΑ 4.9 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Αν  $f : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  μια συνεχής συνάρτηση και  $a \in \Delta$  ένα τυχαίο σημείο του πεδίου ορισμού, τότε η συνάρτηση

$$F(x) = \int_a^x f(u)du, \quad x \in \Delta$$

είναι μια αρχική συνάρτηση της  $f$  στο  $\Delta$ .

- Το άνω άκρο του ολοκληρώματος μας δίνει τη μεταβλητή  $x$  της συνάρτησης, η οποία είναι και μεταβλητή παραγώγισης.

- Η μεταβλητή  $u$  είναι η μεταβλητή ολοκλήρωσης. Ως βουβή μεταβλητή του ολοκληρώματος, μπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη, εκτός της  $x$  η οποία είναι μεταβλητή της συνάρτησης  $F$ .

**ΘΕΩΡΗΜΑ 4.10 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Έστω  $f$  μια συνεχής συνάρτηση στο διάστημα  $[a, \beta]$ . Αν  $G$  είναι μια παράγουσα της  $f$  στο  $[a, \beta]$  τότε ισχύει

$$\int_a^\beta f(x)dx = G(\beta) - G(a)$$

**ΘΕΩΡΗΜΑ 4.11 Θ.Μ.Τ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Αν μια συνάρτηση  $f : [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$  είναι συνεχής στο διάστημα  $[a, \beta]$  τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον  $\xi \in (a, \beta)$  έτσι ώστε

$$\int_a^\beta f(x)dx = f(\xi)(\beta - a)$$

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ**





# Ευρετήριο

Συμβολς

## Άλγεβρα

Άθροισμα .....	2
Άρρητοι αριθμοί .....	1
Άρτιος - περιττός αριθμός .....	1
Άξονας των αριθμών .....	4
Αφαίρεση .....	2
Αφαιρετέος .....	2
Ακέραιοι αριθμοί .....	1
Αντίθετοι αριθμοί .....	2
Απόλυτη τιμή .....	4
Απόλυτη τιμή διαφοράς .....	4
Αρνητικός αριθμός .....	2
Βάση δύναμης .....	6
Δύναμη αριθμού .....	6
Δεκαδικό σύστημα .....	1
Διάστημα .....	5
Άκρα διαστήματος .....	5
Ακτίνα διαστήματος .....	5
Ανοιχτό διάστημα .....	5
Κέντρο διαστήματος .....	5
Κλειστό διάστημα .....	5
Διάταξη .....	4
Διαφορά .....	2
Διαιρέτης .....	3
Διαιρέτης φυσικού αριθμού .....	3
Διαιρετέος .....	3
Ε.Κ.Π. ....	3
Εκθέτης δύναμης .....	6
Ετερόσημοι .....	2
Ευκλείδεια διαίρεση .....	3
Φυσικοί αριθμοί .....	1
Γινόμενο .....	2
Θετικός αριθμός .....	2
Μ.Κ.Δ. ....	3
Μεγαλύτερος - μικρότερος .....	6
Μειωτέος .....	2
N-οστή ρίζα .....	6
Ομόσημοι .....	2

Παράγοντες .....	2
Περιττός αριθμός .....	1
Πηλίκο .....	3
Πολλαπλάσιο .....	3
Πολλαπλασιασμός .....	2
Πρόσημα .....	2
Πρόσθεση .....	2
Πρώτος αριθμός .....	4
Πρώτοι αριθμοί μεταξύ τους .....	4
Πραγματικοί αριθμοί .....	1
Προσθετέοι .....	2
Ρητοί αριθμοί .....	1
Σύνθετος αριθμός .....	4
Σειρά πράξεων .....	6
Τέλεια διαίρεση .....	3
Ταυτότητα ευκλείδειας διαίρεσης ...	3
Τετραγωνική ρίζα .....	6
Υπόλοιπο .....	3
Υπόριζο .....	6



# Βιβλιογραφία

- [1] Γ. Μπούσγος. *Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου, Τόμος πρώτος*. ΟΕΒΔ, 1978.
- [2] Θ. Βαβαλετσκος Γ. Μπούσγος. *Μαθηματικά Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - Τριγωνομετρία*. ΟΕΒΔ, 1978.
- [3] Θ. Βαβαλετσκος Γ. Μπούσγος. *Μαθηματικά Δ΄ Γυμνασίου, Τόμος πρώτος*. ΟΕΒΔ, 1978.
- [4] Ν. Αλεξανδρή Δ. Παπακωνσταντίνου Α. Παπαμικρούλης Ν. Βαρουχάκης, Δ. Αδαμόπουλος. *Μαθηματικά Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα*. ΟΕΒΔ, 1978.
- [5] Ηλία Ντζιώρα. *Μαθηματικά Ε΄ Γυμνασίου, Τόμος πρώτος*. ΟΕΒΔ, 1976.
- [6] Ηλία Ντζιώρα. *Μαθηματικά Β΄ Λυκείου, Άλγεβρα*. ΟΕΒΔ, 1979.



# Κατάλογος Σχημάτων

1.1	Ευθεία των αριθμών . . . . .	5
1.2	Απόλυτη τιμή . . . . .	5
1.3	Μετατροπές μονάδων μέτρησης μήκους . . . . .	10
1.4	Μετατροπές μονάδων μέτρησης επιφάνειας . . . . .	11
1.5	Μετατροπές μονάδων μέτρησης όγκου . . . . .	11
1.6	Μετατροπές μονάδων μέτρησης μάζας . . . . .	12
1.7	Μετατροπές μονάδων μέτρησης χρόνου . . . . .	13
1.8	Δυνάμεις μελών ανίσωσης . . . . .	19
1.9	Γραμμική εξίσωση . . . . .	32
1.10	Λύσεις εξίσωσης $x^y = a$ . . . . .	36
1.11	Λύσεις εξίσωσης $x^y = a^y$ . . . . .	37
1.12	Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας . . . . .	40
1.13	Τριγωνομετρικοί αριθμοί σε σύστημα συντεταγμένων . . . . .	41
1.14	Τριγωνομετρικός κύκλος . . . . .	43
1.15	Βασικές γωνίες . . . . .	43
1.16	Παραπληρωματικές γωνίες . . . . .	44
1.17	Γωνίες με διαφορά $180^\circ$ . . . . .	45
1.18	Αντίθετες γωνίες - Γωνίες με άθροισμα $360^\circ$ . . . . .	45
1.19	Συμπληρωματικές γωνίες . . . . .	46
1.20	Συμπληρωματικές γωνίες . . . . .	46
1.21	Γωνίες με διαφορά $k \cdot 360^\circ$ . . . . .	46
1.22	Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος και διαφοράς γωνιών . . . . .	47
1.23	Μιγαδικό επίπεδο - Εικόνα μιγαδικού . . . . .	53
1.24	Εικόνες συζυγή, αντίθετου και συζυγή του αντίθετου . . . . .	53
1.25	Γινόμενο πινάκων . . . . .	57
2.1	Σημείο . . . . .	61
2.2	Ευθεία γραμμή . . . . .	62
2.3	Ημιευθεία . . . . .	62
2.4	Αντικείμενες ημιευθείες . . . . .	62
2.5	Ευθύγραμμο τμήμα . . . . .	62
2.6	Μέσο τμήματος . . . . .	62
3.1	Ένωση . . . . .	64
3.2	Τομή . . . . .	64
3.3	Συμπλήρωμα . . . . .	64
3.4	Διαφορά συνόλων . . . . .	64
4.1	Συνάρτηση . . . . .	67

4.2	Ορθοκανονικό Σύστημα Συντεταγμένων . . . . .	69
4.3	Γραφική παράσταση . . . . .	69
4.4	Άρτια συνάρτηση . . . . .	71
4.5	Περιττή συνάρτηση . . . . .	71
4.6	Σύνθεση συναρτήσεων . . . . .	72
4.7	Θεώρημα Bolzano . . . . .	75
4.8	Θεώρημα ενδιάμεσων τιμών . . . . .	76
4.9	Παράγωγος σε σημείο . . . . .	77
4.10	Ορισμένο Ολοκλήρωμα . . . . .	78
4.11	Εμβαδόν χωρίου . . . . .	79

# Κατάλογος Πινάκων

1.1	Ψηφία ακέραιου αριθμού . . . . .	2
1.2	Βασικές πράξεις . . . . .	3
1.3	Διαστήματα αριθμών . . . . .	6
1.4	Ψηφία δεκαδικού αριθμού . . . . .	9
1.5	Μονάδες μέτρησης μήκους . . . . .	10
1.6	Μονάδες μέτρησης επιφάνειας . . . . .	10
1.7	Μονάδες μέτρησης όγκου . . . . .	11
1.8	Μονάδες μέτρησης μάζας . . . . .	11
1.9	Μονάδες μέτρησης χρόνου . . . . .	12
1.10	Κανόνες διαιρερότητας . . . . .	14
1.11	Κανόνες διαιρερότητας . . . . .	16
1.12	Ιδιότητες διάταξης . . . . .	16
1.13	Ιδιότητες δυνάμεων . . . . .	21
1.14	Ιδιότητες απόλυτης τιμής . . . . .	21
1.15	Ιδιότητες ριζών . . . . .	22
1.16	Ιδιότητες αναλογιών . . . . .	23
1.17	Λύσεις εξίσωσης 1 <sup>ου</sup> βαθμού . . . . .	35
1.18	Λύσεις εξίσωσης 2 <sup>ου</sup> βαθμού . . . . .	37
1.19	Είδη λύσεων εξίσωσης 2 <sup>ου</sup> βαθμού . . . . .	39
1.20	Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών . . . . .	42
3.1	Πράξεις συνόλων . . . . .	66
4.1	Είδη συναρτήσεων . . . . .	68
4.2	Γραφικές παραστάσεις βασικών συναρτήσεων . . . . .	70
4.3	Πράξεις συναρτήσεων . . . . .	72