Διαίρεση πολυωνύμων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαίρεση πολυωνύμων

1. Για καθεμία από τις παρακάτω διαιρέσεις, να βρεθεί, με κάθετη διαίρεση, το πηλίκο και το υπόλοιπο. Στη συνέχεια να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

$$\alpha$$
. $(x^3 - 4x^2 + 5x - 12) : (x^2 + 2x + 3)$

$$\beta$$
. $(x^3 + 7x^2 - 8x + 4) : (x^2 - x)$

$$\gamma$$
. $(2x^3 + x^2 + 3x - 9) : (x^2 - 3)$

$$\delta. (x^3 + 5x^2 - 11x + 10) : (x + 2)$$

$$\epsilon$$
. $(x^4 - 2x^3 + 5x^2 + 4x - 8) : (x^2 + 4x - 2)$

στ.
$$(x^4 - 2x^2 + 3x + 2) : (x^2 - 3x - 5)$$

$$\zeta. (x^4 + x - +8) : (x - 4)$$

$$\eta. (2x^4 + 6x^3 - 5x^2 + x + 7) : (2x^2 + 7)$$

2. Για καθεμία από τις παρακάτω διαιρέσεις, να βρεθεί, με τη χρήση του σχήματος Horner, το πηλίκο και το υπόλοιπο. Στη συνέχεια να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

$$\alpha$$
. $(x^3 + 3x^2 + 4x - 2) : (x - 1)$

$$\beta. (x^3 + 9x^2 + 2x - 8) : (x - 2)$$

$$\gamma$$
. $(x^3 + 4x^2 - 7x + 10)$: $(x + 3)$

$$\delta. \left(2x^3 - 5x^2 + 8x + 4\right) : (x+2)$$

$$\epsilon. (x^3 + x - 2) : (x + 1)$$

στ.
$$(x^4 + 6x^2 + 4)$$
: $(x - 1)$

$$\zeta. \left(x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 7x + 8 \right) : (x - 4)$$

$$\eta. \left(2x^4 - 9x^3 - 4x + 5\right) : (x+2)$$

📕 Βασικά θεωρήματα

3. Δίνεται το πολυώνυμο

$$P(x) = x^3 - 4x^2 + 5x - 2$$

Να εξετάσετε ποιο από τα παρακάτω πολυώνυμα είναι παράγοντας του P(x).

$$\alpha$$
. $x-1$

$$\beta$$
. $x + 2$

$$\beta$$
. $x + 2$ γ . $x - 3$ δ . $x - 2$

$$\delta$$
. $x-2$

4. Δίνεται το πολυώνυμο

$$P(x) = (\lambda - 1)x^3 - 5x^2 + (\lambda^2 - 2)x + 8$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου λ για την οποία το πολυώνυμο έχει παράγοντα το x-2.
- β. Να βρεθούν οι τιμές της μεταβλητής x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης P(x) βρίσκεται πάνω από τον άξονα x'x.
- γ. Να βρεθούν οι τιμές της παραμέτρου λ για τις οποίες το πολυώνυμο P(x) αν διαιρεθεί με το x-1 δίνει υπόλοιπο 2.

Τράπεζα Θεμάτων - ΙΕΠ

5. Θέμα 2 - 15643

Δίνεται το πολυώνυμο

$$P(x) = 2x^3 - 3x^3 - 11x + 6$$

- Να δείξετε ότι το πολυώνυμο P(x) έχει α. παράγοντα το x-3.
 - ii. Να γράψετε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης P(x):(x-3).
- β. Να δείξετε ότι το πολυώνυμο P(x) έχει παράγοντα το (x - 3)(2x - 1).