

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή	Σελίδα 1
1.1 Βασικές έννοιες	1
1.2 Ταξινόμηση διαφορικών εξισώσεων	1
1.3 Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών	4

Κεφάλαιο 2

Διαφορικές εξισώσεις 1 ^{ης} τάξης	Σελίδα 9
2.1 Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών	9
2.2 Πλήρεις διαφορικές εξισώσεις	12
2.3 Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις	19
2.4 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις	19
2.5 Εξισώσεις Bernoulli - Ricatti	22
2.6 Περιοδικές εξισώσεις	25
2.7 Ιδιάζουσες λύσεις	26
2.8 Μέθοδος ολοκλήρωσης με παραγωγή	26
2.9 Αντικατάσταση	27

Κεφάλαιο 3

Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης	Σελίδα 29
3.1 Γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές	29
3.2 Εξίσωση Euler	29
3.3 Υποβιβασμός τάξης	29
3.4 Ολοκληρωτική καμπύλη	29
3.5 Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις	29
3.6 Ομογενείς εξισώσεις	29
3.7 Θεωρήματα διαχωρισμού και σύγκρισης Sturm	29
3.8 Μη ομογενείς εξισώσεις	29
3.9 Μέθοδος Lagrange	29
3.10 Δυναμοσειρές	29

Κεφάλαιο 4

Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις	Σελίδα 31
4.1 Ομογενείς εξισώσεις	31
4.2 Γραμμική ανεξαρτησία - Ορίζουσα Wronski	33
4.3 Βασικά σύνολα λύσεων	33
4.4 Υποβιβασμός τάξης	33
4.5 Μη ομογενείς εξισώσεις - Μερικές λύσεις	33
4.6 Μέθοδος μεταβολής σταθερών	33

4.7	Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές	33
4.8	Εξισώσεις με μεταβλητούς συντελεστές	33
4.9	Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις και συζυγείς	33
4.10	Μέθοδος απροσδιόριστων συντελεστών	33
4.11	Μετασχηματισμός $Y' = gY$	33
4.12	Δυναμοσειρές	33
4.13	Ειδικές συναρτήσεις	33
4.14	Μέθοδος μεταβολής σταθερών	33
4.15	Μέθοδος διαφορικών τελεστών	33
4.16	Μέθοδος προσδιορισμού συντελεστών	33
4.17	Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών	33
4.18	Sturm - Liouville	33

Κεφάλαιο 5

Συστήματα διαφορικών εξισώσεων

Σελίδα 35

5.1	Ομογενή γραμμικά συστήματα	35
5.2	Πίνακες λύσεων - Τύπος Jacobi	36
5.3	Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας - Ανάλυση πινάκων	36
5.4	Βασικοί πίνακες - Σύνολα λύσεων	36
5.5	Υποβιβασμός τάξης	36
5.6	Μη ομογενή γραμμικά συστήματα - Μερικές λύσεις	36
5.7	Ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές	36
5.8	Μέθοδος απαλοιφής	36
5.9	Ευστάθεια συστημάτων	36
5.10	Μέθοδος πινάκων	36
5.11	Πρώτα ολοκληρώματα	36
5.12	Γεωμετρικές ερμηνείες συστημάτων διαφορικών εξισώσεων	36
5.13	Διαφορικοί τελεστές	36
5.14	Μέθοδος εκθετικής αντικατάστασης	36
5.15	Μέθοδος κανονικών συντεταγμένων	36
5.16	Μέθοδος τελεστή εξέλιξης	36

Εισαγωγή

1.1 Βασικές έννοιες

...

Σε μια διαφορική εξίσωση ο σκοπός είναι η εύρεση μιας άγνωστης συνάρτησης y , μίας ή περισσότερων μεταβλητών.

Ορισμός 1.1 : Διαφορική εξίσωση

Έστω μια παραγωγίσιμη συνάρτηση y . Διαφορική ονομάζεται κάθε εξίσωση που περιέχει την άγνωστη συνάρτηση y και τις παραγώγους αυτής.

1.2 Ταξινόμηση διαφορικών εξισώσεων

Οι διαφορικές εξισώσεις χωρίζονται αρχικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Οι μεν **συνήθεις** διαφορικές εξισώσεις (ΣΔΕ) περιέχουν άγνωστη συνάρτηση y μιας ανεξάρτητης μεταβλητής x καθώς και παραγώγους αυτής. Η **γενική** ή **πεπλεγμένη** μορφή της είναι

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1.1)$$

όπου $y^{(n)} = \frac{d^n y}{dx^n}$ η συνήθης παράγωγος n -οστής τάξης. Αν η δομή της εξίσωσης είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει να γραφτεί η παράγωγος μέγιστης

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 1.1 Βασικές έννοιες
- 1.2 Ταξινόμηση διαφορικών εξισώσεων
- 1.3 Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών

τάξης συναρτήσει των υπολοίπων παραγώγων και της συνάρτησης y τότε έχουμε τη λεγόμενη **λυμένη ή άμεση** μορφή:

$$y^{(v)} = f(x, y, y', \dots, y^{(v-1)})$$

Οι δε **μερικές** διαφορικές εξισώσεις (ΜΔΕ) περιέχουν άγνωστη συνάρτηση u πολλών μεταβλητών καθώς και μερικές παραγώγους αυτής. Για παράδειγμα η διαφορική εξίσωση

$$x^2 y'' - \sin xy' + xy = e^x$$

είναι μια συνήθης διαφορική εξίσωση ενώ η

$$u_{xx} - cu_y + u_{yy} = 0$$

αποτελεί μερική διαφορική εξίσωση, όπου $u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $u_y = \frac{\partial u}{\partial y}$ και $u_{yy} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ οι μερικές παράγωγοι της συνάρτησης $u(x, y)$. Στο βιβλίο αυτό θα μας απασχολήσουν κατά κύριο λόγο οι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις και οι μέθοδοι επίλυσής τους.

► **Παράδειγμα 1.1 :** Ταξινόμηση διαφορικών εξισώσεων
Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες διαφορικές εξισώσεις ως συνήθεις ή μερικές.

α. $y' + 2y = x$

δ. $y' = 3y - x^2$

β. $yy' = e^x$

ε. $u_{xx} = c^2 u_t$

γ. $u_x + u_y = 0$

στ. $(x + 1) dx + \cos y dy = 0$

✓ ΛΥΣΗ

Σύμφωνα με τις βασικές έννοιες που δώσαμε προηγουμένως, οι εξισώσεις α., β., δ. και στ. είναι ΣΔΕ, με την στ. να περιέχει την παράγωγο της συνάρτησης y στη διαφορική μορφή της, ενώ οι γ. και ε. είναι ΜΔΕ. Για κάθε είδος εξίσωσης θα μας απασχολήσουν επίσης έννοιες όπως η **τάξη** και ο **βαθμός** μιας διαφορικής εξίσωσης. Στο εξής οι έννοιες και οι ορισμοί που θα δώσουμε θα αφορούν αποκλειστικά τις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις.

❗ Παρατήρηση

Για μια διαφορική εξίσωση ορίζεται βαθμός εφόσον οι όροι της μπορούν να γραφτούν σε πολυωνυμική μορφή ως προς την άγνωστη συνάρτηση y .

Ορισμός 1.2 : Τάξη και βαθμός Δ.Ε.

- Τάξη μιας διαφορικής εξίσωσης ονομάζεται η μεγαλύτερη τάξη παραγώγου που περιέχεται στην εξίσωση.
- Βαθμός μιας διαφορικής εξίσωσης ονομάζεται ο εκθέτης της παραγώγου μεγαλύτερης τάξης.

Πριν δούμε παραδείγματα πάνω στις έννοιες αυτές, θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην ταξινόμηση των διαφορικών εξισώσεων ως προς τη δομή τους. Μια διαφορική εξίσωση λέγεται **γραμμική** αν μπορεί να γραφτεί στη μορφή

$$a_v(x)y^{(v)} + a_{v-1}(x)y^{(v-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = \beta(x)$$

όπου $a_i(x)$, $i = 0, 1, \dots, v$ και $\beta(x)$ συνεχείς συναρτήσεις σε ένα διάστημα $[a, \beta]$ του $\mathbb{R}$. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εξίσωση λέγεται **μη γραμμική**. Οι μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με τη σειρά τους ταξινομούνται περαιτέρω σε επιμέρους κατηγορίες ως προς τη σχέση της συνάρτησης y και των παραγώγους της. Μία μη γραμμική ΣΔΕ ονομάζεται

- **ημιγραμμική** εάν είναι μη γραμμική ως προς τη συνάρτηση y και γραμμική ως προς τις παραγώγους της.

- **σχεδόν γραμμική** εάν είναι μη γραμμική ως προς τις $y, y', \dots, y^{(v-1)}$ και γραμμική ως προς την παράγωγο $y^{(v)}$ μεγαλύτερης τάξης.
- **πλήρως μη γραμμική** εάν είναι μη γραμμική τουλάχιστον ως προς την παράγωγο $y^{(v)}$ μεγαλύτερης τάξης.

► **Παράδειγμα 1.2 :** Ταξινόμηση τάξη και βαθμός ΣΔΕ

Ταξινομήστε τις παρακάτω διαφορικές εξισώσεις σε γραμμικές ή μη γραμμικές, καθώς και το είδος αυτών και βρείτε την τάξη και το βαθμό της καθεμίας, όπου αυτός ορίζεται.

α. $y'' - x^2 y' + xy = 0$

στ. $y''' = x^2 y'' - y$

β. $y''' + 2y'' - 3y' + y = x$

ζ. $y' = \sin y$

γ. $yy' = \sin x$

η. $(y''')^2 - 3yy'' + xy = 0$

δ. $(y')^2 + 2y = e^x$

θ. $y''' + (y'')^3 - xy^2 y' = \ln x$

ε. $y^{(4)} = y^2$

ι. $x^3 dy + y dx = 0$

✓ **ΛΥΣΗ**

Ορισμός 1.3 : Λύση διαφορικής εξίσωσης

Λύση ή ολοκλήρωμα μιας συνήθους διαφορικής εξίσωσης της μορφής (1.1) ονομάζεται κάθε συνάρτηση $y \in C^v(\Delta)$ που επαληθεύει την εξίσωση για κάθε $x \in \Delta$.

Η γραφική παράσταση μιας λύσης ονομάζεται **ολοκληρωτική καμπύλη**. Όταν η λύση εκφράζεται με την βοήθεια v σε πλήθος παραμέτρων $c_i, i = 1, 2, \dots, v$ στη μορφή

$$y = y(x, c_1, \dots, c_v)$$

τότε έχουμε τη λεγόμενη **γενική λύση** ή **γενικό ολοκλήρωμα** της εξίσωσης. Συγκεκριμένα στη μορφή αυτή, η λύση είναι μια σχέση λυμένη ως προς τη συνάρτηση y η οποία γράφεται ως συνάρτηση της ανεξάρτητης μεταβλητής x και των παραμέτρων. Σε περιπτώσεις που η σχέση αυτή δεν είναι δυνατόν να λυθεί ως προς y , έχουμε την **πεπλεγμένη γενική λύση** ή **πεπλεγμένο γενικό ολοκλήρωμα** στη μορφή

$$G(x, y, c_1, \dots, c_v) = 0.$$

Για παράδειγμα, η συνάρτηση $y(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ αποτελεί γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης $y'' = -y$, δοσμένη στην απλή (λυμένη) μορφή. Από την άλλη μεριά, η σχέση $y^3 + y = \cos x$ είναι πεπλεγμένη λύση της διαφορικής εξίσωσης $y'(3y^2 + 1) = -\sin x$ το οποίο επαληθεύεται εύκολα παραγωγίζοντας την πρώτη σχέση. Αν επιλέξουμε συγκεκριμένες τιμές για τις παραμέτρους c_i τότε από τη γενική λύση παίρνουμε μια **ειδική** ή **μερική λύση** της διαφορικής εξίσωσης. Υπάρχουν λύσεις διαφορικών εξισώσεων που δεν προκύπτουν από τη γενική λύση για καμία τιμή των παραμέτρων c_i . Αυτές ονομάζονται **ιδιόζουσες λύσεις** της εξίσωσης. Συγκεντρώνοντας όλες τις λύσεις μιας διαφορικής εξίσωσης, παίρνουμε την **πλήρη λύση** της.

► **Παράδειγμα 1.3 :** Λύσεις διαφορικής εξίσωσης

Χρησιμοποιώντας τις βασικές γνώσεις πάνω στις παραγώγους γνωστών

συναρτήσεων, να προσδιορίσετε τις λύσεις των παρακάτω εξισώσεων...

✓ ΛΥΣΗ

1.3 Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών

Ορισμός 1.4 : Πρόβλημα αρχικών τιμών

Θεώρημα 1.1 : Σύγκριση αριθμών

Ένας αριθμός a λέγεται μεγαλύτερος από έναν αριθμό b όταν η διαφορά $a - b$ είναι θετικός αριθμός.

⚠ Προσοχή

Δεν ορίζεται ρίζα αρνητικού αριθμού.

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεζεττενερ αδιπισινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπισινγ ιταε, φελις. ΰραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμψ εγετ, ζονσεζεττενερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες εηιςυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενε-ζτυς ετ νετυς ετ μαλεσουαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. "ρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεςτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριζες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαςυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριζες βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσουαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. ΰραβιτυρ αυστορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορσι εγετ ρισυς. Δυις νίβη μι, ζονγυε ευ, αςζυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορσι σιτ αμετ ορσι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυστορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαζυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτρι-ζιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςζυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορσι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. "ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. ΰμ σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, νασζετυρ ριδι-ζυλυς μυς. Αλιχυαμ τινζιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ζυρσυς λυςτυς μαυρις.

Νυλλα μαλεσουαδα πορττιτορ διαμ. Δονες φελις ερατ, ζονγυε νον, ολυτπατ ατ, τινζιδυντ τριστιχυε, λιβερο. Ίαμυς ιερρα φερμεντυμ φελις. Δονες νονυμψ πελλεντεσχυε αντε. Πηασελλυς αδιπισινγ σεμπερ ελιτ. Προιν φερμεντυμ μασσα ας χυαμ. Σεδ διαμ τυρπις, μολεστιε ιταε, πλασερατ α, μολεστιε νες, λεο. Μαεζενας λασινια. Ναμ ιπσυμ λιγυλα, ελειφενδ ατ, αςζυμσαν νες, συςσιπιτ α, ιπσυμ. Μορβι βλανδιτ λιγυλα φευγιατ μαγνα. Νυνς ελειφενδ ζονσεχυατ λορεμ. Σεδ λασινια νυλλα ιταε ενιμ. Πελλεντεσχυε τινζιδυντ πυρυς ελ μαγνα. Ιντεγερ νον ενιμ. Πραεσεντ ευισμοδ νυνς ευ πυρυς. Δονες βιβενδυμ χυαμ ιν τελλυς. Νυλλαμ ζυρσυς πυλιναρ λεςτυς. Δονες ετ μι. Ναμ υλπυτατε μετυς ευ ενιμ. Ξοτιβυλυμ πελλεντεσχυε φελις ευ μασσα.

Χυισχυε υλλαμζορπερ πλασερατ ιπσυμ. "ρας νίβη. Μορβι ελ θυστο ιταε λαζυς τινζιδυντ υλτριζες. Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεζεττενερ αδιπισινγ ελιτ. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Ιντεγερ τεμπυς ζοναλλις αυγυε. Ετιαμ φασιλisis. Νυνς ελεμεντυμ φερμεντυμ ωισι. Αενεαν πλασερατ. Υτ ιμπερδιετ, ενιμ σεδ γραιδα σολλιςιτυδιν, φελις οδιο πλασερατ χυαμ, ας πυλιναρ ελιτ πυρυς εγετ ενιμ. Νυνς ιταε τορτορ. Προιν τεμπυς νίβη σιτ αμετ νισλ. Ίαμυς χυις τορτορ ιταε ρισυς πορτα εηιςυλα.

Φυσσε μαυρις. Ξοτιβυλυμ λυςτυς νίβη ατ λεςτυς. Σεδ βιβενδυμ, νυλλα α

φαυσιβυς σεμπερ, λεο ελιτ υλτριζιες τελλυς, ας ενενατις αρσυ ωισι ελ νισλ. εστιβυλυμ διαμ. Αλιχυαμ πελλεντεσχυε, αυγυε χυις σαγιττις ποσυερε, τυρπις λασυς ζονγυε χυαμ, ιν ηενδρεριτ ρισυς ερος εγετ φελις. Μαεξενας εγετ ερατ ιν σαπιεν ματτις πορττιτορ. εστιβυλυμ πορττιτορ. Νυλλα φασιλισι. Σεδ α τυρπις ευ λασυς ζομοδο φασιλισις. Μορβι φρινγίλλα, ωισι ιν διγνισσιμ ιντερδυμ, θυστο λεστυς σαγιττις δυι, ετ ηιςυλα λιβερο δυι ζυρσυς δυι. Μαυρις τεμπορ λιγυλα σεδ λασυς. Δυις ζυρσυς ενιμ υτ αυγυε. "ρας ας μαγνα. "ρας νυλλα. Νυλλα εγεστας. υραβιτυρ α λεο. Χυισχυε εγεστας ωισι εγετ νυνς. Ναμ φευγιατ λασυς ελ εστ. υραβιτυρ ζονσεστετυερ.

Συσπενδισσε ελ φελις. Υτ λορεμ λορεμ, ιντερδυμ ευ, τινσιδυντ σιτ αμετ, λαορεετ ιταε, αρσυ. Αενεαν φαυσιβυς πεδε ευ αντε. Πραεσεντ ενιμ ελιτ, ρυτρυμ ατ, μολεστιε νον, νονυμψ ελ, νισλ. Υτ λεστυς ερος, μαλεсуаδα σιτ αμετ, φερμεντυμ ευ, σοδαλες ζυρσυς, μαγνα. Δονες ευ πυρυς. Χυισχυε ηιςυλα, υρνα σεδ υλτριζιες αυστορ, πεδε λορεμ εγεστας δυι, ετ ζοναλλις ελιτ ερατ σεδ νυλλα. Δονες λυςτυς. υραβιτυρ ετ νυνς. Αλιχυαμ δολορ οδιο, ζομοδο πρετιυμ, υλτριζιες νον, πηαρετρα ιν, ελιτ. Ιντεγερ αρσυ εστ, νονυμψ ιν, φερμεντυμ φαυσιβυς, εγεστας ελ, οδιο.

Σεδ ζομοδο ποσυερε πεδε. Μαυρις υτ εστ. Υτ χυις πυρυς. Σεδ ας οδιο. Σεδ ηιςυλα ηενδρεριτ σεμ. Δυις νον οδιο. Μορβι υτ δυι. Σεδ αςζυμσαν ρισυς εγετ οδιο. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Πελλεντεσχυε νον ελιτ. Φυσσε σεδ θυστο ευ υρνα πορτα τινσιδυντ. Μαυρις φελις οδιο, σολλιςιτυδιν σεδ, ολυτπατ α, ορναρε ας, ερατ. Μορβι χυις δολορ. Δονες πελλεντεσχυε, ερατ ας σαγιττις σεμπερ, νυνς δυι λοβορτις πυρυς, χυις ζονγυε πυρυς μετυς υλτριζιες τελλυς. Προιν ετ χυαμ. "λας απτεντ τασιτι σοσιοσχυ αδ λιτορα τορχυεντ περ ζονυβια νοστρα, περ ινζεπτος ηψμεναεος. Πραεσεντ σαπιεν τυρπις, φερμεντυμ ελ, ελειφενδ φαυσιβυς, ηιςυλα ευ, λασυς. Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεστετυερ αδιπισινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπισινγ ιταε, φελις. υραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρσυ λιβερο, νονυμψ εγετ, ζονσεστετυερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες ηιςυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενεζτυς ετ νετυς ετ μαλεсуаδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. "ρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεστυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριζες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ πορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαςυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριζες βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεсуаδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. υραβιτυρ αυστορ σεμπερ νυλλα. Δονες αρις ορσι εγετ ρισυς. Δυις νιβη μι, ζονγυε ευ, αςζυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορσι σιτ αμετ ορσι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυστορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λασυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτριζιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςζυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορσι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. "ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. υμ σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, νασζετυρ ριδιζυλς μυς. Αλιχυαμ τινσιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ζυρσυς λυςτυς μαυρις.

Νυλλα μαλεсуаδα πορττιτορ διαμ. Δονες φελις ερατ, ζονγυε νον, ολυτπατ ατ, τινσιδυντ τριστιχυε, λιβερο. Ίαμυς ιερρα φερμεντυμ φελις. Δονες νονυμψ πελλεντεσχυε αντε. Πηασελλυς αδιπισινγ σεμπερ ελιτ. Προιν φερμεντυμ μασσα ας χυαμ. Σεδ διαμ τυρπις, μολεστιε ιταε, πλασερατ α, μολεστιε νες, λεο. Μαεξενας λασινια. Ναμ ιπσυμ λιγυλα, ελειφενδ ατ, αςζυμσαν νες, συσιπιτ α, ιπσυμ. Μορβι βλανδιτ λιγυλα φευγιατ μαγνα. Νυνς ελειφενδ ζονσεχυατ

λορεμ. Σεδ λασινια νυλλα ιταε ενιμ. Πελλεντεσχυε τινσιδυντ πυρυς ελ μαγνα. Ιντεγερ νον ενιμ. Πραεσεντ ευισμοδ νυνς ευ πυρυς. Δονες βιβενδυμ χυαμ ιν τελλυς. Νυλλαμ κυρσους πυλιναρ λεςτυς. Δονες ετ μι. Ναμ υλπυτατε μετυς ευ ενιμ. Ξστιβυλυμ πελλεντεσχυε φελις ευ μασσα.

Χυισχυε υλλαμζορπερ πλασερατ ιπσυμ. ΄ρας νιβη. Μορβι ελ θυστο ιταε λαςυς τινσιδυντ υλτριες. Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεστετυερ αδιπισινγελιτ. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Ιντεγερ τεμπυς ζοναλλις αυγυε. Ετιαμ φασιλisis. Νυνς ελεμεντυμ φερμεντυμ ωισι. Αενεαν πλασερατ. Υτ ιμπερδιετ, ενιμ σεδ γραιδα σολλιςιτυδιν, φελις οδιο πλασερατ χυαμ, ας πυλιναρ ελιτ πυρυς εγετ ενιμ. Νυνς ιταε τορτορ. Προιν τεμπυς νιβη σιτ αμετ νισλ. Ίαμυς χυις τορτορ ιταε ρισυς πορτα ηιςυλα.

Φυσσε μαυρις. Ξστιβυλυμ λυςτυς νιβη ατ λεςτυς. Σεδ βιβενδυμ, νυλλα α φαυσιβυς σεμπερ, λεο ελιτ υλτριεςις τελλυς, ας ενενατις αρσυ ωισι ελ νισλ. Ξστιβυλυμ διαμ. Αλιχυαμ πελλεντεσχυε, αυγυε χυις σαγιττις ποσυερε, τυρπις λαςυς ζονγυε χυαμ, ιν ηενδρεριτ ρισυς ερος εγετ φελις. Μαεσενας εγετ ερατ ιν σαπιεν ματτις πορττιτορ. Ξστιβυλυμ πορττιτορ. Νυλλα φασιλisis. Σεδ α τυρπις ευ λαςυς ζομμοδο φασιλisis. Μορβι φρινγίλλα, ωισι ιν διγνισσιμ ιντερδυμ, θυστο λεςτυς σαγιττις δυι, ετ ηιςυλα λιβερο δυι κυρσους δυι. Μαυρις τεμπορ λιγυλα σεδ λαςυς. Δυις κυρσους ενιμ υτ αυγυε. ΄ρας ας μαγνα. ΄ρας νυλλα. Νυλλα εγεστας. ΰραβιτυρ α λεο. Χυισχυε εγεστας ωισι εγετ νυνς. Ναμ φυγιατ λαςυς ελ εστ. ΰραβιτυρ ζονσεστετυερ.

Συσπενδισσε ελ φελις. Υτ λορεμ λορεμ, ιντερδυμ ευ, τινσιδυντ σιτ αμετ, λαορεετ ιταε, αρσυ. Αενεαν φαυσιβυς πεδε ευ αντε. Πραεσεντ ενιμ ελιτ, ρυτρυμ ατ, μολεστιε νον, νονυμψ ελ, νισλ. Υτ λεςτυς ερος, μαλεσυαδα σιτ αμετ, φερμεντυμ ευ, σοδαλες κυρσους, μαγνα. Δονες ευ πυρυς. Χυισχυε ηιςυλα, υρνα σεδ υλτριεςις αυστορ, πεδε λορεμ εγεστας δυι, ετ ζοναλλις ελιτ ερατ σεδ νυλλα. Δονες λυςτυς. ΰραβιτυρ ετ νυνς. Αλιχυαμ δολορ οδιο, ζομμοδο πρετινυμ, υλτριεςις νον, πηαρετρα ιν, ελιτ. Ιντεγερ αρσυ εστ, νονυμψ ιν, φερμεντυμ φαυσιβυς, εγεστας ελ, οδιο.

Σεδ ζομμοδο ποσυερε πεδε. Μαυρις υτ εστ. Υτ χυις πυρυς. Σεδ ας οδιο. Σεδ ηιςυλα ηενδρεριτ σεμ. Δυις νον οδιο. Μορβι υτ δυι. Σεδ αςσυμσαν ρισυς εγετ οδιο. Ιν ηας ηαβιτασσε πλατεα διςτυμστ. Πελλεντεσχυε νον ελιτ. Φυσσε σεδ θυστο ευ υρνα πορτα τινσιδυντ. Μαυρις φελις οδιο, σολλιςιτυδιν σεδ, ολυτπατ α, ορναρε ας, ερατ. Μορβι χυις δολορ. Δονες πελλεντεσχυε, ερατ ας σαγιττις σεμπερ, νυνς δυι λοβορτις πυρυς, χυις ζονγυε πυρυς μετυς υλτριεςις τελλυς. Προιν ετ χυαμ. ΄λαςς απτεντ τασιτι σοσιοςχυ αδ λιτορα τορχυεντ περ ζονυβια νοστρα, περ ινζεπτος ηψμεναεος. Πραεσεντ σαπιεν τυρπις, φερμεντυμ ελ, ελειφενδ φαυσιβυς, ηιςυλα ευ, λαςυς.

| ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Ενότητα 1.3

1.1 Ταξινομήστε τις ακόλουθες διαφορικές εξισώσεις σε συνήθεις και μερικές.

α. $y'' + 2y' + y = x^2$

β. $u_x + u_y = x$

γ. $(y'')^3 - 2y' = e^x$

δ. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = u$

ε. $\Delta^2 y = 0$

στ. $\sin x \, dy + e^y \, dx = 0$

ζ. $r' - (1 - \theta)r = \cos \theta$

η. $uu_y = 1 - u_x$

1.2 Χαρακτηρίστε καθεμία από τις ακόλουθες συνήθεις διαφορικές εξισώσεις ως γραμμική ή μη γραμμική. Στην περίπτωση μη γραμμικής να αναφέρετε αν είναι ημιγραμμική, σχεδόν γραμμική ή πλήρως μη γραμμική.

α. $x^3 y'' + xy' - 2y = \cos x$

β. $x^2 y'' + 3xy' + y^2 = 1$

γ. $yy' = x^3$

δ. $y''' + \sin y = e^y$

ε. $\sqrt{y''} + y = 0$

στ. $x^2 dy - y^3 dx = 0$

ζ. $(1 + x^2)y'' - 2xy' + y = e^x$

Διαφορικές εξισώσεις 1^{ης} τάξης

2.1 Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών

Το όνομά τους υποδεικνύει και τη δομή τους. Είναι τέτοια ώστε να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε στα δύο μέλη της εξίσωσης την ανεξάρτητη μεταβλητή x από την εξαρτημένη y . Οι διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών είναι από τις πιο απλές, στην επίλυσή τους, που θα συναντήσουμε. Αν η εξίσωση είναι γραμμένη στην επιλύσιμη μορφή της, η εύρεση της λύσης γίνεται με άμεση ολοκλήρωση.

Ορισμός 2.1 : Εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών

Μια διαφορική εξίσωση 1ης τάξης, της μορφής

$$y' = h(x, y)$$

θα λέγεται εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών εάν η συνάρτηση h μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο δύο συναρτήσεων $f(x)$, μεταβλητής x και $g(y)$, μεταβλητής y . Θα έχει δηλαδή τη μορφή

$$y' = f(x)g(y) \quad (2.1)$$

Βλέπουμε ότι πρόκειται για μια **μη γραμμική** διαφορική εξίσωση 1ης τάξης. Η διαδικασία επίλυσής της έχει τα εξής βήματα.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 2.1 Εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών
- 2.2 Πλήρεις διαφορικές εξισώσεις
- 2.3 Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις
- 2.4 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις
- 2.5 Εξισώσεις Bernoulli - Ricatti
- 2.6 Περιοδικές εξισώσεις
- 2.7 Ιδιάζουσες λύσεις
- 2.8 Μέθοδος ολοκλήρωσης με παραγωγή
- 2.9 Αντικατάσταση

■ Γενική λύση

Η παράγωγος y' γράφεται στη διαφορική της μορφή δηλαδή $\frac{dy}{dx}$. Στη συνέχεια, αν είναι απαραίτητο, παραγοντοποιούμε το δεύτερο μέλος της εξίσωσης ώστε να προκύψουν οι παράγοντες $f(x)$ και $g(y)$. Η εξίσωση τότε μπορεί να πάρει τη μορφή

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \Rightarrow \frac{dy}{dx} \frac{1}{g(y)} = f(x) dx$$


Ολοκληρώνουμε τα δύο μέλη της ως προς x και καταλήγουμε στη σχέση

$$\int \frac{1}{g(y)} \frac{dy}{dx} dx = \int f(x) dx + c \quad (2.2)$$

η οποία, χρησιμοποιώντας την αντικατάσταση $y = y(x) \Rightarrow dy = dy(x) \Rightarrow dy = \frac{dy}{dx} dx$, γράφεται ισοδύναμα

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx + c \quad (2.3)$$

από την οποία οδηγούμαστε στη γενική λύση της εξίσωσης, είτε σε λυμένη είτε σε πεπλεγμένη μορφή. Καθώς οι σχέσεις (2.2) και (2.3) είναι ισοδύναμες, μπορούμε από δω και πέρα χάριν συντομίας, να χρησιμοποιούμε κατευθείαν τον τύπο (2.3) μόλις επιτύχουμε το διαχωρισμό των μεταβλητών.



Σχήμα 2.1: Ολοκληρωτικές καμπύλες της εξίσωσης $y' = -xy^2$

► **Παράδειγμα 2.1 :** Εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών
Βρείτε τη γενική λύση της εξίσωσης.

$$y' = -xy^2$$

όπου $x \in \mathbb{R}^*$.

✓ **ΛΥΣΗ**

Η εξίσωση είναι μη γραμμική διαφορική 1ης τάξης. Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο έχουμε

$$\begin{aligned} y' = -xy^2 &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -xy^2 \Rightarrow \\ -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dx} &= x \Rightarrow -\int \frac{1}{y^2} dy = \int x dx \Rightarrow \\ \frac{1}{y} &= \frac{x^2}{2} + c_1 \Rightarrow y(x) = \frac{2+c}{x^2} \end{aligned}$$

► **Παράδειγμα 2.2 :** Πεπλεγμένη λύση

Βρείτε τη γενική λύση της ακόλουθης διαφορικής εξίσωσης χωριζομένων μεταβλητών

$$(3y^2 - 1)y' = 1, x \in \mathbb{R}$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Παρατηρούμε ότι στην εξίσωση είναι ήδη διαχωρισμένες οι μεταβλητές


$$(3y^2 - 1)y' = 1 \Leftrightarrow$$

$$3y^2 y' - y' = 2x \Leftrightarrow$$

$$\int (3y^2 y' - y') dy = \int 1 dx + c \Leftrightarrow$$

$$y^3 - y = x + c$$

με $c \in \mathbb{R}$ μια αυθαίρετη σταθερά. Η λύση της εξίσωσης είναι δοσμένη σε πεπλεγμένη μορφή. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε την ολοκληρωτική καμπύλη της ειδικής λύσης της, για $c = 0$.



Σχήμα 2.2: Πεπλεγμένη λύση της εξίσωσης για $c = 0$

■ Πρόβλημα αρχικών τιμών

Ένα πρόβλημα αρχικών τιμών με διαφορική εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών, μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους.

- Είτε εύρεση της γενικής λύσης της εξίσωσης και κατόπιν χρήση της αρχικής συνθήκης $y(x_0) = y_0$ για την εύρεση των σταθερών
- είτε ολοκλήρωση των μελών της εξίσωσης χρησιμοποιώντας ορισμένο ολοκλήρωμα.

Ας δούμε την κατασκευή του τύπου για τη δεύτερη μέθοδο. Το πρόβλημα αποτελείται από την εξίσωση (2.1) με αρχική $y(x_0) = y_0$. Όταν η εξίσωση γραφτεί στη μορφή

$$\frac{1}{g(y(x))} \frac{dy}{dx} = f(x) dx$$

ολοκληρώνουμε κάθε μέλος της από x_0 έως x και παίρνουμε

$$\int_{x_0}^x \frac{1}{g(y(t))} \frac{dy}{dt} dt = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

Χρησιμοποιούμε την αντικατάσταση $s = y(t)$ η οποία μας δίνει

- $s = y(t) \Rightarrow ds = dy(t) = \frac{dy}{dt} dt$ και
- για $t = x_0 \Rightarrow s = y(x_0) = y_0$ καθώς και $t = x \Rightarrow s = y(x) = y$.

Έτσι η τελευταία ισότητα μας δίνει το ζητούμενο τύπο

$$\int_{y_0}^y \frac{1}{g(s)} ds = \int_{x_0}^x f(t) dt \quad (2.4)$$

Στο επόμενο παράδειγμα θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα αρχικών τιμών με την πρώτη μέθοδο.

► **Παράδειγμα 2.3 :** Εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών
Διαπιστώστε ότι η διαφορική εξίσωση

$$y' = 2xy - 4x + y - 2$$

είναι εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών και βρείτε τη λύση του προβλήματος αρχικών τιμών στο οποίο $y(1) = 0$.

✓ **ΛΥΣΗ**


Παραγοντοποιούμε το δεύτερο μέλος της εξίσωσης και έχουμε

$$\begin{aligned} y' &= 2xy - 4x + y - 2 = \\ &= 2x(y - 2) + (y - 2) = \\ &= (y - 2)(2x - 1) \end{aligned}$$

επομένως πρόκειται για μια εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών. Αυτή τώρα μας δίνει

$$\begin{aligned} y' &= (y - 2)(2x - 1) \Leftrightarrow \\ \frac{dy}{dx} &= (y - 2)(2x - 1) \Leftrightarrow \frac{1}{y - 2} \frac{dy}{dx} = (2x - 1) dx \Leftrightarrow \\ \int \frac{dy}{y - 2} &= \int (2x - 1) dx + c_1 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

12 · Διαφορικές εξισώσεις 1^{ης} τάξης



Σχήμα 2.3: Ολοκληρωτική καμπύλη της λύσης της $y' = 2xy - 4x + y - 2$.

$$\ln |y - 2| = x^2 - x + c_1 \Leftrightarrow$$

$$|y - 2| = ce^{x^2-x}$$

όπου $c_1, c = e^{c_1} > 0$ αυθαίρετες σταθερές. Η λύση αυτή είναι γραμμένη σε πεπλεγμένη μορφή. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση y και κατά συνέπεια η $y - 2$ ανήκει στο χώρο $C(\mathbb{R})$ των συνεχώς παραγωγίσιμων συναρτήσεων, δεν μηδενίζεται διότι ούτε και η ce^{x^2-x} μηδενίζεται άρα η τελευταία σχέση γράφεται

$$y - 2 = \pm ce^{x^2-x}$$

Σύμφωνα τώρα με την αρχική συνθήκη $y(1) = 0$ παίρνουμε $y(1) - 2 = -2 < 0$ άρα $y - 2 < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ καθώς και

$$|y(1) - 2| = ce^0 \Rightarrow |-2| = c \Rightarrow c = 2$$

και παίρνουμε έτσι τη λύση του Π.Α.Τ.: $2 - y = 2e^{x^2-x} \Rightarrow y(x) = 2 - 2e^{x^2-x}$.

► Παράδειγμα 2.4 : Εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών - Π.Α.Τ.
Λύστε το ακόλουθο πρόβλημα αρχικών τιμών

$$\begin{cases} e^x y' = \frac{1-x}{2y} \\ y(1) = \frac{1}{\sqrt{e}} \end{cases}$$

με $y \neq 0$ και $x \in [0, +\infty)$.

✓ **ΛΥΣΗ**

Διαχωρίζουμε αρχικά τις μεταβλητές στην εξίσωση

$$e^x y' = \frac{1-x}{2y} \Rightarrow 2yy' = e^{-x}(1-x)$$

εφαρμόζουμε στη τελευταία, τον τύπο (2.4) οπότε παίρνουμε

$$\begin{aligned} \int_{y(1)}^y 2ss' ds &= \int_1^x e^{-t}(1-t) dt \Rightarrow \\ s^2 \Big|_{\frac{1}{\sqrt{e}}}^y &= te^{-t} \Big|_1^x \Rightarrow y^2 - \frac{1}{e} = xe^{-x} - \frac{1}{e} \Rightarrow \\ y^2 &= xe^{-x} \end{aligned}$$

Αφού $y \in C((0, +\infty))$, $y \neq 0$ και $y(1) > 0$ τότε $y(x) > 0$, $x \in (0, +\infty)$ άρα η λύση του προβλήματος είναι $y(x) = \sqrt{xe^{-x}}$.

2.2 Πλήρεις διαφορικές εξισώσεις

Ορισμός 2.2 : Πλήρης διαφορική εξίσωση 1ης τάξης

Μια διαφορική εξίσωση της μορφής

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (2.5)$$

ονομάζεται **πλήρης** διαφορική εξίσωση 1ης τάξης...

... Στην περίπτωση ικανοποίησης της συνθήκης πληρότητας, η παράσταση $M dx + N dy$ αποτελεί ένα **πλήρες διαφορικό**. Μας είναι γνωστό από την

Σημείωση

Αν $F(x, y)$ είναι μια συνεχής συνάρτηση δύο μεταβλητών

πραγματική ανάλυση ότι το διαφορικό μιας συνάρτησης $f(x, y)$ δίνεται από τη σχέση

$$df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \quad (2.6)$$

Θέλουμε έτσι η παράσταση αυτή να ταυτίζεται με το πλήρες διαφορικό που αναφέραμε, επομένως πρέπει

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y) \text{ και } \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y)$$

και καθώς το διαφορικό αυτό είναι ταυτοτικά μηδέν, τότε η ζητούμενη συνάρτηση $f(x, y)$ είναι σταθερή δηλαδή

$$f(x, y) = c \quad (2.7)$$

Έτσι συμπεραίνουμε ότι η λύση μιας πλήρους διαφορικής εξίσωσης δίνεται σε πεπλεγμένη μορφή από την παραπάνω σχέση. Η εξίσωση (2.5) γράφεται στη μορφή $df(x, y) = 0$. (εισαγωγή στη συνθήκη πληρότητας...)

Θεώρημα 2.1 : Συνθήκη πληρότητας

Η διαφορική εξίσωση $M dx + N dy = 0$ είναι πλήρης αν και μόνο αν ισχύει η σχέση

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2.8)$$

■ Βασική μέθοδος επίλυσης

Για την εύρεση της λύσης επιλέγουμε μια από τις σχέσεις (2.6), για παράδειγμα την $f_x = M$ και ολοκληρώνουμε κάθε μέλος ως προς x . Έτσι παίρνουμε

$$f(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y) \quad (2.9)$$

όπου $g(y)$ συνεχής στο διάστημα Δ . Έπειτα παραγωγίζουμε την παραπάνω σχέση ως προς y και προσδιορίζουμε τη συνάρτηση $g(y)$ εξισώνοντας την παράσταση που θα προκύψει με την $N(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left[\int M dx + g(y) \right] \Rightarrow N(x, y) = \int \frac{\partial M}{\partial y} dx + g'(y) \quad (2.10)$$

Από την τελευταία ισότητα προσδιορίζουμε την $g(y)$ και με αντικατάσταση στη σχέση (2.9) οδηγούμαστε στη λύση της εξίσωσης. Η διαδικασία ακολουθεί τα ίδια βήματα κι στην περίπτωση όπου επιλέξουμε να ξεκινήσουμε από τη δεύτερη σχέση της (2.9). την οποία θα ολοκληρώσουμε ως προς y . Θα έχουμε

$$f_y = N \Leftrightarrow f(x, y) = \int N(x, y) dy + h(x) \quad (2.11)$$

Παραγωγίζουμε την (2.11) ως προς x και προσδιορίζουμε την συνάρτηση $h(x)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\int N dy + h(x) \right] \Rightarrow M(x, y) = \int \frac{\partial N}{\partial x} dy + h'(x) \quad (2.12)$$

οποία και αντικαθιστούμε στην (2.11) και προκύπτει η πεπλεγμένη λύση. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να εργαστούμε περαιτέρω με τις ισότητες

(2.10) και (2.12) ώστε αυτές να μας δώσουν τύπους για άμεσο προσδιορισμό των συναρτήσεων $g(y)$ και $h(x)$. Παίρνουμε έτσι αντίστοιχα:

$$N(x, y) = \int \frac{\partial N}{\partial x} dx + g'(y) \Leftrightarrow g(y) = \int \left(N - \int N_x dx \right) dy \quad (2.13)$$

$$M(x, y) = \int \frac{\partial M}{\partial y} dy + h'(x) \Leftrightarrow h(x) = \int \left(M - \int M_y dy \right) dx \quad (2.14)$$

► **Παράδειγμα 2.5 :** Πλήρης διαφορική εξίσωση

$$ye^x dx + (e^x + \sin y) dy = 0$$

✓ **ΛΥΣΗ**

Η εξίσωση έχει τη μορφή (2.5) και βλέπουμε ότι $M(x, y) = ye^x$ και $N(x, y) = e^x + \sin y$. Στη συνέχεια έχουμε

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial (ye^x)}{\partial y} = e^x = \frac{\partial (e^x + \sin y)}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

οπότε η εξίσωση είναι πλήρης αφού ικανοποιείται η συνθήκη πληρότητας. Υπάρχει λοιπόν σταθερή συνάρτηση της μορφής $f(x, y) = c$ για την οποία $f_x = M$ και $f_y = N$. Ολοκληρώνουμε την πρώτη σχέση ως προς x και έχουμε

$$\begin{aligned} f_x = ye^x &\Rightarrow f(x, y) = \int ye^x dx + g(y) \Rightarrow \\ f(x, y) &= ye^x + g(y) \end{aligned} \quad (2.15)$$

Παραγωγίζουμε στη συνέχεια την τελευταία ως προς y και είναι

$$\begin{aligned} f_y = e^x + g'(y) &\Rightarrow e^x + \sin y = e^x + g'(y) \Rightarrow \\ g'(y) &= \sin y \Rightarrow g(y) = -\cos y + c_1 \end{aligned}$$

Αν αντικαταστήσουμε έτσι την $g(y)$ στην (2.15) καταλήγουμε στην πεπλεγμένη λύση της εξίσωσης

$$f(x, y) = ye^x - \cos y + c_1 \Rightarrow ye^x - \cos y = c$$

► **Παράδειγμα 2.6 :**

Να λυθεί η διαφορική εξίσωση

$$y' = -\frac{y^2 + e^x}{2xy}$$

με $y \neq 0$ και $x \in \mathbb{R}$.


✓ **ΛΥΣΗ**

Η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα στη μορφή

$$\begin{aligned} y' = -\frac{y^2 + e^x}{2xy} &\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y^2 + e^x}{2xy} \Leftrightarrow \\ (y^2 + e^x) dx + 2xy dy &= 0 \end{aligned}$$

από την οποία βλέπουμε ότι $M(x, y) = y^2 + e^x$ και $N(x, y) = 2xy$. Ελέγχουμε στη συνέχεια αν η εξίσωση είναι πλήρης. Πράγματι

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial (y^2 + e^x)}{\partial y} = 2y = \frac{\partial (2xy)}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$



Σχήμα 2.5: Μερικές λύσεις της εξίσωσης

επομένως υπάρχει συνάρτηση $f(x, y) = c$ η οποία ικανοποιεί την εξίσωση. Για αυτήν ισχύει $\frac{\partial f}{\partial x} = M$ και $\frac{\partial f}{\partial y} = N$. Με ολοκλήρωση της δεύτερης σχέσης ως προς y έχουμε

$$f_y = 2xy \Leftrightarrow f(x, y) = xy^2 + h(x)$$

Παραγωγίζουμε ως προς x και παίρνουμε

$$f_x = y^2 + h'(x) \Leftrightarrow y^2 + e^x = y^2 + h'(x) \Leftrightarrow h(x) = e^x$$

Συνεπώς η λύση δίνεται από τον τύπο

$$f(x, y) = c \Leftrightarrow xy^2 + e^x = c$$

όπου c αυθαίρετη σταθερά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εξίσωση του παραδείγματος είναι μια διαφορική εξίσωση Bernoulli με την οποία θα ασχοληθούμε στην παράγραφο 2.5 όπου και θα την επιλύσουμε ξανά, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη μέθοδο.

■ Ολοκληρωτικός παράγοντας

Όταν η συνθήκη (2.8) δεν ικανοποιείται, η εξίσωση (2.5) δεν είναι πλήρης. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να αναχθεί σε πλήρη με τη βοήθεια ενός **ολοκληρωτικού παράγοντα**. Ο πολλαπλασιασμός της εξίσωσης με τον παράγοντα αυτό έχει σκοπό να σχηματίζει ένα πλήρες διαφορικό στο πρώτο μέλος της. Όταν αυτό επιτευχθεί παίρνουμε μια πλήρη διαφορική εξίσωση την οποία επιλύουμε όπως είδαμε προηγουμένως. Αναζητούμε λοιπόν μία συνεχή συνάρτηση $\mu(x, y)$ η οποία καθιστά την εξίσωση

$$\mu(x, y)M(x, y) dx + \mu(x, y)N(x, y) dy = 0 \quad (2.16)$$

πλήρη και κατά συνέπεια θα ισχύει η συνθήκη πληρότητας

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$$

Από τη σχέση αυτή παίρνουμε

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\mu M)}{\partial y} &= \frac{\partial(\mu N)}{\partial x} \Leftrightarrow \\ \frac{\partial \mu}{\partial y} M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial \mu}{\partial x} N + \mu \frac{\partial N}{\partial x} \Leftrightarrow \\ \frac{\partial \mu}{\partial y} M - \frac{\partial \mu}{\partial x} N &= \mu \frac{\partial N}{\partial x} - \mu \frac{\partial M}{\partial y} \Leftrightarrow \\ \frac{\mu_x N - \mu_y M}{\mu} &= M_y - N_x \end{aligned} \quad (2.17)$$

Η τελευταία σχέση αποτελεί μια μερική διαφορική εξίσωση ως προς τη ζητούμενη συνάρτηση μ και η επίλυσή της έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με την αρχική μας εξίσωση. Για το λόγο αυτό θα εξετάσουμε μόνο κάποιες ειδικές περιπτώσεις για τη συνάρτηση $\mu(x, y)$ ώστε η (2.17) να μας δώσει κάποια γενική λύση.

A. $\mu = \mu(x)$

Αν η ζητούμενη συνάρτηση μ εξαρτάται μόνο από τη μεταβλητή x δηλαδή $\mu = \mu(x)$ τότε και τα δύο μέλη της (2.17) αποτελούν συναρτήσεις ως προς x ενώ παίρνουμε

$$\mu_x = \mu' \text{ και } \mu_y = 0$$

οπότε η (2.17) απλοποιείται, ανάγεται σε συνήθη διαφορική εξίσωση και γίνεται

$$\frac{\mu'}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{N} \Leftrightarrow \ln \mu = \int \frac{M_y - N_x}{N} dx \Leftrightarrow \mu(x) = e^{\int P(x) dx}$$

όπου $P(x) = \frac{M_y - N_x}{N}$. Καταλήγουμε έτσι στο εξής συμπέρασμα: Εάν η παράσταση $\frac{M_y - N_x}{N}$ είναι συνάρτηση μόνο του x τότε διαφορική εξίσωση (2.5) έχει ολοκληρωτικό παράγοντα τη συνάρτηση

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} \quad (2.18)$$

► **Παράδειγμα 2.7 :** Ολοκληρωτικός παράγοντας $\mu = \mu(x)$
Ελέγξτε αν η ακόλουθη διαφορική εξίσωση

$$(x^2 + 3xy) dx + \left(\frac{y}{x} + x^2\right) dy = 0$$

είναι πλήρης. Αν όχι, βρείτε τη γενική λύση της με τη βοήθεια ενός ολοκληρωτικού παράγοντα.

✓ **ΛΥΣΗ**

Έχουμε $M(x, y) = x^2 + 3xy$ και $N(x, y) = \frac{y}{x} + x^2$. Ελέγχουμε την ισχύ της συνθήκης

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x \neq -\frac{y}{x^2} + 2x = \frac{\partial N}{\partial x}$$

και συμπεραίνουμε πως δεν είναι πλήρης. Για την εύρεση κατάλληλου ολοκληρωτικού παράγοντα, εξετάζουμε αν η παράσταση $\frac{M_y - N_x}{N}$ μας δίνει συνάρτηση μόνο ως προς x . Πράγματι έχουμε

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{3x + \frac{y}{x^2} - 2x}{\frac{y}{x} + x^2} = \frac{\frac{y}{x^2} + x}{x \left(\frac{y}{x^2} + x\right)} = \frac{1}{x}$$

άρα ο ολοκληρωτικός παράγοντας έχει τη μορφή (2.17) και είναι

$$\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = e^{\ln x} = x$$

Πολλαπλασιάζουμε στη συνέχεια την αρχική εξίσωση με $\mu(x) = x$

$$(x^3 + 3x^2y) dx + (y + x^3) dy = 0$$


και ελέγχουμε εκ νέου τη συνθήκη πληρότητας:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial (x^3 + 3x^2y)}{\partial y} = 3x^2 = \frac{\partial (y + x^3)}{\partial x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Η νέα εξίσωση είναι πλήρης. Αναζητούμε έτσι μια συνάρτηση $f(x, y) = c$ που επαληθεύει την εξίσωση και ισχύει γι αυτήν $f_x = M$ και $f_y = N$. Ολοκληρώνουμε την πρώτη σχέση ως προς x και τη δεύτερη ως προς y και παίρνουμε

$$f(x, y) = \int (x^3 + 3x^2y) dx + g(y) = \frac{x^4}{4} + x^3y + g(y) \text{ και}$$

$$f(x, y) = \int (y + x^3) dy + h(x) = \frac{y^2}{2} + x^3y + h(x)$$



Προκειμένου να ταυτίζονται οι δύο τελευταίες σχέσεις παίρνουμε

$$g(y) = \frac{y^2}{2} \text{ και } h(x) = \frac{x^4}{4}$$

επομένως η γενική λύση της εξίσωσης θα δίνεται από την ακόλουθη πεπλεγμένη συνάρτηση

$$f(x, y) = c \Rightarrow \frac{x^4}{4} + x^3 y + \frac{y^2}{2} = c$$

B. $\mu = \mu(y)$

Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση, αν ο ολοκληρωτικός παράγοντας εξαρτάται μόνο από τη μεταβλητή y τότε η (2.17) γίνεται Σ.Δ.Ε. ως προς y και είναι

$$-\frac{\mu'}{\mu} = \frac{M_y - N_x}{M} \Leftrightarrow \ln \mu = \int \frac{N_x - M_y}{M} dy \Leftrightarrow$$

$$\mu(y) = e^{\int Q(y) dy}$$

όπου $Q(y) = \frac{N_x - M_y}{M}$. Το αντίστοιχο συμπέρασμα για το ζητούμενο ολοκληρωτικό παράγοντα είναι: Εάν η παράσταση $\frac{N_x - M_y}{M}$ είναι συνάρτηση μόνο του y τότε η διαφορική εξίσωση (2.5) έχει ολοκληρωτικό παράγοντα τη συνάρτηση

$$\mu(y) = e^{\int Q(y) dy} \quad (2.19)$$

► **Παράδειγμα 2.8 :** Ολοκληρωτικός παράγοντας $\mu = \mu(y)$

$$(xe^{-y} + \cos x) dx + \sin x dy = 0$$

✓ ΛΥΣΗ

Στην εξίσωση έχουμε $M(x, y) = xe^{-y} + \cos x$ και $N(x, y) = \sin x$. Παρατηρούμε ότι

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -xe^{-y} \neq \cos x = \frac{\partial N}{\partial x}$$

άρα η εξίσωση δεν είναι πλήρης. Η παράσταση $\frac{N_x - M_y}{M}$ θα μας δώσει

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{\cos x + xe^{-y}}{xe^{-y} + \cos x} = 1$$

επομένως ο ολοκληρωτικός παράγοντας θα είναι $e^{\int dy} = e^y$. Πολλαπλασιάζοντας η εξίσωση γίνεται

$$(x + e^y \cos x) dx + e^y \sin x dy = 0$$

στην οποία πλέον έχουμε $M(x, y) = x + e^y \cos x$ και $N(x, y) = e^y \sin x$. Εύκολα βλέπουμε πως είναι πλήρης καθώς ικανοποιείται η (2.8) και έτσι η γενική λύση της θα δίνεται από τη σχέση $f(x, y) = c$ με $f_x = M$ και $f_y = N$. Από την πρώτη σχέση παίρνουμε

$$f_x = M \Leftrightarrow f(x, y) = \int (x + e^y \cos x) dx + g(y) = \frac{x^2}{2} + e^y \sin x + g(y)$$

Με άμεσο προσδιορισμό της συνάρτησης $g(y)$ από τον τύπο (2.13) παίρνουμε

$$\begin{aligned} g(y) &= \int \left(N - \int N_x dx \right) dy = \\ &= \int \left(\sin x - \int \cos x dx \right) dy = \int 0 dy = c_1 \end{aligned}$$

Η γενική λύση θα δίνεται από τον τύπο

$$f(x, y) = c \Leftrightarrow \frac{x^2}{2} + e^y \sin x = c$$

$$\Gamma. \mu = \mu(x + y)$$

$$\Delta. \mu = \mu(xy)$$

$$\text{E. } \mu = \mu\left(\frac{y}{x}\right)$$

| ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Ενότητα 2.2

2.1 Επαληθεύστε ότι οι ακόλουθες εξισώσεις είναι πλήρεις και βρείτε τη γενική λύση τους.

α. $x dx + y dy = 0$

β. $y dx + x dy = 0$

γ. $ye^x dx + (e^x + y) dy = 0$

δ. $y \cos x dx + \sin x dy = 0$

ε. $\tan y dx + \frac{x}{\cos^2 y} dy = 0$

στ. $(3x^3 + y^3) dx + 3xy^2 dy = 0$

2.2 Ελέγξτε ποιες από τις παρακάτω εξισώσεις είναι πλήρεις. Για όσες δεν είναι πλήρεις, βρείτε έναν ολοκληρωτικό παράγοντα μ της μορφής $\mu(x)$ ή $\mu(y)$ καθώς και τη λύση τους.

α. $2y dx + x dy = 0$

β. $2xy \ln y dx + x^2 dy = 0$

γ. $(e^x \ln y) dx + \frac{e^x}{y} dy = 0$

2.3 Δίνεται η διαφορική εξίσωση

$$3xy dx + 2x^2 dy = 0$$

α. Δείξτε ότι η εξίσωση δεν είναι πλήρης.

β. Βρείτε έναν ολοκληρωτικό παράγοντα της εξίσωσης, της μορφής $\mu(x, y) = x^v y^v$ με $v \in \mathbb{N}$.

γ. Βρείτε τη γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης.

2.4 Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεσετετυερ αδι-πισινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπισινγ ιταε, φελις. ύραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμψ εγετ, ζονσεσετετυερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες εηισυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενεστυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυ-ρις υτ λεο. "ρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεςτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριςες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαςυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριςες βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσυαδα ευ, πυλι-ναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. ύραβιτυρ αυςτορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριςυς ορςι εγετ ριςυς. Δυις νίβη μι, ζον-γυε ευ, αςςυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορςι σιτ αμετ ορςι διγνισσιμ ρυτρυμ.

2.3 Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις

Ορισμός 2.3 : Ομογενής εξίσωση

Η διαφορική εξίσωση

$$y' = f(x, y)$$

λέγεται ομογενής αν η συνάρτηση f εξαρτάται από το λόγο $\frac{y}{x}$... Να συμπληρώσω το $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$...

Ο μετασχηματισμός $y = zx$

Η χρήση του μετασχηματισμού $y = zx$ σε μια ομογενή εξίσωση αποτελεί κλασσικό τρόπο επίλυσης και μετατρέπει την αρχική διαφορική εξίσωση σε μία χωριζομένων μεταβλητών...

► Παράδειγμα 2.9 : Ομογενής εξίσωση

Βρείτε τη γενική λύση της εξίσωσης

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2}$$

✓ ΛΥΣΗ

Μπορούμε να δείξουμε ότι η αρχική εξίσωση είναι ομογενής με το να σχηματίσουμε το λόγο $\frac{y}{x}$ στο δεύτερο μέλος της. Έχουμε λοιπόν

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2} = \frac{y^2}{x^2} + \frac{2xy}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 2\frac{y}{x}$$

Στη συνέχεια με το μετασχηματισμό $y = zx$ έχουμε αρχικά $y' = z'x + z$. Αντικαθιστώντας θα καταλήξουμε σε μία εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών.

$$z'x + z = z^2 + 2z \Leftrightarrow z'x = z + z^2 \Leftrightarrow \frac{\partial z}{\partial x} x = z + z^2 \Leftrightarrow \frac{dz}{z^2 + z} = \frac{dx}{x}$$

2.4 Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις

Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, οι γραμμικές Σ.Δ.Ε έχουν πολωνυμική μορφή, με συντελεστές συνεχείς συναρτήσεις $a_i(x)$, $x \in \Delta \subseteq \mathbb{R}$. Η γενική μορφή μιας 1ης τάξης γραμμικής διαφορικής εξίσωσης θα είναι

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = \beta(x)$$

όπου a_1, a_0 και β συνεχείς συναρτήσεις σε ένα διάστημα Δ . Για κάθε $x \in \Delta$ για το οποίο $a_1(x) \neq 0$, η προηγούμενη εξίσωση παίρνει την λυμένη μορφή της όπως βλέπουμε στον επόμενο ορισμό.

Ορισμός 2.4 : Γραμμική εξίσωση 1ης τάξης

Μια διαφορική εξίσωση ονομάζεται γραμμική 1ης τάξης, αν έχει την μορφή

$$y' + p(x)y = q(x), \quad x \in \Delta \quad (2.20)$$

όπου $p(x)$ και $q(x)$ συνεχείς συναρτήσεις στο διάστημα $\Delta \subseteq \mathbb{R}$.

Θέσαμε $p(x) = \frac{a_0(x)}{a_1(x)}$ και $q(x) = \frac{\beta(x)}{a_1(x)}$. Στην περίπτωση όπου $q(x) \equiv 0$ έχουμε την αντίστοιχη **ομογενή** γραμμική διαφορική εξίσωσης της (2.20).

i Παρατήρηση

Η αρχική διαφορική εξίσωση αποτελεί εξίσωση Bernoulli γιατί γράφεται

$$y' = \frac{y^2 + 2xy}{x^2} \Leftrightarrow y' - \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^2$$

και μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μέθοδο που θα συναντήσουμε στην παράγραφο 2.5.

Μια ομογενής γραμμική
ομογενής γραμμική

την $y(x) = 0, x \in \Delta$

■ Βασική μέθοδος επίλυσης

Ας δούμε λίγο την κατασκευή της λύσης της ομογενούς εξίσωσης. Θα σχηματίσουμε παράγωγο γινομένου στο 1ο μέλος της, χρησιμοποιώντας τον παράγοντα $e^{\int p(x) dx}$ με $a \in \Delta$. Πολλαπλασιάζοντας έχουμε

$$\begin{aligned} e^{\int p(x) dx} y' + e^{\int p(x) dx} p(x) y &= 0 \Leftrightarrow \\ \left(e^{\int p(x) dx} y \right)' &= 0 \Leftrightarrow e^{\int p(x) dx} y = c \end{aligned}$$

όπου c μια σταθερά. Έτσι, σύμφωνα με την τελευταία σχέση η γενική λύση της (2.20) θα δίνεται από τον τύπο:

$$y(x) = c e^{-\int p(x) dx} \quad (2.21)$$

Χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική ώστε να κατασκευάσουμε και τη λύση της μη ομογενούς διαφορικής εξίσωσης (2.20). Ο πολλαπλασιασμός με τον ίδιο ολοκληρωτικό παράγοντα θα μας δώσει

$$\begin{aligned} e^{\int p(x) dx} y' + e^{\int p(x) dx} p(x) y &= q(x) e^{\int p(x) dx} \Leftrightarrow \\ \left(e^{\int p(x) dx} y \right)' &= q(x) e^{\int p(x) dx} \Leftrightarrow \\ e^{\int p(x) dx} y &= \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + c \Leftrightarrow \\ y(x) &= e^{-\int p(x) dx} \left[c + \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx \right] \end{aligned} \quad (2.22)$$

► **Παράδειγμα 2.10 :** Ομογενής γραμμική εξίσωση 1ης τάξης
Να βρεθεί η γενική λύση της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$xy' - y = 0$$

και στη συνέχεια, με αρχική συνθήκη της $y(1) = -2$ να βρεθεί η ειδική λύση.

✓ **ΛΥΣΗ**

Η αρχική εξίσωση γράφεται στη μορφή

$$y' - \frac{1}{x} y = 0 \quad (2.23)$$


για κάθε $x \neq 0$. Έχοντας λοιπόν $p(x) = -\frac{1}{x}$ και $q(x) = 0$, η γενική λύση (2.21) της εξίσωσης θα δίνεται από τον τύπο

$$y(x) = c e^{-\int -\frac{1}{x} dx} = c e^{\ln x} = cx$$

όπου c μια αυθαίρετη σταθερά. Στο 2.7 δείχνουμε τα γραφήματα κάποιων λύσεων της (2.20) που αντιστοιχούν σε διάφορες τιμές της σταθεράς c . Σύμφωνα τώρα με την αρχική συνθήκη έχουμε

$$y(1) = -2 \Rightarrow c = -2$$

έτσι η λύση του Π.Α.Τ. θα είναι η $y(x) = -2x$.



Σχήμα 2.7: Λύσεις της εξίσωσης (2.23)

► **Παράδειγμα 2.11 :** Μη ομογενής γραμμική εξίσωση 1ης τάξης
Βρείτε τη γενική λύση της ακόλουθης γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$x^2 y' + xy = 1, \quad x > 0 \quad (2.24)$$


✓ **ΛΥΣΗ**

Η εξίσωση, για κάθε $x > 0$ γράφεται στη μορφή

$$x^2 y' + xy = 1 \Leftrightarrow y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}$$

οπότε και έχουμε $p(x) = \frac{1}{x}$ και $q(x) = \frac{1}{x^2}$. Η γενική λύση αυτής θα δίνεται από τον παρακάτω τύπο

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[c + \int \frac{1}{x^2} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx \right] = \\ &= e^{-\ln x} \left(c + \int \frac{1}{x^2} e^{\ln x} dx \right) = \\ &= \frac{1}{x} \left(c + \int \frac{1}{x} dx \right) = \\ &= \frac{c + \ln x}{x} \end{aligned}$$



Σχήμα 2.8: Ολοκληρωτικές καμπύλες της εξίσωσης (2.24)

όπου c μια αυθαίρετη σταθερά. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε τις ολοκληρωτικές καμπύλες μερικών ειδικών λύσεων της εξίσωσης.

■ **Ομογενής γραμμική - Μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών**

Εύκολα παρατηρούμε ότι μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση 1ης τάξης, μετατρέπεται σε εξίσωση χωριζομένων μεταβλητών. Εάν y είναι μια μη τετριμμένη λύση της εξίσωσης $y' + p(x)y = 0$ τότε έχουμε τα εξής:

$$\begin{aligned} y' + p(x)y &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow y' &= -p(x)y \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= -p(x)y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -p(x) dx \Rightarrow \end{aligned}$$

Έτσι σύμφωνα με όσα αναπτύξαμε στην παράγραφο των διαφορικών εξισώσεων χωριζομένων μεταβλητών, από την τελευταία σχέση παίρνουμε

$$\begin{aligned} \ln |y| &= -\int p(x) dx + c \Rightarrow |y| = ce^{-\int p(x) dx} \Rightarrow \\ &\xrightarrow[y \neq 0]{y \in C(\Delta)} y = \pm ce^{-\int p(x) dx} \end{aligned}$$


για κάθε $x \in \Delta$. Ας δούμε τώρα στο επόμενο παράδειγμα τον εναλλακτικό αυτό τρόπο επίλυσης.

► **Παράδειγμα 2.12 :** Ομογενής εξίσωση - Επίλυση με ολοκλήρωση
Ζητείται η γενική λύση της γραμμικής διαφορικής εξίσωσης

$$y' + 2xy = 0$$

όπου $y > 0$ και $x \in \mathbb{R}$.

✓ **ΛΥΣΗ**



Σχήμα 2.9: Μερικές λύσεις της εξίσωσης $y' + 2xy = 0$.

Καθώς έχουμε $y > 0$ τότε αναζητούμε μη τετριμμένες λύσεις της εξίσωσης. Με διαχωρισμό των μεταβλητών έχουμε:

$$\begin{aligned} y' + 2xy &= 0 \Leftrightarrow y' = -2xy \Leftrightarrow \\ \frac{dy}{dx} &= -2xy \Leftrightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -2x dx + c_1 \Leftrightarrow \\ \ln y &= -x^2 + c_1 \Leftrightarrow y = e^{-x^2+c_1} \Leftrightarrow \\ y &= ce^{-x^2} \end{aligned}$$

όπου $c_1, c = e^{c_1}$ αυθαίρετες σταθερές.

■ Πρόβλημα αρχικών τιμών

Στην περίπτωση ενός προβλήματος αρχικών τιμών, με αρχική συνθήκη $y(a) = y_0$ εύκολα βλέπουμε ότι $c = y_0$, ο ολοκληρωτικός παράγοντας θα έχει τη μορφή $e^{\int_a^x p(t) dt}$ και άρα οι τύποι (2.21) και (2.22) για τη λύση του γράφονται

$$y(x) = y_0 e^{-\int_a^x p(t) dt}, \quad y(x) = e^{-\int_a^x p(t) dt} \left[y_0 + \int_a^x q(t) e^{\int_a^t p(s) ds} dt \right] \quad (2.25)$$


► **Παράδειγμα 2.13 :** Μη ομογενής γραμμική εξίσωση 1ης τάξης - Π.Α.Τ.
Βρείτε τη λύση του παρακάτω προβλήματος αρχικών τιμών.

$$\begin{cases} y' + y = x^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

✓ ΛΥΣΗ

Η εξίσωση έχει ήδη τη μορφή (2.20) με $p(x) = 1$ και $q(x) = x^2$. Η λύση της εξίσωσης, σύμφωνα με τον τύπο (2.25)β είναι:

$$\begin{aligned} y(x) &= e^{-\int_0^x dt} \left[y(0) + \int_0^x t^2 e^{\int_0^t ds} dt \right] = \\ &= e^{-x} \left(1 + \int_0^x t^2 e^t dt \right) = \\ &= e^{-x} [1 + (x^2 - 2x + 2)e^x - 2] = \\ &= -e^{-x} + x^2 - 2x + 2 \end{aligned}$$



Σχήμα 2.10: Λύση του προβλήματος αρχικών τιμών.

2.5 Εξισώσεις Bernoulli - Ricatti

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε δύο ειδικές, μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης, τις εξισώσεις Bernoulli και Ricatti. Οι ειδικές αυτές μορφές σχετίζονται άμεσα με τις γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης καθώς η μεν Ricatti μετασχηματίζεται σε Bernoulli, η δε Bernoulli με τη σειρά της μετατρέπεται σε γραμμική 1ης τάξης.

Ορισμός 2.5 : Διαφορική εξίσωση Bernoulli

Κάθε διαφορική εξίσωση 1ης τάξης της μορφής

$$y' + p(x)y = q(x)y^\sigma(x) \quad (2.26)$$

με $x \in \Delta \subseteq \mathbb{R}$ και $\sigma \in \mathbb{R}$, ονομάζεται εξίσωση Bernoulli.

Στην ειδική περίπτωση όπου $\sigma = 1$ η (2.26) είναι μια ομογενής γραμμική διαφορική εξίσωση, ενώ για $\sigma = 0$ παίρνουμε την αντίστοιχη μη γραμμική,

i Παρατήρηση

Μια διαφορική εξίσωση Bernoulli έχει τετριμμένη

τις οποίες μελετήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Η αναγωγή της σε γραμμική 1ης τάξης επιτυγχάνεται με τον ακόλουθο μετασχηματισμό

$$z = y^{1-\sigma} \quad (2.27)$$

Παραγωγίζοντας παίρνουμε

$$z' = (1-\sigma)y^{-\sigma}y' \Rightarrow y^{-\sigma}y' = \frac{z'}{1-\sigma}$$

Πολλαπλασιάζουμε στη συνέχεια την (2.26) με $y^{-\sigma}$ και αντικαθιστώντας τις σχέσεις αυτές προκύπτει

$$y^{-\sigma}y' + p(x)y^{1-\sigma} = q(x) \Leftrightarrow \frac{z'}{1-\sigma} + p(x)z = q(x) \Leftrightarrow z' + (1-\sigma)p(x)z = (1-\sigma)q(x)$$

και καταλήξαμε στη ζητούμενη γραμμική. Επιλύουμε τη γραμμική και χρησιμοποιώντας ξανά τον μετασχηματισμό (2.27) οδηγούμαστε στην λύση $y(x)$ της αρχικής εξίσωσης.

► **Παράδειγμα 2.14 :** Εξίσωση Bernoulli
Να λύσετε την εξίσωση

$$y' - \frac{1}{x}y = y^3, \quad x < 0$$

✓ ΛΥΣΗ

Η αρχική διαφορική εξίσωση είναι Bernoulli με $\sigma = 3$, $p(x) = -\frac{1}{x}$ και $q(x) = 1$. Χρησιμοποιούμε το μετασχηματισμό

$$z = y^{1-3} = y^{-2}$$

από τον οποίο παραγωγίζοντας παίρνουμε


$$z' = -2y^{-3}y' \Rightarrow y^{-3}y' = \frac{z'}{2}$$

Πολλαπλασιάζουμε στη συνέχεια την αρχική εξίσωση με y^{-3} και αντικαθιστούμε τα παραπάνω οπότε παίρνουμε

$$y^{-3}y' - \frac{1}{x}y^{-2} = 1 \Rightarrow \frac{z'}{2} - \frac{1}{x}z = 1 \Rightarrow z' - \frac{2}{x}z = 2$$

Η τελευταία είναι γραμμική 1ης τάξης και σύμφωνα με τη σχέση (2.22) η γενική της λύση θα δίνεται από τον τύπο

$$\begin{aligned} z(x) &= e^{\int \frac{2}{x} dx} \left[c + \int 2e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx \right] = \\ &= e^{2 \ln x} \left[c + \int 2e^{-2 \ln x} dx \right] = \\ &= x^2 \left(c + \int \frac{2}{x^2} dx \right) = \end{aligned}$$



$$= x^2 \left(c - \frac{2}{x} \right) = cx^2 - 2x$$

Τέλος, χρησιμοποιώντας ξανά τον αρχικό μετασχηματισμό θα έχουμε

$$z = cx^2 - 2x \Rightarrow y^{-2} = cx^2 - 2x \Rightarrow$$

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{cx^2 - 2x}}$$

όπου c αυθαίρετη σταθερά.

► Παράδειγμα 2.15 :

$$y' = -\frac{y^2 + e^x}{2xy}$$

✓ ΛΥΣΗ

Ορισμός 2.6 : Διαφορική εξίσωση Ricatti

$$y' = a(x)y^2 + \beta(x)y + \gamma(x) \quad (2.28)$$

Παρατηρούμε ότι αν $\gamma(x) \equiv 0$, η (2.28) αποτελεί διαφορική εξίσωση Bernoulli με $\sigma = 2$ ενώ για $\beta(x) \equiv 0$ έχουμε μια γραμμική διαφορική εξίσωση 1ης τάξης. Η βασική μέθοδος επίλυσης μιας διαφορικής εξίσωσης Ricatti θέλει να γνωρίζουμε μία μερική λύση της εξίσωσης, έστω $y_1(x)$. Με τη χρήση αυτής και το μετασχηματισμό

$$y = y_1 + w$$

η (2.28) μετατρέπεται σε διαφορική εξίσωση Bernoulli. Παραγωγίζοντας έχουμε $y' = y_1' + w'$ και με αντικατάσταση παίρνουμε

$$\begin{aligned} y_1' + w' &= a(y_1 + w)^2 + \beta(y_1 + w) + \gamma \Leftrightarrow \\ y_1' + w' &= ay_1^2 + 2ay_1w + aw^2 + \beta y_1 + \beta w + \gamma \Leftrightarrow \\ (ay_1^2 + \beta y_1 + \gamma) + w' &= aw^2 + 2ay_1w + \beta w + (ay_1^2 + \beta y_1 + \gamma) \Leftrightarrow \\ w' - (2ay_1 + \beta)w &= aw^2 \end{aligned} \quad (2.29)$$

Η Bernoulli στην οποία καταλήξαμε έχει $\sigma = 2$. Σύμφωνα με όσα μελετήσαμε προηγουμένως, ο μετασχηματισμός

$$z = w^{1-2} = \frac{1}{w}$$

θα μετατρέψει την (2.29) σε γραμμική. Έχουμε $z' = -\frac{w'}{w^2}$ άρα

$$\begin{aligned} w' - (2ay_1 + \beta)w &= aw^2 \Leftrightarrow \frac{w'}{w^2} - (2ay_1 + \beta)\frac{1}{w} = a \Leftrightarrow \\ z' + (2ay_1 + \beta)z &= -a \end{aligned}$$

Η τελευταία έχει γενική λύση την

$$z(x) = e^{-\int p(x) dx} \left(c - \int a(x)e^{\int p(x) dx} dx \right) \quad (2.30)$$

όπου $p(x) = 2a(x)y_1(x) + \beta(x)$. Αντικαθιστούμε ξανά στην τελευταία σχέση $z = \frac{1}{w} = \frac{1}{y - y_1}$ και οδηγούμαστε στην γενική λύση της (2.28). Παρατηρούμε

ότι εάν συνδυάσουμε τους δύο μετασχηματισμούς μπορούμε να μεταβούμε κατευθείαν από την εξίσωση Ricatti στην τελική γραμμική διαφορική εξίσωση και στη γενική λύση της, μέθοδο την οποία θα ακολουθήσουμε, με τον άμεσο μετασχηματισμό

$$y = y_1 + \frac{1}{z}$$

παρακάμπτοντας την ενδιάμεση (2.26).

► Παράδειγμα 2.16 :

$$y' = xy^2 - y + e^x$$

✓ ΛΥΣΗ

Εάν όπως είδαμε θέσουμε $y = y_1 + \frac{1}{z}$...

| ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Ενότητα 2.5

2.5 Δείξτε ότι η ομογενής διαφορική εξίσωση του παραδείγματος 2.9 αποτελεί και εξίσωση Bernoulli και στη συνέχεια βρείτε τη γενική λύση της.

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεζεττενερ αδιπιςινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπιςινγ ιταε, φελις. ύραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμψ εγετ, ζονσεζεττενερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες ηχιςυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενε-ςτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. "ρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεςτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριςες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαζυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριςες βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσυαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. ύραβιτυρ αυςτορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριςυ ορςι εγετ ριςυς. Δυις νιβη μι, ζονγυε ευ, αςζυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορςι σιτ αμετ ορςι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυςτορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαςυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτρι-ςιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςζυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορςι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. "ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. ύμ σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, ναςζετυρ ριδι-ςυλυς μυς. Αλιχυαμ τινςιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμςορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ζυρςυς λςζτυς μαυρις.

2.6 Περιοδικές εξισώσεις

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεζεττενερ αδιπιςινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπιςινγ ιταε, φελις. ύραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμψ εγετ, ζονσεζεττενερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα.

Δονες επιζυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενε-
 ζτυς ετ νετυς ετ μαλεσουαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. "ρας
 ιερρα μετυς ρηονζυς σεμ. Νυλλα ετ λεζτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριζες.
 Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ,
 ιαζυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγет σεμ ελ λεο υλτριζες
 βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσουαδα ευ, πυλιναρ ατ,
 μολλις ας, νυλλα. Ύραβιτυρ αυστορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορσι εγет ρισυς.
 Δυις νιβη μι, ζονγυε ευ, αςζυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγет ορσι
 σιτ αμετ ορσι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι
 αυστορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαζυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτρι-
 ζιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςζυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα
 αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορσι ετ νιολ ηενδρεριτ
 μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. "ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. Ύμ
 σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, νασζετυρ ριδι-
 ζυλυς μυς. Αλιχυαμ τινζιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυρπις.
 Πελλεντεσχυε ζυρσυς λυζτυς μαυρις.

2.7 Ιδιάζουσες λύσεις

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεζεττευερ αδιπισινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ,
 εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπισινγ ιταε, φελις. Ύραβιτυρ διςτυμ γραιδα
 μαυρις. Ναμ αρζυ λιβερο, νονυμψ εγет, ζονσεζεττευερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα.
 Δονες επιζυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενε-
 ζτυς ετ νετυς ετ μαλεσουαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. "ρας
 ιερρα μετυς ρηονζυς σεμ. Νυλλα ετ λεζτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριζες.
 Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ,
 ιαζυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγет σεμ ελ λεο υλτριζες
 βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσουαδα ευ, πυλιναρ ατ,
 μολλις ας, νυλλα. Ύραβιτυρ αυστορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορσι εγет ρισυς.
 Δυις νιβη μι, ζονγυε ευ, αςζυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγет ορσι
 σιτ αμετ ορσι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι
 αυστορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαζυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτρι-
 ζιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςζυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα
 αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορσι ετ νιολ ηενδρεριτ
 μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. "ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. Ύμ
 σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, νασζετυρ ριδι-
 ζυλυς μυς. Αλιχυαμ τινζιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυρπις.
 Πελλεντεσχυε ζυρσυς λυζτυς μαυρις.

2.8 Μέθοδος ολοκλήρωσης με παραγωγήιση

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεζεττευερ αδιπισινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ,
 εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπισινγ ιταε, φελις. Ύραβιτυρ διςτυμ γραιδα
 μαυρις. Ναμ αρζυ λιβερο, νονυμψ εγет, ζονσεζεττευερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα.
 Δονες επιζυλα αυγυε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενε-
 ζτυς ετ νετυς ετ μαλεσουαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. "ρας
 ιερρα μετυς ρηονζυς σεμ. Νυλλα ετ λεζτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριζες.
 Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ,
 ιαζυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγет σεμ ελ λεο υλτριζες

βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσυαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. ΰραβιτυρ αυστορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορσι εγετ ρισυς. Δυις νιβη μι, ζονγυε ευ, αςζυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορσι σιτ αμετ ορσι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυστορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαζυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτρι-
 ριες ετ, τελλυς. Δονες αλιχует, тортор сеδ аςζυμσαν βιβενδυμ, ерат λιγυλα αλιχует μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορσι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. “ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. ΰμ σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριενт μοντες, νασζετυρ ριδι-
 ζυλυς μυς. Αλιχυαμ тινцидунт урна. Нуλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ζυρсуς λυζтыς μαυρις.

2.8.1 Εξίσωση D’ Alambert

Λορεμ ιψυμ δολορ σιτ αμεт, ζονσεζετетуер αδιπισινγ ελιт. Υт πυρυς ελιт, εστιβυλυμ υт, πλαζεραт аς, αδιπισινγ ιтае, фелиς. ΰραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ арсу λιβερο, νонυμф еγεт, ζονσεζετетуер ιδ, υлпутате α, μαγνα. Δονες епизула ауγυе ευ νεχυе. Πελλεντεсχυе ηαβιτανт μορβι τριστιχυе сене-
 ζтыς εт νεтыς εт μαλεсуаδα φαμες аς τυрπις еγεсτας. Μαυρις υт лео. “ρας ιερра μεтыς ρηонзυς σεμ. Нуλλα εт лезтыς εστιβυλυμ урна φρινγίλλα υлтризес. Πηασελλυς ευ τελλυς σιт αμεт тортор γραιδα πλαζεραт. Ιντεγερ сапиен ест,
 ιαζυλις ιν, πρετιυμ χυиς, ιερра аς, νυνς. Праесент егет сеμ ел лео υлтризес βιβенδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεсуаδα ευ, πυλιναρ ат, μολλις аς, νυλλα. ΰραβιτυρ αυστορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορσι егет ρисυς. Δυиς νιβη μι, ζонгυе ευ, аςζυμσαν ελειφенд, саγιттиς χυиς, διαμ. Δυиς егет ορси σιт αμεт ορси διγνиссиμ ρυтρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυστορ λορεμ νон θυστο. Ναμ λαζυς λιβερο, πρετιυμ αт, λοβορτις ιтае, υлтри-
 ρиес εт, τελλυς. Δονες αλιχует, тортор сеδ аςζυμσαν βιβенδυμ, ерат λιγυλα αλιχует μαγνα, ιтае ορναρε οδιο μεтыς α μι. Μορβι аς ορси εт νисл ηендρεριт μολλις. Συсπενдиссе υт μασσα. “ρας νες αντε. Πελλентесχυе α νυλλα. ΰμ σοσις νατοχυе πενατιβυς εт μαгνις δις παρτυριент μοντες, νасζετυρ ρиди-
 ζулыς μυς. Αλιχυαμ тинцидунт урна. Нуλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυрπις. Πελλентесχυе ζυρсуς λυзтыς μαυρις.

2.8.2 Εξίσωση Lagrange

2.8.3 Εξίσωση Clairaut

2.8.4 Νόμοι Kepler

2.9 Αντικατάσταση

Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης

- 3.1 Γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές
- 3.2 Εξίσωση Euler
- 3.3 Υποβιβασμός τάξης
- 3.4 Ολοκληρωτική καμπύλη
- 3.5 Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις
- 3.6 Ομογενείς εξισώσεις
- 3.7 Θεωρήματα διαχωρισμού και σύγκρισης Sturm
- 3.8 Μη ομογενείς εξισώσεις
- 3.9 Μέθοδος Lagrange
- 3.10 Δυναμοσειρές

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 3.1 Γραμμικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές
- 3.2 Εξίσωση Euler
- 3.3 Υποβιβασμός τάξης
- 3.4 Ολοκληρωτική καμπύλη
- 3.5 Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις
- 3.6 Ομογενείς εξισώσεις
- 3.7 Θεωρήματα διαχωρισμού και σύγκρισης Sturm
- 3.8 Μη ομογενείς εξισώσεις
- 3.9 Μέθοδος Lagrange
- 3.10 Δυναμοσειρές



Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις

4.1 Ομογενείς εξισώσεις

Λορεμ ιπσυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεστεττερ αδιπισινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπισινγ ιταε, φελις. ΰραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμψ εγετ, ζονσεστεττερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες ηηισυλα αυγνε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενε-ςτυς ετ νετυς ετ μαλεσυαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. ΄ρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεςτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριςες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιασυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριςες βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσυαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. ΰραβιτυρ αυςτορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορσι εγετ ριςυς. Δυις νιβη μι, ζονγνε ευ, αςζυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορσι σιτ αμετ ορσι διγνισσιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυςτορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαςυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτρι-ςιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςζυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορσι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. ΄ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. ΰμ σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, ναςςετυρ ριδι-ςυλυς μυς. Αλιχυαμ τινςιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ζυρςυς λςτυς μαυρις.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 4.1 Ομογενείς εξισώσεις
- 4.2 Γραμμική ανεξαρτησία - Ορίζουσα Wronski
- 4.3 Βασικά σύνολα λύσεων
- 4.4 Υποβιβασμός τάξης
- 4.5 Μη ομογενείς εξισώσεις - Μερικές λύσεις
- 4.6 Μέθοδος μεταβολής σταθερών
- 4.7 Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές
- 4.8 Εξισώσεις με μεταβλητούς συντελεστές
- 4.9 Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις και συζυγείς
- 4.10 Μέθοδος απροσδιόριστων συντελεστών
- 4.11 Μετασχηματισμός $Y' = gY$
- 4.12 Δυναμοσειρές
- 4.13 Ειδικές συναρτήσεις
- 4.14 Μέθοδος μεταβολής σταθερών

Νυλλα μαλεσναδα πορττιτορ διαμ. Δονες φελις ερατ, ζονγυε νον, ολυτπατ
ατ, τινζιδυντ τριστιχυε, λιβερο. Ίαμυς ιερρα φερμεντυμ φελις. Δονες νονυμψ
πελλεντεσχυε αντε. Πηασελλυς αδιπισζινγ σεμπερ ελιτ. Προιν φερμεντυμ
μασσα ας χυαμ. Σεδ διαμ τυρπις, μολεστιε ιταε, πλαζερατ α, μολεστιε νες, λεο.
Μαεζενας λασινια. Ναμ ιψυμ λιγυλα, ελειφενδ ατ, αςζυμσαν νες, συςσιπιτ
α, ιψυμ. Μορβι βλανδιτ λιγυλα φευγιατ μαγνα. Νυνς ελειφενδ ζονσεχυατ
λορεμ. Σεδ λασινια νυλλα ιταε ενιμ. Πελλεντεσχυε τινζιδυντ πυρυς ελ μαγνα.
Ιντεγερ νον ενιμ. Πραεσεντ ευισμοδ νυνς ευ πυρυς. Δονες βιβενδυμ χυαμ ιν
τελλυς. Νυλλαμ ζυρσυς πυλιναρ λεςτυς. Δονες ετ μι. Ναμ υλπυτατε μετυς ευ
ενιμ. Ξοτιβυλυμ πελλεντεσχυε φελις ευ μασσα.

4.2 Γραμμική ανεξαρτησία - Ορίζουσα Wronski

4.3 Βασικά σύνολα λύσεων

4.4 Υποβιβασμός τάξης

4.5 Μη ομογενείς εξισώσεις - Μερικές λύσεις

4.6 Μέθοδος μεταβολής σταθερών

4.7 Εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές

4.8 Εξισώσεις με μεταβλητούς συντελεστές

4.9 Ομογενείς διαφορικές εξισώσεις και συζυγείς

4.10 Μέθοδος απροσδιόριστων συντελεστών

4.11 Μετασχηματισμός $Y' = gY$

4.12 Δυναμοσειρές

4.12.1 Taylor

4.12.2 Mc Laurin

4.12.3 Frobenius

4.12.4 Fuchs

4.13 Ειδικές συναρτήσεις

4.14 Μέθοδος μεταβολής σταθερών

4.15 Μέθοδος διαφορικών τελεστών

4.16 Μέθοδος προσδιορισμού συντελεστών

4.17 Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών

4.18 Sturm - Liouville



Συστήματα διαφορικών εξισώσεων

5.1 Ομογενή γραμμικά συστήματα

Λορεμ ιψυμ δολορ σιτ αμετ, ζονσεσζεττενερ αδιπισινγ ελιτ. Υτ πυρυς ελιτ, εστιβυλυμ υτ, πλασερατ ας, αδιπισινγ ιταε, φελις. ΰραβιτυρ διςτυμ γραιδα μαυρις. Ναμ αρςυ λιβερο, νονυμψ εγετ, ζονσεσζεττενερ ιδ, υλπυτατε α, μαγνα. Δονες ηηςυλα αυγνε ευ νεχυε. Πελλεντεσχυε ηαβιταντ μορβι τριστιχυε σενε-ζτυς ετ νετυς ετ μαλεσουαδα φαμες ας τυρπις εγεστας. Μαυρις υτ λεο. ΄ρας ιερρα μετυς ρηονςυς σεμ. Νυλλα ετ λεςτυς εστιβυλυμ υρνα φρινγίλλα υλτριςες. Πηασελλυς ευ τελλυς σιτ αμετ τορτορ γραιδα πλασερατ. Ιντεγερ σαπιεν εστ, ιαςυλις ιν, πρετιυμ χυις, ιερρα ας, νυνς. Πραεσεντ εγετ σεμ ελ λεο υλτριςες βιβενδυμ. Αενεαν φαυσιβυς. Μορβι δολορ νυλλα, μαλεσουαδα ευ, πυλιναρ ατ, μολλις ας, νυλλα. ΰραβιτυρ αυςτορ σεμπερ νυλλα. Δονες αριυς ορςι εγετ ριςυς. Δυις νιβη μι, ζονγνε ευ, αςςυμσαν ελειφενδ, σαγιττις χυις, διαμ. Δυις εγετ ορςι σιτ αμετ ορςι διγνισισιμ ρυτρυμ.

Ναμ δυι λιγυλα, φρινγίλλα α, ευισμοδ σοδαλες, σολλιςιτυδιν ελ, ωισι. Μορβι αυςτορ λορεμ νον θυστο. Ναμ λαςυς λιβερο, πρετιυμ ατ, λοβορτις ιταε, υλτρι-ςιες ετ, τελλυς. Δονες αλιχυετ, τορτορ σεδ αςςυμσαν βιβενδυμ, ερατ λιγυλα αλιχυετ μαγνα, ιταε ορναρε οδιο μετυς α μι. Μορβι ας ορςι ετ νισλ ηενδρεριτ μολλις. Συσπενδισσε υτ μασσα. ΄ρας νες αντε. Πελλεντεσχυε α νυλλα. ΰμ σοσις νατοχυε πενατιβυς ετ μαγνις δις παρτυριεντ μοντες, ναςζετυρ ριδι-ςυλυς μυς. Αλιχυαμ τινςιδυντ υρνα. Νυλλα υλλαμζορπερ εστιβυλυμ τυρπις. Πελλεντεσχυε ζυρςυς λςτυς μαυρις.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

- 5.1 Ομογενή γραμμικά συστήματα
- 5.2 Πίνακες λύσεων - Τύπος Jacobi
- 5.3 Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας - Ανάλυση πινάκων
- 5.4 Βασικοί πίνακες - Σύνολα λύσεων
- 5.5 Υποβιβασμός τάξης
- 5.6 Μη ομογενή γραμμικά συστήματα - Μερικές λύσεις
- 5.7 Ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελεστές
- 5.8 Μέθοδος απαλοιφής
- 5.9 Ευστάθεια συστημάτων
- 5.10 Μέθοδος πινάκων
- 5.11 Πρώτα ολοκληρώματα
- 5.12 Γεωμετρικές ερμηνείες συστημάτων διαφορικών εξισώσεων
- 5.13 Διαφορικοί τελεστές

Νυλλα μαλεσναδα πορττιτορ διαμ. Δονες φελις ερατ, ζονγυε νον, ολυτπατ
ατ, τινζιδυντ τριστιχυε, λιβερο. Ίαμυς ιερρα φερμεντυμ φελις. Δονες νονυμψ
πελλεντεσχυε αντε. Πηασελλυς αδιπισζινγ σεμπερ ελιτ. Προιν φερμεντυμ
μασσα ας χυαμ. Σεδ διαμ τυρπις, μολεστιε ιταε, πλαζερατ α, μολεστιε νες, λεο.
Μαεζενας λασινια. Ναμ ιπσυμ λιγυλα, ελειφενδ ατ, αςζυμσαν νες, συσσιπιτ
α, ιπσυμ. Μορβι βλανδιτ λιγυλα φευγιατ μαγνα. Νυνς ελειφενδ ζονσεχυατ
λορεμ. Σεδ λασινια νυλλα ιταε ενιμ. Πελλεντεσχυε τινζιδυντ πυρυς ελ μαγνα.
Ιντεγερ νον ενιμ. Πραεσεντ ευισμοδ νυνς ευ πυρυς. Δονες βιβενδυμ χυαμ ιν
τελλυς. Νυλλαμ ζυρσυς πυλιναρ λεςτυς. Δονες ετ μι. Ναμ υλπυτατε μετυς ευ
ενιμ. Ξοστιβυλυμ πελλεντεσχυε φελις ευ μασσα.

5.2 Πίνακες λύσεων - Τύπος Jacobi

5.3 Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας - Ανάλυση πινάκων

5.4 Βασικοί πίνακες - Σύνολα λύσεων

5.5 Υποβιβασμός τάξης

5.6 Μη ομογενή γραμμικά συστήματα - Μερικές λύσεις

5.7 Ομογενή γραμμικά συστήματα με σταθερούς συντελε- στές

5.8 Μέθοδος απαλοιφής

5.9 Ευστάθεια συστημάτων

5.10 Μέθοδος πινάκων

5.11 Πρώτα ολοκληρώματα

5.12 Γεωμετρικές ερμηνείες συστημάτων διαφορικών εξι- σώσεων

5.13 Διαφορικοί τελεστές

5.14 Μέθοδος εκθετικής αντικατάστασης

5.15 Μέθοδος κανονικών συντεταγμένων

5.16 Μέθοδος τελεστή εξέλιξης