

# ERRATUM: "THE X-RAY AND MID-INFRARED LUMINOSITIES IN LUMINOUS TYPE 1 QUASARS"

CHIEN-TING J. CHEN(陳建廷)<sup>1,2</sup>, RYAN C. HICKOX<sup>2</sup>, ANDREW D. GOULDING<sup>3</sup>, DANIEL STERN<sup>4</sup>, ROBERTO ASSEF<sup>5</sup>,  
 CHRISTOPHER S. KOCHANÉK<sup>6</sup>, MICHAEL J. I. BROWN<sup>7</sup>, CHRIS M. HARRISON<sup>8</sup>, KEVIN N. HAINLINE<sup>2,9</sup>, STACEY ALBERTS<sup>9</sup>,  
 DAVID M. ALEXANDER<sup>8</sup>, MARK BRODWIN<sup>10</sup>, AGNESE DEL MORO<sup>11</sup>, WILLIAM R. FORMAN<sup>12</sup>, VAROUJAN GORJIAN<sup>4</sup>,  
 CHRISTINE JONES<sup>12</sup>, STEPHEN S. MURRAY<sup>12</sup>, ALEXANDRA POPE<sup>13</sup>, AND EMMANOUEL ROVILOS<sup>8</sup>

*Keywords:* errata

In Chen et al. (2017), Equation (2) presents the parameters for the best-fit  $L_X - L_{\text{MIR}}$  relation of the type 1 AGN sample culled from Boötes, *XMM*-COSMOS, and SDSS/XRT surveys; this did not include the XXL-North sample as discussed in Page 8–9. Here we report the updated Equation (2), with parameters for the data set including XXL-North, as the following:

$$\begin{aligned} \log L_{6\mu\text{m}}/\text{erg s}^{-1} &< 44.79 : \\ \log \frac{L_X}{\text{erg s}^{-1}} &= (0.84 \pm 0.03) \log \frac{L_{6\mu\text{m}}}{10^{45}\text{erg s}^{-1}} + 44.60 \pm 0.01 \\ \log L_{6\mu\text{m}}/\text{erg s}^{-1} &\geq 44.79 : \\ \log \frac{L_X}{\text{erg s}^{-1}} &= (0.40 \pm 0.03) \log \frac{L_{6\mu\text{m}}}{10^{45}\text{erg s}^{-1}} + 44.51 \pm 0.01, \end{aligned} \tag{1}$$

These parameters are now consistent with the numbers reported in the abstract and in Page 8–9 of Chen et al. (2017).

## REFERENCES

Chen, C.-T. J., Hickox, R. C., Goulding, A. D., et al. 2017, ApJ, 837, 145