MB120P163
Biostatistika
a plánování ekologických pokusů

Jak poznáme, že je model dobrý?

Podkladové čtenářské materiály k přednášce

21. října 2026

Obsah

1 Co už s daty umíme udělat? 2
2 Výsledky učení 2
3 Jeden řádek tabulky představuje jeden strom 2
4 Jak se výška mění s průměrem kmene? 7
5 Jak vztah popíšeme jedním lineárním modelem? 8
6 Co už umíme přečíst ze `summary()`? 10
7 Co model přehlíží? 10
8 Je jeden model jedinou rozumnou možností? 13
9 Tři modely vyjadřují tři biologické představy 13
10 Který model prochází nejblíže pozorovaným stromům? 14
11 Jak poznáme, který model je lepší? 14
12 Co už víme o residuích a jejich čtvercích? 15
13 Je přímka lepší než predikce průměrem? 16
14 Jak velké jsou rozdíly výšek před použitím prediktorů? 16
15 Kolik rozdílů zůstalo po odhadnutí přímky? 18
16 Jakou část variability zachytil model? 20
17 Dostaneme stejné R^2 také ze `summary()`? 21
18 Co nám R^2 říká — a co ne? 21
19 Proč R^2 po přidání členu neklesne? 22
20 Které koeficienty jednotlivé modely odhadují? 22
21 Stačí zlepšení R^2 na další koeficienty? 23
22 Kdy může adjustované R^2 klesnout? 24
23 Jak vyvážit shodu a jednoduchost modelu? 24
24 Jak AIC vyjadřuje úspornost modelu? 25
25 Co nám říkají rozdíly AIC mezi kandidáty? 25
26 Ukazují R^2, adjustované R^2 a AIC na stejný model? 27
27 Stačí dobré skóre k tomu, aby byl model dobrý? 27
28 Který model lze pro tyto stromy nejlépe obhájit? 32
29 Jak porovnávat modely bez automatického hledání? 33
30 Co bude následovat dál 33
31 Shrnutí 33
31.1 Závěrečná otázka 33

Slovníček pojmů 34

Hlavní otázka

Jaké důkazy potřebujeme, abychom mohli obhájit, že model je pro naši biologickou otázku dobrý?

1 Co už s daty umíme udělat?

Při analýze dat už umíme propojit několik kroků: data prohlédnout, zobrazit, položit biologickou otázku, odhadnout model, interpretovat jeho výstup a zkontrolovat jeho předpoklady.

Sestavte pracovní postup

V jakém pořadí byste použili kroky **prohlédnout data**, **zobrazit vztah**, **formulovat model**, **interpretovat výstup** a **zkontrolovat residua**? Než budete pokračovat, sestavte si vlastní pořadí.

Jedna obhajitelná cesta je položit biologickou otázku, prohlédnout a zobrazit data, formulovat model, interpretovat jeho výstup a zkontrolovat residua. Jednotlivé kroky se mohou opakovat: diagnostika nás například může vrátit k biologické otázce nebo k formulaci modelu. V této lekci známý postup použijeme na nový soubor dat a rozšíříme jej o porovnání několika modelů.

2 Výsledky učení

Po prostudování této lekce budete schopni:

- vypočítat koeficient determinace R^2 (*coefficient of determination*) z celkového součtu čtverců a součtu čtverců residuí a vysvětlit, co popisuje;
- vysvětlit, proč nejvyšší R^2 automaticky neznamená nejlepší model;
- rozlišit, jak R^2, adjustované R^2 (*adjusted R-squared*) a Akaikeho informační kritérium (*Akaike information criterion*, AIC) zacházejí se shodou a složitostí, a používat AIC jen k relativnímu porovnání modelů;
- sestavit malou sadu biologicky zdůvodněných kandidátních modelů se stejnou odezvou a stejnými pozorováními;
- obhájit volbu modelu pomocí biologické otázky, složitosti, diagnostiky a interpretovatelnosti a pojmenovat její omezení.

3 Jeden řádek tabulky představuje jeden strom

Budeme pracovat s měřením tří druhů severoamerických jehličnanů. Každý řádek dat představuje jeden strom. Pro tuto lekci využijeme druh stromu, průměr kmene měřený ve výšce 1,3 m a výšku

stromu. V minulé lekci výška stromu pomáhala odhadnout objem dřeva u jiných stromů; tady jde o jiné stromy a výška je naopak odezvou, kterou chceme popsat.

Soubor allometrie_stromu.csv je součástí materiálů lekce. Pro následující kód jej uložte do složky `data` ve svém projektu v R.

```
# Načteme výukovou tabulku stromů
data_stromy <-
  read.csv(file = "data/allometrie_stromu.csv")

# Druh stromu převedeme na kategoriální proměnnou
data_stromy$druh_stromu <-
  factor(x = data_stromy$druh_stromu)
```

Tabulka obsahuje 63 stromů a 3 druhy. Než začneme modelovat, zkontrolujeme několik řádků, strukturu proměnných, chybějící hodnoty a zastoupení druhů.

```
# Prohlédneme první řádky proměnných použitých v modelu
head(
  x = data_stromy[
    ,
    c(
      "druh_stromu",
      "prumer_kmene_cm",
      "vyska_stromu_m"
    )
  ],
  n = 6
)
```

```
            druh_stromu prumer_kmene_cm vyska_stromu_m
1 Pseudotsuga menziesii           54.61          27.04
2 Pseudotsuga menziesii           34.80          27.42
3 Pseudotsuga menziesii           24.89          21.23
4 Pseudotsuga menziesii           28.70          24.96
5 Pseudotsuga menziesii           34.80          29.99
6 Pseudotsuga menziesii           37.85          28.07
```

```
# Ověříme datové typy a počet chybějících hodnot
str(object = data_stromy)
```

```
'data.frame':   63 obs. of  5 variables:
 $ druh_stromu      : Factor w/ 3 levels "Pinus monticola",..: 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 ...
 $ prumer_kmene_cm  : num  54.6 34.8 24.9 28.7 34.8 ...
 $ vyska_stromu_m   : num  27 27.4 21.2 25 30 ...
 $ plocha_listu_m2  : num  338.49 122.16 3.96 86.35 63.35 ...
 $ hmotnost_vetvi_kg: num  410.25 83.65 3.51 73.13 62.39 ...
```

```
colSums(x = is.na(data_stromy))
```

```
      druh_stromu   prumer_kmene_cm    vyska_stromu_m   plocha_listu_m2
                0                 0                 0                 0
hmotnost_vetvi_kg
                0
```

```
# Zkontrolujeme počet stromů jednotlivých druhů
table(
  data_stromy$druh_stromu,
  useNA = "ifany"
)
```

```

      Pinus monticola       Pinus ponderosa Pseudotsuga menziesii
                   19                    22                    22
```

```
# Zkontrolujeme rozsahy průměru a výšky
range(
  x = data_stromy$prumer_kmene_cm,
  na.rm = TRUE
)
```

```
[1]  4.83 73.66
```

```
range(
  x = data_stromy$vyska_stromu_m,
  na.rm = TRUE
)
```

```
[1]  3.57 44.99
```

```
# Porovnáme rozsahy průměru kmene mezi druhy
tapply(
  X = data_stromy$prumer_kmene_cm,
  INDEX = data_stromy$druh_stromu,
  FUN = range,
  na.rm = TRUE
)
```

```
$`Pinus monticola`
[1]  6.48 73.66

$`Pinus ponderosa`
[1]  4.83 70.61

$`Pseudotsuga menziesii`
[1]  5.33 69.85
```

Průměry kmenů sahají od 4,8 do 73,7 cm a výšky od 3,6 do 45,0 m. Rozsahy průměru kmene jednotlivých druhů se překrývají, takže druhy můžeme porovnávat alespoň v části společného rozsahu. Hodnoty jsou pro měřené stromy věrohodné; nevidíme záporné hodnoty ani zjevnou chybu jednotek.

Doplňující: původ dat

Data pocházejí z objektu `allometry` v balíčku `lgrdata`, verze 0.1.1. Měření jsou připisována Johnu Marshallovi z University of Idaho a byla zveřejněna pod licencí CC0. Pokud je tato verze balíčku `lgrdata` nainstalovaná, původní tabulku lze načíst přímo z něj; není třeba stahovat ani rozbalovat archiv. Následující kód ověří verzi balíčku, načte původní tabulku, přejmenuje proměnné a uloží soubor použitý v této lekci.

```
# Ověříme verzi zdrojového balíčku
stopifnot(
  as.character(
    x = packageVersion(pkg = "lgrdata")
  ) == "0.1.1"
)

# Načteme původní objekt z balíčku
data(
```

```
  list = "allometry",
  package = "lgrdata"
)

data_allometry_source <- allometry

# Přeložíme zkratky druhů a vybereme výukové proměnné
vec_nazvy_druhu <-
  c(
    "PIMO" = "Pinus monticola",
    "PIPO" = "Pinus ponderosa",
    "PSME" = "Pseudotsuga menziesii"
  )

data_allometry_teaching <-
  data.frame(
    druh_stromu = unname(
      obj = vec_nazvy_druhu[
        as.character(x = data_allometry_source$species)
      ]
    ),
    prumer_kmene_cm = data_allometry_source$diameter,
    vyska_stromu_m = data_allometry_source$height,
    plocha_listu_m2 = data_allometry_source$leafarea,
    hmotnost_vetvi_kg = data_allometry_source$branchmass
  )

# Ověříme počet řádků a chybějící hodnoty
stopifnot(
  nrow(data_allometry_teaching) ==
    nrow(data_allometry_source),
  !anyNA(data_allometry_teaching)
)

# Uložíme stejnou tabulku, jakou načítá tato lekce
write.csv(
  x = data_allometry_teaching,
  file = "data/allometrie_stromu.csv",
  row.names = FALSE,
  fileEncoding = "UTF-8"
)
```

4 Jak se výška mění s průměrem kmene?


Vztah dvou numerických proměnných zobrazíme pomocí bodového grafu (anglicky scatter plot). Druh stromu rozlišuje barva i tvar bodu, ale každý bod stále představuje jeden konkrétní strom.

```
# Barvy a tvary druhů budeme používat stejně ve všech grafech
vec_barvy_druhu <-
  c(
    "Pinus monticola" = "#4E9A8A",
    "Pinus ponderosa" = "#C2613A",
    "Pseudotsuga menziesii" = "#2E6CA4"
  )

vec_symboly_druhu <-
  c(
    "Pinus monticola" = 16,
    "Pinus ponderosa" = 17,
    "Pseudotsuga menziesii" = 15
  )

# Zobrazíme vztah průměru kmene a výšky stromu
plot(
  x = data_stromy$prumer_kmene_cm,
  y = data_stromy$vyska_stromu_m,
  col = vec_barvy_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  pch = vec_symboly_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  cex = 1.2,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.2,
  xlab = "Průměr kmene ve výšce 1,3 m (cm)",
  ylab = "Výška stromu (m)"
)

legend(
  x = "bottomright",
  legend = names(vec_barvy_druhu),
  col = vec_barvy_druhu,
  pch = vec_symboly_druhu,
  text.font = 3,
  bty = "n"
)
```



Obrázek 1: Výška stromu v závislosti na průměru kmene. Barva a tvar bodu rozlišují druhy stromů.

Co vidíte v datech?

Popište nejsilnější společný vzorec a jednu vlastnost grafu, kvůli které by jediná přímka nemusela stačit.

Výška se s rostoucím průměrem kmene většinou zvětšuje. Barvy druhů však v některých částech grafu leží v odlišných výškových pásmech, takže jedna společná přímka může přehlížet rozdíly mezi druhy.


5 Jak vztah popíšeme jedním lineárním modelem?

Jako první pokus použijeme lineární model, který výšku všech stromů popíše jednou společnou přímkou. Odezvou je výška stromu a prediktorem je průměr kmene.

```
# Odhadneme jednu společnou přímku pro všechny stromy
mod_spolecny <-
  lm(
    formula = vyska_stromu_m ~ prumer_kmene_cm,
    data = data_stromy
  )
```

```r
# Přidáme odhadnutou přímku do grafu
plot(
  x = data_stromy$prumer_kmene_cm,
  y = data_stromy$vyska_stromu_m,
  col = vec_barvy_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  pch = vec_symboly_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  cex = 1.2,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.2,
  xlab = "Průměr kmene ve výšce 1,3 m (cm)",
  ylab = "Výška stromu (m)"
)

abline(
  reg = mod_spolecny,
  col = "#5D2890",
  lwd = 3
)
```



Tento model záměrně ignoruje druh stromu a popisuje všechny stromy jedinou přímkou.

6 Co už umíme přečíst ze `summary()`?

Výstup `summary()` obsahuje části, se kterými už umíme pracovat, i dva dosud nevysvětlené řádky. Prohlédněte si celý výpis a zkuste je rozlišit.

```
# Zobrazíme úplný souhrn odhadnutého modelu
summary(object = mod_spolecny)
```

```

Call:
lm(formula = vyska_stromu_m ~ prumer_kmene_cm, data = data_stromy)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-12.4226  -5.3191   0.7425   4.6637  10.5197

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      7.59674    1.47310   5.157 2.88e-06 ***
prumer_kmene_cm  0.51791    0.03647  14.201  < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 5.548 on 61 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7678,    Adjusted R-squared:  0.764
F-statistic: 201.7 on 1 and 61 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Známé a nové části výstupu

Které části výstupu už dokážete interpretovat? Které dva řádky zatím představují nové otázky?

Už umíme číst volání modelu, souhrn residuí a tabulku koeficientů s jejich nejistotou. Novými otázkami zůstává význam řádků **Multiple R-squared** a **Adjusted R-squared**.


7 Co model přehlíží?

Z předchozích lekcí už známe residua: rozdíly mezi pozorovanými a modelem odhadnutými hodnotami. Vhodný model by v nich neměl zanechávat snadno rozpoznatelný systematický vzorec. Zde se proto neptáme, co residuum znamená, ale zda společná přímka přehlíží rozdíl mezi druhy.

```
# Zobrazíme residua a zachováme barvy a tvary druhů
plot(
```

```
  x = fitted(object = mod_spolecny),
  y = residuals(object = mod_spolecny),
  col = vec_barvy_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  pch = vec_symboly_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  cex = 1.2,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.2,
  xlab = "Odhadnutá výška stromu (m)",
  ylab = "Residuum (m)"
)

abline(
  h = 0,
  col = "#2E2E2E",
  lty = 2
)
```




Obrázek 2: Residua společného modelu podle odhadnuté výšky. Barva a tvar bodu rozlišují druh stromu.

```
# Porovnáme residua s očekáváním normálního rozdělení
qqnorm(
```

```
  y = residuals(object = mod_spolecny),
  pch = 19,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.2,
  main = "Q–Q graf residuí",
  xlab = "Teoretické kvantily",
  ylab = "Kvantily residuí (m)"
)

qqline(
  y = residuals(object = mod_spolecny),
  col = "#2E2E2E",
  lwd = 2
)
```



Obrázek 3: Q–Q graf residuí společného modelu.

Detektivní práce s residui

Zůstává v residuích společného modelu rozdíl mezi druhy? Co by takový vzorec znamenal pro jednu společnou přímku?

Residua druhu *Pinus monticola* leží převážně nad nulou; jejich průměr je +2,7 m. Společná přímka tedy výšku tohoto druhu soustavně podhodnocuje a výšku ostatních dvou druhů spíše nadhodnocuje (průměrná residua −0,9 a −1,4 m). Takový vzorec v residuích ukazuje, že model přehlíží rozdíl mezi druhy.

8 Je jeden model jedinou rozumnou možností?

Společná přímka odpovídá jedné biologické představě: stejně silné stromy mají podle modelu stejnou odhadnutou výšku bez ohledu na druh. Pozorovaný graf a residua ale připouštějí také rovnoběžné přímky jednotlivých druhů nebo přímky s rozdílnými sklony.

9 Tři modely vyjadřují tři biologické představy

Každý kandidátní model vyjadřuje jinou představu o vztahu průměru kmene, druhu stromu a jeho výšky.

Kandidát	Vzorec v R	Biologická představa
Společná přímka	`vyska_stromu_m ~ prumer_kmene_cm`	Všechny druhy sdílejí stejný intercept i sklon.
Posun mezi druhy (aditivní model)	`vyska_stromu_m ~ prumer_kmene_cm + druh_stromu`	Druhy mohou mít odlišnou výšku při stejném průměru, ale sdílejí sklon.
Různé sklony (model s interakcí)	`vyska_stromu_m ~ prumer_kmene_cm * druh_stromu`	Vztah mezi průměrem a výškou se může mezi druhy lišit.


```
# Model 1: jedna společná přímka
mod_spolecny <-
  lm(
    formula = vyska_stromu_m ~ prumer_kmene_cm,
    data = data_stromy
  )

# Model 2: posun mezi druhy (rovnoběžné přímky druhů)
mod_aditivni <-
  lm(
    formula = vyska_stromu_m ~
      prumer_kmene_cm +
      druh_stromu,
    data = data_stromy
  )

# Model 3: různé sklony druhů
```

```
mod_interakce <-
  lm(
    formula = vyska_stromu_m ~
      prumer_kmene_cm *
      druh_stromu,
    data = data_stromy
  )
```

10 Který model prochází nejblíže pozorovaným stromům?



Obrázek 4: Stejná pozorování a tři kandidátní modely. Panely se liší pouze strukturou odhadnutých přímek.

Porovnejte vzdálenosti bodů od přímek

Ve kterém panelu zůstávají mezi pozorovanými body a odhadnutými přímkami nejkratší svislé vzdálenosti?

Podle obrázku procházejí pozorovaným bodům nejblíže přímky v panelu **Různé sklony**. Rozdíly mezi body a přímkami však chceme vyjádřit číslem, ne pouze odhadovat okem.

11 Jak poznáme, který model je lepší?

Při porovnání modelů potřebujeme rozlišit několik druhů důkazů:

- jak těsně model odpovídá pozorovaným datům;
- kolik parametrů potřebuje;
- zda v residuích nezůstává systematický vzorec;
- zda odpovídá biologické otázce;
- zda jeho výsledek dokážeme smysluplně interpretovat.

Žádné jediné číslo neodpoví na všechny tyto otázky.

12 Co už víme o residuích a jejich čtvercích?

Když jsme poprvé hledali přímku, porovnávali jsme kandidáty pomocí součtu čtverců residuí. V další lekci jsme stejnou veličinu označili anglickou zkratkou **RSS** (*residual sum of squares*) a použili ji při výpočtu residuální směrodatné odchylky. Při porovnání jednoho společného průměru s několika skupinovými průměry jsme také viděli, že složitější model může RSS zmenšit.

RSS proto není nový pojem. V této lekci jej spojíme s druhým součtem čtverců, který popisuje rozdíly mezi pozorovanými výškami ještě před použitím prediktorů.

Vzpomeňte si na význam RSS

Co se stane se součtem čtverců residuí, když odhadnutá přímka prochází blíže pozorovaným bodům?

Čím jsou residua kratší, tím menší jsou jejich čtverce i jejich součet. **Menší RSS proto znamená těsnější shodu modelu s pozorovanými daty.**

13 Je přímka lepší než predikce průměrem?


Než posoudíme odhadnutou přímku, potřebujeme jednoduchý výchozí způsob odhadu. Pokud bychom o jednotlivých stromech nevěděli nic dalšího, mohli bychom každému přiřadit průměrnou výšku. Tento průměrový model nám umožní popsat, jak moc se pozorované výšky liší ještě před použitím průměru kmene.

Následující výpočet používá šest skutečných stromů z datové tabulky. Malý výběr umožňuje vidět každý krok výpočtu. Hodnoty kandidátních modelů v dalších tabulkách vycházejí ze všech 63 stromů.

Strom	Průměr kmene (cm)	Výška (m)
A	54,61	27,04
B	43,69	31,83
C	22,35	19,39
D	20,83	23,34
E	11,94	5,85
F	73,66	44,64

14 Jak velké jsou rozdíly výšek před použitím prediktorů?

Průměrná výška šesti stromů je 25,35 m. Svislé úsečky ukazují odchylku každého pozorování od tohoto průměru.



Obrázek 5: Odchylky šesti pozorovaných výšek od jejich průměru (přerušovaná čára). Délky úseček jsou před umocněním kladné nebo záporné odchylky.

Kladné a záporné odchylky by se při prostém součtu vyrušily. Proto je umocníme na druhou a sečteme. Vznikne **celkový součet čtverců** (*total sum of squares*), tedy číselné vyjádření celkové variability pozorovaných výšek kolem jejich průměru.

Strom	Výška	Odchylka od průměru	Čtverec odchylky
A	27,04	1,69	2,86
B	31,83	6,48	42,01
C	19,39	−5,96	35,50
D	23,34	−2,01	4,03
E	5,85	−19,50	380,19
F	44,64	19,29	372,17

Celkový součet čtverců sčítá čtverce odchylek všech šesti stromů:

$$\text{celkový součet čtverců} = \text{čtverec odchylky stromu A} + \cdots + \text{čtverec odchylky stromu F}\ .$$

Do vztahu dosadíme odchylky z tabulky, umocníme je a sečteme:

$$\begin{aligned}\text{celkový součet čtverců} &= (1{,}69)^2 + (6{,}48)^2 + (-5{,}96)^2 + (-2{,}01)^2 + (-19{,}50)^2 + (19{,}29)^2 \\ &= 2{,}86 + 42{,}01 + 35{,}50 + 4{,}03 + 380{,}19 + 372{,}17 \\ &= 836{,}76\ .\end{aligned}$$

Obecně označíme pozorovanou hodnotu y_i, průměr všech pozorovaných hodnot $\bar{y}$ a počet pozorování n:

$$SS_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2.$$

Symbol SS_{total} označuje celkový součet čtverců. Každý člen $y_i - \bar{y}$ je odchylka jedné pozorované výšky od průměrné výšky. Hodnota 836,76 m² popisuje celkovou čtvercovou odchylku šesti výšek od jejich průměru.

Který strom přispívá nejvíce?


Najděte v grafu a tabulce strom s největším příspěvkem k celkové variabilitě. Proč o velikosti příspěvku rozhoduje délka úsečky **i její umocnění na druhou**?

Největší příspěvek má strom E, protože má největší absolutní odchylku od průměru. Umocnění zachová příspěvky kladných i záporných odchylek a větší odchylky zvýrazní.

15 Kolik rozdílů zůstalo po odhadnutí přímky?

Místo průměru teď použijeme odhadnutou přímku. Každá úsečka vede od modelem odhadnuté výšky k pozorované výšce stejného stromu. Její orientovaná délka je známé residuum:

$$\text{residuum} = \text{pozorovaná výška} - \text{odhadnutá výška}\ .$$



Obrázek 6: Residua stejné šestice stromů. Každá oranžová úsečka spojuje odhadnutou výšku na fialové přímce s pozorovanou výškou.

Residuum nese znaménko: bod nad přímkou má kladné residuum, bod pod přímkou záporné. Absolutní hodnota residua udává délku svislé úsečky mezi bodem a přímkou. Čtverec residua znaménko odstraní a určuje příspěvek daného stromu k součtu čtverců residuí.

Čtverce residuí sečteme. Dostaneme již známý součet čtverců residuí (*residual sum of squares*, RSS): kolik čtvercové odchylky zůstalo po odhadnutí modelu.

Strom	Pozorovaná výška	Odhadnutá výška	Residuum	Absolutní hodnota	Čtverec residua
A	27,04	33,67	−6,63	6,63	43,92
B	31,83	28,25	3,58	3,58	12,83
C	19,39	17,66	1,73	1,73	3,00
D	23,34	16,90	6,44	6,44	41,42
E	5,85	12,49	−6,64	6,64	44,12
F	44,64	43,12	1,52	1,52	2,31

Součet čtverců residuí sčítá čtverce residuí všech šesti stromů:

$$\text{součet čtverců residuí} = \text{čtverec residua stromu A} + \cdots + \text{čtverec residua stromu F}\ .$$

Do vztahu dosadíme residua z tabulky, umocníme je a sečteme:

$$\begin{aligned}\text{součet čtverců residuí} &= (-6{,}63)^2 + (3{,}58)^2 + (1{,}73)^2 + (6{,}44)^2 + (-6{,}64)^2 + (1{,}52)^2 \\ &= 43{,}92 + 12{,}83 + 3{,}00 + 41{,}42 + 44{,}12 + 2{,}31 \\ &= 147{,}60\ .\end{aligned}$$

Index i označuje pořadí pozorování. Residuum i-tého pozorování označíme jako e_i:

$$SS_{\text{res}} = \sum_{i=1}^{n} e_i^2.$$

Symbol SS_{res} označuje RSS. Jeho hodnota 147,60 m² je menší než celkový součet čtverců, protože přímka sleduje část rozdílů mezi výškami lépe než samotný průměr. **Celkový součet čtverců a RSS jsou dvě stavební veličiny, které použijeme společně v následujícím výpočtu.**

Residuum, jeho velikost a čtverec

Který strom má číselně nejvyšší residuum? Který strom má residuum s největší absolutní hodnotou, a proto také největší čtverec residua? Jsou to stejné stromy?

Číselně nejvyšší residuum má strom D: 6,44 m. Největší absolutní hodnotu residua má strom E: jeho residuum je −6,64 m, jeho absolutní hodnota je 6,64 m a čtverec residua je 44,12 m². Nejde o stejné stromy. Nejde o chybu: umocnění odstraní znaménko, takže příspěvek k RSS určuje velikost residua bez ohledu na to, zda je kladné, nebo záporné.

16 Jakou část variability zachytil model?

Máme dvě veličiny: celkový součet čtverců před použitím prediktoru a součet čtverců residuí (RSS) po odhadnutí přímky. Jejich poměr říká, jaká část původních rozdílů zůstala nezachycena. Jeho doplněk do jedné proto vyjadřuje **zachycený podíl variability**.

Zachycený podíl vyjádříme pomocí dvou veličin, které už známe:

$$\text{zachycený podíl variability} = 1 - \frac{\text{součet čtverců residuí}}{\text{celkový součet čtverců}}.$$

Do vztahu dosadíme všech šest residuí a všech šest odchylek od průměru:

$$\text{zachycený podíl variability} = 1 - \frac{(-6{,}63)^2 + (3{,}58)^2 + (1{,}73)^2 + (6{,}44)^2 + (-6{,}64)^2 + (1{,}52)^2}{(1{,}69)^2 + (6{,}48)^2 + (-5{,}96)^2 + (-2{,}01)^2 + (-19{,}50)^2 + (19{,}29)^2}.$$

Po sečtení čtverců dostaneme:

$$\text{zachycený podíl variability} = 1 - \frac{147{,}60}{836{,}76} = 0{,}824\ .$$

Tento podíl nazýváme koeficient determinace R^2 (**coefficient of determination, R-squared**). Obecně jej zapíšeme:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{total}}}.$$

Zkratka SS znamená „součet čtverců“. SS_{res} je součet čtverců residuí od odhadnutého modelu. SS_{total} je součet čtverců odchylek pozorované odezvy od jejího průměru.

Vypočítejte a interpretujte

Kdyby $SS_{\text{total}} = 500$ a $SS_{\text{res}} = 125$, jaké by bylo R^2? Napište také jednu větu o tom, co by takový výsledek říkal o odezvě.

R^2 by bylo $1 - 125/500 = 0{,}75$. Model by tedy v datech zachytil 75 % variability odezvy kolem jejího průměru.

17 Dostaneme stejné R^2 také ze `summary()`?

V malém příkladu jsme mohli rozepsat každý čtverec. Pro všech 63 stromů použijeme stejný výpočet, ale dosadíme už jen oba součty čtverců.

$$R^2 = 1 - \frac{1877{,}39}{8084{,}56} = 0{,}768\ .$$

Stejnou hodnotu vrátí také `summary(mod_spolecny)$r.squared`: 0,768. Výpis tedy nepřináší jinou definici; pouze za nás provede tentýž výpočet.

18 Co nám R^2 říká — a co ne?

Pro všech 63 stromů je R^2 společné přímky 0,768. Model tedy ve **stejných datech, na kterých byl odhadnut**, zachycuje přibližně 76,8 % pozorované variability výšky kolem jejího průměru.

R^2 však neříká:

- že model správně predikoval 76,8 % jednotlivých stromů;
- že model splňuje předpoklady;
- že vztah je příčinný;
- že model bude stejně dobrý pro nové stromy.

Která interpretace je obhajitelná?

Vyberte a zdůvodněte jednu možnost:

- **A:** R^2 vyjadřuje podíl správně predikovaných stromů.
- **B:** R^2 vyjadřuje podíl zachycené variability odezvy v těchto datech.
- **C:** R^2 vyjadřuje pravděpodobnost, že je model pravdivý.

Obhajitelná je možnost **B**: R^2 vyjadřuje podíl zachycené variability odezvy v datech použitých k odhadu modelu.

19 Proč R^2 po přidání členu neklesne?

Stejný výpočet R^2 můžeme použít pro všechny tři kandidáty na všech 63 stromech. Kandidátní modely jsou vnořené: složitější model vždy obsahuje všechny možnosti jednoduššího modelu a přidává další koeficienty. Při odhadu metodou nejmenších čtverců tedy může složitější model zopakovat jednodušší řešení, nebo součet čtverců residuí (RSS) ještě zmenšit.

Kandidátní model	Počet koeficientů	Součet čtverců residuí (RSS)	R^2
Společná přímka	2	1877,4	0,768
Posun mezi druhy	4	1674,5	0,793
Různé sklony	6	1643,7	0,797

Vyšší R^2 není automatické vítězství

Nejpružnější kandidát získává nejvyšší R^2 už proto, že má více možností přiblížit se stejným pozorováním. Samotné R^2 neumí rozhodnout, zda malé zlepšení shody stojí za další koeficienty.

Co udělá zbytečný člen?

Představte si, že do modelu přidáme prediktor, který téměř nic nepřinese. Může R^2 klesnout? Dokazuje jeho případné zvýšení, že je nový model užitečnější?

R^2 nemůže klesnout, protože rozšířený model může vždy zopakovat odhady jednoduššího modelu. Případné zvýšení však samo nedokazuje, že jsou nové koeficienty užitečné.

20 Které koeficienty jednotlivé modely odhadují?

Počet koeficientů není abstraktní číslo. Každý z nich odpovídá konkrétní části modelu: interceptu, sklonu nebo rozdílu mezi druhy.

Přiřaďte koeficienty k modelům

Než se podíváte na následující seznam, rozhodněte, který model potřebuje pouze intercept a jeden sklon, který přidává rozdíly druhů a který navíc přidává rozdíly ve sklonech.

- **Společná přímka — 2 koeficienty:**
  - `(Intercept)`
  - `prumer_kmene_cm`
- **Posun mezi druhy — 4 koeficienty:**
  - `(Intercept)`
  - `prumer_kmene_cm`

- `druh_stromuPinus ponderosa`
- `druh_stromuPseudotsuga menziesii`

- **Různé sklony — 6 koeficientů:**
  - `(Intercept)`
  - `prumer_kmene_cm`
  - `druh_stromuPinus ponderosa`
  - `druh_stromuPseudotsuga menziesii`
  - `prumer_kmene_cm:druh_stromuPinus ponderosa`
  - `prumer_kmene_cm:druh_stromuPseudotsuga menziesii`

Společná přímka má intercept a jeden sklon. Posun mezi druhy přidává dva rozdíly druhů vůči referenčnímu druhu. Různé sklony navíc přidávají dva rozdíly ve sklonech. Právě tyto konkrétní možnosti navíc mohou zlepšit shodu s daty.

21 Stačí zlepšení R^2 na další koeficienty?

Adjustované R^2 (adjusted R-squared) se ptá, zda je nárůst obyčejného R^2 dostatečně velký vzhledem ke dvěma dalším údajům:

- n je počet pozorování použitých k odhadu modelu;
- k je počet odhadovaných regresních koeficientů **včetně interceptu**.

V našich datech mají všechny modely stejné $n = 63$, ale postupně odhadují 2, 4, 6 koeficientů. Pro posun mezi druhy známe:

- obyčejné $R^2 = 0{,}793$;
- počet pozorování $n = 63$;
- počet regresních koeficientů $k = 4$.

Úprava vychází z podílu variability, který obyčejné R^2 nezachytilo. Tento podíl zvětší podle počtu pozorování a koeficientů:

$$\text{adjustované } R^2 = 1 - (\text{podíl variability nezachycený modelem} \times \text{úprava za počet pozorování a koeficientů}).$$

Do vztahu dosadíme hodnoty pro posun mezi druhy:

$$R^2_{\text{adj}} = 1 - (1 - 0{,}793) \times \frac{63 - 1}{63 - 4} = 0{,}782 \ .$$

Po výpočtu obou částí v závorce dostaneme:

$$R^2_{\text{adj}} = 1 - (0{,}207 \times 1{,}051) = 0{,}782 \ .$$

Obecná podoba stejného výpočtu je:

$$R^2_{\text{adj}} = 1 - (1 - R^2) \times \frac{n - 1}{n - k}.$$

Faktor $\frac{n-1}{n-k}$ je při přidání koeficientů větší. Pokud nové koeficienty nesníží residuální variabilitu dostatečně, adjustované R^2 se zmenší.

Označte význam každé části

Ve výpočtu výše najděte část popisující shodu modelu, velikost datového souboru a počet odhadovaných koeficientů. Která část se změní, když přidáme interakci?

Shodu vyjadřuje $1 - R^2$, velikost datového souboru představuje n a počet koeficientů představuje k. Po přidání interakce se změní R^2 i k; počet pozorování n zůstane stejný.

22 Kdy může adjustované R^2 klesnout?

Porovnáme obyčejné R^2 po přidání interakce. Ta přidává další sklony a má smysl jen tehdy, pokud dostatečně změní residua vzhledem k počtu nových koeficientů.

Kandidátní model	Počet koeficientů	R^2	Adjustované R^2
Společná přímka	2	0,768	0,764
Posun mezi druhy	4	0,793	0,782
Různé sklony	6	0,797	0,779

Přechod od posunu mezi druhy k různým sklonům přidá dva sklony. Obyčejné R^2 se zvýší z 0,793 na 0,797, ale adjustované R^2 klesne z 0,782 na 0,779. Zisk ve shodě je pro tuto úpravu příliš malý.

Předpověď před výsledkem

Kdyby nový koeficient téměř nezměnil residua, co se stane s obyčejným a adjustovaným R^2? Vysvětlete obě odpovědi pomocí jejich výpočtu.

Obyčejné R^2 se nezmenší, protože RSS se po přidání koeficientu nemůže zvětšit. Adjustované R^2 však pravděpodobně klesne: téměř stejný nezachycený podíl se násobí větší úpravou za počet koeficientů.

23 Jak vyvážit shodu a jednoduchost modelu?

R^2 hodnotí shodu s pozorovanými daty, ale nezvýhodňuje jednodušší vysvětlení. Při porovnání modelů proto používáme také **princip úspornosti (parsimony)**: složitější model má být upřednostněn jen tehdy, když přinese dostatečné zlepšení shody.

Kdy stojí složitost za to?

Posun mezi druhy a různé sklony popisují stromy téměř stejně dobře (R^2 0,793 a 0,797). První model potřebuje 4 koeficienty, druhý 6. Který byste předběžně upřednostnili a jakou další informaci byste chtěli znát?

Předběžně bychom upřednostnili jednodušší model. Potřebujeme však posoudit, zda malé zlepšení shody složitějšího modelu vyváží 2 koeficienty navíc.

24 Jak AIC vyjadřuje úspornost modelu?

Akaikeho informační kritérium (Akaike information criterion, AIC) je alternativní způsob porovnání kandidátů. V jednom čísle vyvažuje:

- shodu modelu s pozorovanými daty;
- penalizaci za složitost modelu.

Lepší shoda AIC snižuje, zatímco další odhadované veličiny je zvyšují. Proto při srovnání stejných dat preferujeme **nižší AIC**. AIC nevyjadřuje podíl variability a nemá stejnou škálu jako R^2.

25 Co nám říkají rozdíly AIC mezi kandidáty?

Hodnotu AIC jednoho modelu získáme přímo funkcí `AIC()`:

```
# Vypočítáme AIC společné přímky
AIC(object = mod_spolecny)
```

```
[1] 398.64
```

Samotné AIC 398,64 nelze označit za „dobré“ nebo „špatné“. Jde o relativní kritérium: číslo získává význam až ve srovnání předem určených kandidátů.

Porovnávané modely přitom musí používat:

- stejnou odezvu;
- stejná pozorování;
- stejný způsob pravděpodobnostního popisu residuí — zde u všech kandidátů předpokládáme residua s normálním rozdělením a stejnou základní strukturou.

Kandidáty porovnáme tak, že od AIC každého z nich odečteme nejnižší AIC v celé sadě:

$$\text{rozdíl od nejnižšího AIC} = \text{AIC kandidáta} - \text{nejnižší AIC v sadě}\ .$$

Pro společnou přímku dosadíme její AIC a nejnižší AIC ze tří kandidátů:

$$\text{rozdíl od nejnižšího AIC} = 398{,}64 - 395{,}44\ .$$

Po odečtení dostaneme:

$$\text{rozdíl od nejnižšího AIC} = 3{,}20\ .$$

Tento rozdíl se často označuje jako **ΔAIC (delta AIC)**.

Obecně jej zapíšeme:

$$\Delta AIC_i = AIC_i - AIC_{\min}.$$

Symbol i označuje konkrétní kandidátní model, AIC_i jeho hodnotu AIC a AIC_{min} nejnižší AIC v celé kandidátní sadě. Nejlépe podporovaný kandidát má ΔAIC rovné 0; ostatní hodnoty ukazují, o kolik je jejich AIC větší. V této lekci záměrně nepoužíváme univerzální práh, který by rozhodnutí automatizoval.

Kandidátní model	AIC	Rozdíl od nejnižšího AIC (ΔAIC)
Společná přímka	398,64	3,20
Posun mezi druhy	395,44	0,00
Různé sklony	398,27	2,83

Proč nestačí jedno číslo?

Kolega oznámí: „Můj model má AIC 395, takže je dobrý.“ Jaká informace chybí, abyste mohli jeho tvrzení posoudit?

Chybí AIC dalších modelů odhadnutých pro stejnou odezvu a stejná pozorování. Kandidáty porovnávají rozdíly mezi těmito hodnotami, ne jedna hodnota sama.

Nejlepší kandidát nemusí být dobrý model

Porovnání vybírá nejlépe podporovaný model **pouze z modelů, které jsme zařadili do kandidátní sady**. Neříká, že je tento model obecně dobrý ani že jsme našli nejlepší možný popis dat. Jiný model, který jsme vůbec neposuzovali, může stejná data popsat podstatně lépe.

Doplňující: Z čeho se AIC skládá?

AIC sčítá dvě části. První vyjadřuje **nesoulad modelu s daty**: vychází z takzvané věrohodnosti (*likelihood*), tedy z toho, jak pravděpodobná by byla pozorovaná data, kdyby model platil. Čím lépe model data vystihuje, tím je tato část menší. Druhá část je **penalizace za složitost**: AIC přičítá 2 za každou veličinu, kterou model odhaduje.

U modelu z `lm()` se kromě regresních koeficientů odhaduje ještě jedna veličina: residuální směrodatná odchylka. Společná přímka proto odhaduje 2 koeficienty a jednu směrodatnou odchylku, celkem 3 veličiny. Ručně AIC počítat nemusíte; následující kód jen ukazuje, že `AIC()` sčítá právě tyto dvě části.

```
# Nesoulad s daty: −2 × logaritmus věrohodnosti modelu
nesoulad_spolecny <-
  -2 * as.numeric(logLik(object = mod_spolecny))

# Počet odhadovaných veličin: koeficienty a směrodatná odchylka residuí
```

```r
pocet_velicin_spolecny <-
  length(coef(object = mod_spolecny)) + 1

# Součet obou částí
nesoulad_spolecny + 2 * pocet_velicin_spolecny
```

```
[1] 398.64
```

```r
# Stejnou hodnotu vrátí funkce AIC()
AIC(object = mod_spolecny)
```

```
[1] 398.64
```

26 Ukazují R^2, adjustované R^2 a AIC na stejný model?

Každá míra zachází se shodou a složitostí jinak. Jejich společná tabulka proto není hlasováním, ale podkladem pro argument.

Kandidátní model	Počet koeficientů	R^2	Adjustované R^2	AIC
Společná přímka	2	0,768	0,764	398,64
Posun mezi druhy	4	0,793	0,782	395,44
Různé sklony	6	0,797	0,779	398,27

Čtěte tabulku jako argument

Který model má nejvyšší R^2? Který má nejvyšší adjustované R^2 a nejnižší AIC? Vysvětlete neshodu pomocí toho, jak každá míra zachází se shodou a složitostí, ne jako tři rovnocenné hlasy o tom, který model je „pravdivý“.

Různé sklony mají nejvyšší R^2, protože mají nejvíce možností přizpůsobit se datům. Posun mezi druhy má nejvyšší adjustované R^2 a nejnižší AIC, protože dodatečné sklony modelu Různé sklony nepřinesly dostatečné zlepšení shody. Žádná z těchto hodnot neudává pravděpodobnost, že je model pravdivý.

27 Stačí dobré skóre k tomu, aby byl model dobrý?


Srovnávací skóre nenahrazuje diagnostiku modelu. U kandidáta podporovaného adjustovaným R^2 a AIC kontrolujeme vztah residuí k odhadnutým hodnotám, Q–Q graf a vliv jednotlivých pozorování.

Do grafu residuí přidáme vyhlazenou křivku, kterou spočítá funkce `lowess()`. Křivka v každém místě grafu sleduje, kde residua v okolí v průměru leží. Nic nového neodhaduje, jen pomáhá vidět vzor, který tvoří body.

```
# Zkontrolujeme, zda residua leží kolem nuly bez vzoru
plot(
  x = fitted(object = mod_aditivni),
  y = residuals(object = mod_aditivni),
  col = vec_barvy_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  pch = vec_symboly_druhu[as.character(data_stromy$druh_stromu)],
  cex = 1.2,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.2,
  xlab = "Odhadnutá výška stromu (m)",
  ylab = "Residuum (m)"
)

abline(
  h = 0,
  col = "#2E2E2E",
  lty = 2
)

# Vyhlazená křivka sleduje průměrnou polohu residuí
lines(
  x = lowess(
    x = fitted(object = mod_aditivni),
    y = residuals(object = mod_aditivni)
  ),
  col = "#F3A712",
  lwd = 3
)
```




Obrázek 7: Residua modelu Posun mezi druhy podle odhadnuté výšky. Oranžová křivka pouze vyhlazuje průběh bodů, aby byl vzor lépe vidět.

Residua neleží kolem nuly náhodně. U stromů s odhadnutou výškou pod 16 m je průměrné residuum −5,9 m, mezi 16 a 32 m +3,1 m a nad 32 m −2,1 m. Residua tak tvoří **oblouk**: nízké i nejvyšší stromy model nadhodnocuje, středně vysoké podhodnocuje. Přímka tedy nevystihuje tvar vztahu mezi průměrem kmene a výškou; výška s průměrem kmene nejspíš roste stále pomaleji. Ve stejných pásmech mají stejný oblouk i residua společné přímky (průměrná residua −5,7; +3,4 a −2,8 m) a modelu s různými sklony (−5,8; +3,4 a −2,1 m). Oblouk tedy nevyřeší ani druh stromu, ani rozdílné sklony.

```
# Zkontrolujeme tvar rozdělení residuí
qqnorm(
  y = residuals(object = mod_aditivni),
  pch = 19,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.2,
  main = "Q–Q graf residuí",
  xlab = "Teoretické kvantily",
  ylab = "Kvantily residuí (m)"
)

qqline(
```

```
  y = residuals(object = mod_aditivni),
  col = "#2E2E2E",
  lwd = 2
)
```



Obrázek 8: Q–Q graf reziduí modelu Posun mezi druhy.

Body v Q–Q grafu se na obou koncích od přímky odchylují. Část této odchylky může souviset s obloukem: residua, která zanechává nevhodný tvar modelu, nemusí mít rozdělení předpokládané lineárním modelem.


Zbývá otázka, zda některé pozorování model neovlivňuje neobvykle silně. Cookova vzdálenost (*Cook's distance*) shrnuje, jak silně by se odhadnuté hodnoty změnily po vynechání jednoho pozorování. Orientační čára $4/n$ není automatický test; pouze označuje stromy, které si zaslouží bližší kontrolu.

```
# Vypočítáme vliv jednotlivých pozorování
vec_cookova_vzdalenost <-
  cooks.distance(model = mod_aditivni)

hranice_cook <-
  4 / nobs(object = mod_aditivni)
```

```r
# Zobrazíme, která pozorování mají největší vliv
plot(
  x = vec_cookova_vzdalenost,
  type = "h",
  lwd = 2,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.2,
  xlab = "Pořadí stromu v tabulce",
  ylab = "Cookova vzdálenost"
)

abline(
  h = hranice_cook,
  col = "#F3A712",
  lty = 2,
  lwd = 2
)
```



Obrázek 9: Cookovy vzdálenosti pro model Posun mezi druhy. Přerušovaná čára zobrazuje orientační hodnotu 4/n.

Nad orientační čarou leží 4 pozorování. To není důvod je odstranit; je to důvod vrátit se k jejich měření, biologickému významu a vlivu na závěr.

Rozhodnutí po kontrole modelu

Podporují graf residuí, Q–Q graf a Cookovy vzdálenosti závěr ze srovnávací tabulky, nebo vyžadují opatrnější formulaci? Uveďte jeden důvod pro zvolený model a jedno omezení.

Možná odpověď

Srovnávací tabulka podporuje posun mezi druhy jako nejlepšího ze tří kandidátů: zachytí rozdíly mezi druhy a má nejvyšší adjustované R^2 i nejnižší AIC. Diagnostika ale vyžaduje opatrnější formulaci. Residua tvoří oblouk, takže žádná z přímek nevystihuje tvar vztahu, a Q–Q graf není přímý. Stromy nad čarou $4/n$ je vhodné zkontrolovat, ne automaticky vyřadit.

28 Který model lze pro tyto stromy nejlépe obhájit?

Posun mezi druhy, tedy aditivní model s průměrem kmene a druhem stromu, představuje pro tato data nejlépe obhajitelný model **ze tří posuzovaných kandidátů**. Oproti jedné společné přímce zachytí rozdíly mezi druhy. Různé sklony sice dosáhnou nejvyššího R^2, ale jejich dodatečné sklony nepřinesou dostatečný zisk podle adjustovaného R^2 ani AIC.

Tento závěr zůstává podmíněný. Neříká, že je posun mezi druhy nejlepší ze všech možných modelů. Residua všech tří kandidátů tvoří oblouk, takže přímky nevystihují zakřivený tvar vztahu. Data navíc obsahují omezený počet stromů, Q–Q graf není přímý a pozorovací studie sama nedokládá příčinný efekt druhu.

Odpověď na hlavní otázku

Dobrý model nepoznáme podle jediného čísla. Obhajoba musí propojit biologickou otázku, shodu s daty, složitost, diagnostiku, interpretovatelnost a omezení dat.

29 Jak porovnávat modely bez automatického hledání?

1. Položte biologickou otázku.
2. Prohlédněte a zobrazte data.
3. Definujte malou sadu biologicky zdůvodněných kandidátů.
4. Použijte pro všechny kandidáty stejnou odezvu a stejná pozorování.
5. Porovnejte odhadnuté vztahy, residua, R^2, adjustované R^2 a AIC.
6. Zkontrolujte předpoklady a vlivná pozorování.
7. Obhajte závěr a pojmenujte jeho omezení.

Automatické hledání nenahrazuje biologickou otázku

Funkce pro automatické přidávání a odebírání členů mohou vytvořit dlouhý seznam modelů, ale samy neurčí, které modely mají biologický smysl. V této lekci proto nepoužíváme krokový výběr ani vyhledávání všech možných kombinací.

30 Co bude následovat dál

Všechny tři kandidáty jsme kreslili jako přímky, a jejich residua přesto tvoří oblouk. Problém tedy není jen ve volbě prediktorů: vztah výšky a průměru kmene je nelineární. V následující lekci se naučíme popisovat tvar rozdělení hodnot i tvar vztahu a uvidíme, jak může vhodná transformace proměnných pomoci lineárnímu modelu popsat i zakřivený vztah. Kandidátní tvary vztahu budeme stejně jako v této lekci porovnávat až poté, co je biologicky zdůvodníme.

31 Shrnutí

- R^2 je podíl variability odezvy, který model zachytil v datech; počítá se z celkového součtu čtverců a součtu čtverců residuí.
- R^2 po přidání členu do vnořeného lineárního modelu nemůže klesnout, a proto samo nevybírá model.
- Adjustované R^2 a AIC vyvažují shodu a složitost, každé jinak; AIC má smysl jen jako rozdíl mezi modely se stejnou odezvou a stejnými pozorováními.
- Kandidáty definujeme podle biologické otázky předtím, než porovnáme jejich skóre.
- Konečná obhajoba musí zahrnout také diagnostiku, interpretovatelnost a omezení dat.

31.1 Závěrečná otázka

Vyberte si biologickou otázku ze svého oboru. Jaké dva nebo tři kandidátní modely byste sestavili ještě před analýzou a co by vás přesvědčilo, abyste dali přednost jednoduššímu z nich?

Možná odpověď

Například otázka, jak hmotnost ptáčat závisí na jejich věku a na tom, zda hnízdo leží v lese, nebo ve městě. Kandidáty mohou být jedna společná přímka, rovnoběžné přímky pro les a

město a přímky s různými sklony, pokud čekáme, že ptáčata v jednom prostředí přibývají rychleji. Jednoduššímu modelu bychom dali přednost, kdyby složitější model zlepšil shodu jen nepatrně (adjustované R^2 by kleslo a AIC by nebylo nižší), residua jednoduššího modelu nevykazovala vzor a biologická otázka nevyžadovala rozdílné sklony.

Slovníček pojmů

Pojmy použité v těchto materiálech a jejich definice:

Interaktivní slovníček je dostupný online: https://cuni-natur-biostatistics.github.io/slovnik/