MB120P163
Biostatistika
a plánování ekologických pokusů

Vylézají z tůní, které vyschly, menší žabky?

Hierarchická data a náhodné efekty — podkladové čtenářské materiály k přednášce

22. října 2026

Obsah

1 Co zůstalo otevřené u krabů a u ostrovů? ... 3
2 Co se v této lekci naučíte ... 3
3 Žabky z pokusných nádrží ... 4
3.1 Pokus se 16 nádržemi ... 4
3.2 Jeden řádek tabulky představuje jednu žabku ... 7
3.3 Kolik žabek vylezlo z které nádrže? ... 9
3.4 Jak velké jsou žabky z vyschlých a nevyschlých nádrží? ... 10
3.5 Stejné žabky rozdělené podle nádrží ... 11
4 Kolik nezávislých odpovědí máme? ... 13
4.1 Žabky v nádržích, nádrže v pokusu ... 13
4.2 Na které úrovni se rozhodovalo o vyschnutí? ... 13
4.3 Model, který počítá každou žabku zvlášť ... 14
4.4 Model, který počítá každou nádrž jednou ... 18
4.5 Který model je přesnější: všechny žabky, nebo průměry nádrží? ... 20
4.6 Proč 16 nádrží nevydá za 485 žabek ... 21
4.7 Pomůže změřit víc žabek z každé nádrže? ... 22
4.8 Proč jsme u krabů a křídlatky pracovali s průměry ... 22
4.9 Co průměry nádrží zahodí ... 23
5 Nádrž jako další prediktor? ... 23
5.1 Co se stane, když přidáme nádrž do modelu? ... 23
5.2 Vyschnutí a nádrž nesou stejnou informaci ... 25
5.3 Souvisí den metamorfózy s délkou žabky? ... 25
5.4 Proč se vztah ukázal až uvnitř nádrží ... 27
6 Každá nádrž má vlastní výchozí úroveň ... 28
6.1 Nádrže jako výběr z mnoha možných tůní ... 28
6.2 Z čeho se skládá délka jedné žabky ... 29
6.3 Model s náhodným interceptem v R ... 30
6.4 Jak velký je rozdíl a jak přesně ho známe ... 33
6.5 Jak moc se liší nádrže a jak moc žabky v jedné nádrži ... 34
6.6 Kde leží odhadnuté výchozí úrovně nádrží? ... 35

6.7 Co prozradí residua a výchozí úrovně nádrží ... 35
6.8 Jakou část variability zachytil model se všemi žabkami? ... 39
6.9 Koeficient determinace jako podíl rozptylu ... 40
6.10 Tři části variability v délce žabek ... 41
6.11 Marginální a podmíněné R^2 ... 42
6.12 Co R^2 smíšeného modelu říká a co ne ... 43
6.13 Čtyři způsoby, jak odpovědět na stejnou otázku ... 44
7 Pevný, nebo náhodný faktor? ... 46
7.1 Zajímají nás konkrétní úrovně, nebo celý soubor možných úrovní? ... 46
7.2 Pevný, nebo náhodný? Šest situací z biologie ... 46
7.3 Když nepomůže ani model: jedno ošetřené povodí ... 47
7.4 Vylézají z vyschlých nádrží menší žabky? ... 48
8 Jak naplánovat vlastní studii ... 48
8.1 Sedm otázek před prvním měřením ... 48
8.2 Larvy vážek v tůních: návrh od otázky po model ... 49
8.3 Váš návrh na jedné stránce ... 50
9 Co když nás nezajímá délka, ale přežití? ... 51
Shrnutí ... 51
Slovníček pojmů ... 51



Obrázek 1: Tůň, která vyschla a znovu se naplnila. Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Mělké tůně, louže v kolejích a malé mokřady jsou pro obojživelníky nenahraditelné: kladou do nich vajíčka a pulci v nich rostou, dokud se nepromění v malé žabky. Za suchých let ale mnoho takových tůní vyschne a po deštích se znovu naplní. Voda se vrátí, jenže dno, řasy a drobní živočichové, kterými se pulci živí, už nemusejí být stejné jako v tůni, která nikdy nevyschla.

Ekologové proto zkusili v pokusu napodobit tůně, které vyschly a znovu se naplnily, a porovnat je s tůněmi, které nevyschly. Sledovali, jak velké žabky z nich nakonec vylezou. Velikost na konci metamorfózy je u žab důležitá: větší žabky obvykle lépe přežívají první měsíce na souši.

Hlavní otázka

Vylézají z tůní, které vyschly a znovu se naplnily, menší žabky? A jak jistě to můžeme z naměřených dat tvrdit?

Na první část otázky odpoví graf a známý lineární model. Druhá část je zrádnější a celá tato lekce se točí kolem ní.

1 Co zůstalo otevřené u krabů a u ostrovů?

S podobnou otázkou jsme se už dvakrát setkali, ale pokaždé jsme ji odložili.

Při hledání odpovědi, zda jsou krabi houslisti na severnějších slaniskách větší, jsme nepracovali s jednotlivými kraby. Každý řádek tabulky představoval jedno slanisko a v modelu byly průměry krabů z jednotlivých slanisek. Tehdy jsme si slíbili, že důvod vysvětlíme později, až se budeme zabývat hierarchickými daty.

V předchozí lekci jsme zase modelovali počty druhů na třiceti ostrovech Galapág. Na konci jsme se ptali, zda je třicet ostrovů jednoho souostroví opravdu třicet nezávislých kousků informace, když si sousední ostrovy vyměňují semena a sdílejí podnebí.

Zkuste odpovědět dřív, než budete číst dál

Proč jsme u krabů modelovali průměry slanisek, a ne všechny změřené kraby? Co by se mohlo pokazit, kdybychom každého kraba počítali jako samostatné pozorování?

Odpověď nebudeme hledat u krabů, ale v pokusu s žabkami. Ke krabům se vrátíme, až budeme mít v ruce potřebné nástroje.

2 Co se v této lekci naučíte

Po prostudování lekce budete umět:

- pojmenovat hierarchii v datech (opakovaná měření, lokality, bloky) a určit, na které úrovni se mění zkoumaný prediktor;
- určit, které jednotky v datech představují nezávislá opakování, a vysvětlit, jak pseudoreplikace zkresluje standardní chybu, intervaly spolehlivosti a p-hodnoty;
- rozhodnout, zda má být skupinová proměnná pevným, nebo náhodným faktorem, a zdůvodnit volbu biologickou otázkou;
- odhadnout lineární model s náhodným interceptem, interpretovat jeho výsledek a porovnat variabilitu mezi skupinami a uvnitř skupin;

- popsat, kdy je potřeba model s náhodnými efekty místo jednoduchého `lm()`, a kdy stačí jednodušší řešení.

Kromě toho si postupně navrhnete vlastní terénní studii, ve které se stejné otázky objeví ještě před prvním měřením.

3 Žabky z pokusných nádrží


3.1 Pokus se 16 nádržemi



Obrázek 2: Venkovní pokusné nádrže. Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Pokus provedli K. J. Ward, S. E. M. Burkhead, E. A. Stybr-Burrus a T. M. Luhring v roce 2021 na terénní stanici Wichita State University v Kansasu (Ward et al. 2023, *Freshwater Biology*). Na louce rozmístili 64 velkých plastových nádrží na vodu pro dobytek, každou o objemu 1 000 litrů, a udělali z nich malé umělé tůně. Polovina nádrží před začátkem pokusu vyschla a byla znovu napuštěna, druhá polovina zůstala celou dobu plná. Do části nádrží potom vysadili po 50 pulcích severoamerického skokana *Lithobates blairi*.

Malé žabky po dokončení metamorfózy vylezly jen z nádrží, ve kterých byli pulci bez dravých ryb. Takových nádrží bylo 16 a s nimi budeme pracovat. Jakmile žabka vylezla z vody, výzkumníci jí změřili délku těla a zvážili ji.



Obrázek 3: Uspořádání pokusu. Každý kruh je jedna nádrž; číslo uvnitř je číslo nádrže, číslo pod kruhem počet žabek, které z ní vylezly. O vyschnutí se rozhodovalo vždy pro celou nádrž.

Nejdůležitější vlastnost tohoto pokusu je vidět už na schématu: **vyschnutí se týkalo vždy celé nádrže**, nikoli jednotlivých žabek. Všechny žabky z jedné nádrže vyrůstaly ve stejné vodě, se stejnou potravou a se stejnou historií nádrže.

Doplňující: původ dat a příprava tabulky

Původní data jsou zveřejněna v repozitáři Dryad (doi:10.5061/dryad.hx3ffbgkn) pod licencí CC0. Výsledky pokusu popisuje článek Ward et al. (2023), *Freshwater Biology*, doi:10.1111/fwb.14157. V tabulce, se kterou pracujeme, jsou jen žabky z 16 nádrží bez ryb. Názvy sloupců jsme přeložili do češtiny, vynechali jsme pomocné hmotnosti vážicích kelímků a suchou hmotnost jsme zaokrouhlili na tisíciny gramu, s jakou přesností se vážilo.

Následující kód stáhne původní soubor ze zrcadla repozitáře Dryad v repozitáři Zenodo, ověří jeho otisk SHA-256 a uloží výukovou tabulku. Potřebuje balíčky `readxl` a `digest`.

```
# Stáhneme původní soubor z repozitáře Zenodo
cesta_zdroj <-
  tempfile(fileext = ".xlsx")

download.file(
  url = paste0(
    "https://zenodo.org/api/records/8083635/files/",
    "Frog_Metamorph_Data_Dryad.xlsx/content"
  ),
  destfile = cesta_zdroj,
  mode = "wb"
)
```

```r
# Ověříme, že jsme stáhli přesně očekávaný soubor
stopifnot(
  digest::digest(
    object = cesta_zdroj,
    algo = "sha256",
    file = TRUE
  ) == paste0(
    "cc879383de5a35a7ee57c9e6b446bb9c",
    "364bc9fd7007452e55ba39ea06f2fef4"
  )
)

# Načteme list s údaji o žabkách
data_zdroj <-
  as.data.frame(
    readxl::read_excel(
      path = cesta_zdroj,
      sheet = "Sheet1"
    )
  )

# Sestavíme výukovou tabulku s českými názvy proměnných
data_zabky_priprava <-
  data.frame(
    nadrz = as.integer(data_zdroj$Tank),
    vyschnuti = ifelse(
      test = data_zdroj$Treatment == "A:DR",
      yes = "vyschla",
      no = "nevyschla"
    ),
    poradi_zabky = as.integer(data_zdroj$Indiv),
    datum_metamorfozy = as.Date(data_zdroj$Date),
    den_pokusu = as.integer(data_zdroj$Day),
    delka_tela_mm = data_zdroj$SVL,
    hmotnost_mokra_g = data_zdroj$Wet_Mass,
    hmotnost_sucha_g = round(data_zdroj$Dry_Mass, digits = 3)
  )

# Seřadíme řádky podle nádrže a pořadí žabky
vec_poradi_radku <-
  order(
    data_zabky_priprava$nadrz,
```

```
    data_zabky_priprava$poradi_zabky
  )

data_zabky_serazene <-
  data_zabky_priprava[vec_poradi_radku, ]

# Uložíme výukovou tabulku
write.csv(
  x = data_zabky_serazene,
  file = here::here("data", "zabky_nadrze.csv"),
  row.names = FALSE
)
```

Stejný postup obsahuje skript `R/prepare_frog_data.R` v repozitáři lekce.

3.2 Jeden řádek tabulky představuje jednu žabku

Každý řádek tabulky popisuje jednu žabku, takže jednotkou pozorování je žabka. Pro každou žabku známe:

Proměnná	Význam	Jednotka
`nadrz`	číslo nádrže, ze které žabka vylezla	—
`vyschnuti`	zda nádrž před pokusem vyschla (`vyschla`), nebo ne (`nevyschla`)	—
`poradi_zabky`	pořadové číslo žabky v rámci nádrže	—
`datum_metamorfozy`	datum, kdy žabka vylezla z vody	datum
`den_pokusu`	počet dní od začátku pokusu	den
`delka_tela_mm`	délka těla od špičky čenichu ke kloace	mm
`hmotnost_mokra_g`	hmotnost živé žabky	g
`hmotnost_sucha_g`	hmotnost žabky po vysušení	g

Hlavní odezvou bude délka těla. Hlavním prediktorem bude vyschnutí nádrže, tedy kategoriální proměnná se dvěma úrovněmi.

Soubor zabky_nadrze.csv je součástí materiálů. Pro následující kód jej uložte do složky `data` ve svém projektu v R. Načteme ho a nastavíme, že referenční skupinou budou nádrže, které nevyschly:

```
# Načteme tabulku s jedním řádkem pro každou žabku
data_zabky <-
  read.csv(
    file = here::here("data", "zabky_nadrze.csv")
  )

# Nádrže, které nevyschly, budou referenční skupinou
data_zabky$vyschnuti <-
  factor(
    x = data_zabky$vyschnuti,
    levels = c("nevyschla", "vyschla")
  )
```

Než začneme cokoli modelovat, tabulku prohlédneme: strukturu, chybějící hodnoty a rozsahy hodnot.

```
# Ověříme datové typy proměnných
str(object = data_zabky)
```

```
'data.frame':   485 obs. of  8 variables:
 $ nadrz            : int  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ vyschnuti        : Factor w/ 2 levels "nevyschla","vyschla": 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 ...
 $ poradi_zabky     : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
   $   datum_metamorfozy:   chr      "2021-06-30"   "2021-06-30"   "2021-06-30"
"2021-06-30" ...
 $ den_pokusu       : int  53 53 53 53 56 56 56 56 56 56 ...
 $ delka_tela_mm    : int  25 23 26 24 25 25 25 26 25 26 ...
 $ hmotnost_mokra_g : num  0.9 0.9 1.2 0.9 1.1 0.9 1.3 1.2 1.1 1.2 ...
 $ hmotnost_sucha_g : num  0.137 0.133 0.201 0.131 0.16 0.14 0.217 0.196 0.174
0.198 ...
```

```
# Minimum, kvartily, průměr a maximum vybraných numerických proměnných
summary(
  object = data_zabky[
    ,
    c("den_pokusu", "delka_tela_mm", "hmotnost_sucha_g")
```

```
  ]
)
```

```
   den_pokusu    delka_tela_mm   hmotnost_sucha_g
 Min.   :41.00   Min.   :19.00   Min.   :0.0880
 1st Qu.:49.00   1st Qu.:24.00   1st Qu.:0.1460
 Median :53.00   Median :25.00   Median :0.1780
 Mean   :54.33   Mean   :25.83   Mean   :0.2088
 3rd Qu.:58.00   3rd Qu.:28.00   3rd Qu.:0.2650
 Max.   :82.00   Max.   :35.00   Max.   :0.8510
```

```
# Spočítáme chybějící hodnoty v každém sloupci
colSums(x = is.na(data_zabky))
```

```
            nadrz         vyschnuti      poradi_zabky datum_metamorfozy
                0                 0                 0                 0
       den_pokusu     delka_tela_mm  hmotnost_mokra_g  hmotnost_sucha_g
                0                 0                 0                 0
```

Tabulka má 485 řádků a žádné chybějící hodnoty. Délka těla se pohybuje od 19 do 35 mm a výzkumníci ji zapisovali na celé milimetry. To odpovídá velikosti žabek krátce po metamorfóze. Suchá hmotnost má medián 0,178 g, ale největší žabka vážila 0,851 g: rozdělení hmotnosti má dlouhý chvost vpravo, podobně jako mnoho velikostí z předchozí lekce.

3.3 Kolik žabek vylezlo z které nádrže?

Pro tuto lekci je důležité ještě jedno ověření: kolik řádků patří ke každé nádrži.

```
# Počet žabek z každé nádrže
table(data_zabky$nadrz)
```

```

 2  4  5  9 14 15 21 22 27 34 40 45 51 52 53 54
19 43 44 38 40 43 19 47 16 12 40 11 15 41 39 18
```


```
# Počet žabek z vyschlých a nevyschlých nádrží
table(data_zabky$vyschnuti)
```

```
nevyschla   vyschla
      190       295
```

Z nádrží vylezlo nestejně mnoho žabek: nejméně 11, nejvíce 47. Z vyschlých nádrží pochází 295 žabek, z nevyschlých jen 190, přestože do každé nádrže bylo na začátku vysazeno stejně pulců.

3.4 Jak velké jsou žabky z vyschlých a nevyschlých nádrží?

Začneme houslovým grafem (violin plot) délky těla pro obě skupiny nádrží. Šířka „houslí" ukazuje, kolik žabek mělo danou délku; uvnitř je úzký krabicový graf (boxplot) s mediánem a body jsou jednotlivé žabky.



Obrázek 4: Délka těla žabek z nevyschlých a z vyschlých nádrží. Houslový graf ukazuje rozdělení délek, úzký krabicový graf medián a kvartily, body jednotlivé žabky.

Doplňující: jak nakreslit houslový graf v R

Základní grafika v R houslový graf nenabízí, a proto použijeme balíček `ggplot2`. Vrstvy se přidávají znaménkem `+`: housle, jednotlivé body a úzký krabicový graf.

```
# Houslový graf délky těla podle vyschnutí nádrže
ggplot2::ggplot(
  data = data_zabky,
  mapping = ggplot2::aes(
```

```
    x = vyschnuti,
    y = delka_tela_mm,
    fill = vyschnuti
  )
) +
  # Housle: rozdělení délek v každé skupině
  ggplot2::geom_violin(alpha = 0.3) +
  # Jednotlivé žabky s malým náhodným posunem do stran
  ggplot2::geom_jitter(
    width = 0.1,
    alpha = 0.4
  ) +
  # Úzký krabicový graf s mediánem a kvartily
  ggplot2::geom_boxplot(
    width = 0.1,
    fill = "white",
    outlier.shape = NA
  ) +
  ggplot2::labs(
    x = "Nádrž před pokusem",
    y = "Délka těla (mm)"
  ) +
  ggplot2::theme_bw(base_size = 14)
```


Co vidíte?

Jak velký je rozdíl mezi žabkami z vyschlých a nevyschlých nádrží? Překrývají se obě skupiny?

Žabky z vyschlých nádrží měřily v průměru 24,5 mm, žabky z nevyschlých 28,0 mm. Rozdíl kolem 3,5 mm je u žabek, které typicky měří 25 mm, velký. Obě skupiny se sice překrývají, ale na první pohled to vypadá jako jasný výsledek.

3.5 Stejné žabky rozdělené podle nádrží

Stejná data můžeme rozdělit podle nádrží. Každý sloupec bodů v grafu je jedna nádrž; barva ukazuje, zda nádrž vyschla.



Obrázek 5: Délka těla žabek v jednotlivých nádržích. Nádrže jsou seřazené podle průměrné délky žabek; černá vodorovná čárka ukazuje průměr nádrže.

Co mají společného žabky z jedné nádrže?

Podívejte se na jednu nádrž a porovnejte ji s ostatními. Jsou si žabky z jedné nádrže podobnější než žabky z různých nádrží? Liší se od sebe i nádrže se stejnou úpravou?

Žabky z jedné nádrže mají často podobné délky a nádrže se od sebe liší, i když měly stejnou úpravu. Průměry nevyschlých nádrží se pohybují od 26,3 do 30,6 mm, průměry vyschlých od 23,0 do 26,7 mm. Každá nádrž měla svou vlastní vodu, své řasy a svou hustotu pulců, a to se na všech jejích žabkách projevilo společně.

Vaše vlastní studie: otázka a měření

V této lekci si krok za krokem navrhnete vlastní studii. Vymyslete ekologickou otázku, na kterou byste chtěli odpovědět měřením v terénu. Zapište si:

1. jaký organismus budete měřit a jakou veličinu (s jednotkou);
2. co budete porovnávat (dvě prostředí, gradient, ošetření);
3. kde a jak byste organismy sbírali.

Ukázka: larvy vážek v tůních

1. Larvy vážek; délka těla larvy v mm.
2. Tůně obklopené lesem a tůně mezi poli: mají larvy v lesních tůních jinou velikost?


3. V několika oblastech vybereme lesní a polní tůně a v každé tůni odchytíme síťkou několik larev.

Jde o vymyšlený příklad pro plánování; data k němu nemáme.

4 Kolik nezávislých odpovědí máme?

4.1 Žabky v nádržích, nádrže v pokusu

Data mají dvě úrovně: žabky jsou seskupené v nádržích a teprve nádrže dostaly úpravu, tedy vyschly, nebo nevyschly. Takovým datům říkáme hierarchická data.



Obrázek 6: Hierarchie dat v pokusu: úprava (vyschnutí) byla přidělena nádržím, žabky jsou seskupené v nádržích. Schéma ukazuje jen několik nádrží a žabek.

Hierarchie vzniká způsobem sběru dat a v biologii je velmi častá:

- opakovaná měření: stejného jedince měříme několikrát, například ve více dnech;
- lokality: na jedné lokalitě změříme mnoho organismů;
- bloky: plochu rozdělíme na části s podobnými podmínkami a v každé části srovnáme několik ošetření.

Ve všech těchto případech jsou si pozorování ze stejné skupiny podobnější než pozorování z různých skupin.

4.2 Na které úrovni se rozhodovalo o vyschnutí?

Kolik nezávislých odpovědí máme?

Kolik nezávislých odpovědí na otázku „mění vyschnutí tůně velikost žabek?" nám tento pokus dává? Je to 485, nebo jiné číslo?

O vyschnutí se rozhodovalo pro celou nádrž. Pokud by vyschnutí na žabky nemělo žádný vliv, mohlo by se stát, že v nádržích určených k vyschnutí byla shodou okolností horší voda nebo méně potravy. Takovou náhodu může vyrovnat jen víc nádrží, ne víc žabek z téže nádrže.

Proto rozlišujeme dvě různé jednotky:

- **jednotka pozorování** je to, co popisuje jeden řádek tabulky, tady žabka;
- **jednotka nezávislé replikace** je nejmenší jednotka, které byla úprava přidělena nezávisle na ostatních, tady nádrž.

Na otázku o vyschnutí tedy máme 16 nezávislých odpovědí: 8 vyschlých a 8 nevyschlých nádrží. Díky 485 žabkám přesně víme, jak velké žabky byly v každé nádrži, ale počet nezávislých opakování úpravy se tím nezvyšuje.

Se stejnou situací jsme se už setkali. U krabů houslistů se zeměpisná šířka měnila jen mezi slanisky, u křídlatky se teplota místa původu měnila jen mezi populacemi. V obou případech jsme si poradili tak, že jsme jednotlivé kraby a rostliny zprůměrovali a v modelu měl každý řádek jedno slanisko nebo jednu populaci. Tehdy jsme to udělali bez vysvětlení. Na žabkách ukážeme, proč bylo průměrování správné, co by se stalo bez něj a jaký model umí s takovými daty pracovat jinak: zachová všechna pozorování, a přesto počítá nezávislé skupiny.

4.3 Model, který počítá každou žabku zvlášť

Co se stane, když rozdíl mezi žabkami a nádržemi nebudeme brát v úvahu? Odhadneme známý lineární model s kategoriálním prediktorem, ve kterém je každá žabka samostatné pozorování.

```
# Každá žabka je v modelu samostatným pozorováním
mod_vsechny_zabky <-
  lm(
    formula = delka_tela_mm ~ vyschnuti,
    data = data_zabky
  )

# Zobrazíme tabulku koeficientů
summary(object = mod_vsechny_zabky)
```

```

Call:
lm(formula = delka_tela_mm ~ vyschnuti, data = data_zabky)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-5.4576 -1.4576 -0.4576  1.0368  9.5424

Coefficients:
```

```
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       27.9632     0.1551  180.28   <2e-16 ***
vyschnutivyschla  -3.5055     0.1989  -17.63   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 2.138 on 483 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.3914,    Adjusted R-squared:  0.3902
F-statistic: 310.7 on 1 and 483 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```r
# 95% intervaly spolehlivosti koeficientů
confint(object = mod_vsechny_zabky)
```


```
                   2.5 %    97.5 %
(Intercept)      27.65838 28.267936
vyschnutivyschla -3.89632 -3.114741
```

Intercept je průměrná délka žabek z nevyschlých nádrží a koeficient `vyschnutivyschla` rozdíl vyschlých nádrží oproti referenční skupině. Podle modelu jsou žabky z vyschlých nádrží v průměru o 3,51 mm menší, se standardní chybou 0,199 mm. 95% interval spolehlivosti sahá od −3,90 do −3,11 mm. Model má 483 residuálních stupňů volnosti a p-hodnota je mnohem menší než 0,001. Výsledek vypadá velmi jistě. Koeficient determinace R^2 je 0,39: vyschnutí zachycuje asi 39 % variability v délce žabek.

Jako u každého lineárního modelu zkontrolujeme residua: jejich histogram a graf residuí proti odhadnutým hodnotám.


```r
# Residua modelu, který počítá každou žabku zvlášť
vec_residua_vsechny <-
  residuals(object = mod_vsechny_zabky)

# Histogram residuí
hist(
  x = vec_residua_vsechny,
  breaks = 20,
  main = "Residua modelu se všemi žabkami",
  xlab = "Residuum (mm)",
  ylab = "Četnost",
  cex.lab = 1.2
)
```




```
# Residua proti odhadnutým hodnotám
plot(
  x = fitted(object = mod_vsechny_zabky),
  y = vec_residua_vsechny,
  xlab = "Odhadnutá délka (mm)",
  ylab = "Residuum (mm)",
  pch = 16,
  col = "#8C8C8C66",
  cex.lab = 1.2
)


abline(
  h = 0,
  lty = 2
)
```



Histogram je mírně pravostranně šikmý a residua mají v obou skupinách podobné rozptýlení. Protože prediktor má jen dvě hodnoty, tvoří body v grafu residuí dva svislé sloupce. Z těchto grafů se zdá, že model je v pořádku. Jak jsme ale viděli u přímky pro kosatce, graf residuí sám nepozná, že několik měření pochází ze stejné skupiny. Musíme residua seřadit podle nádrží:

```
# Residua rozdělená podle nádrží
stripchart(
  x = vec_residua_vsechny ~ data_zabky$nadrz,
  vertical = TRUE,
  method = "jitter",
  jitter = 0.2,
  pch = 16,
  col = "#8C8C8C88",
  xlab = "Číslo nádrže",
  ylab = "Residuum (mm)",
  cex.lab = 1.2
)

abline(
  h = 0,
  lty = 2
)
```



Residua žabek z jedné nádrže leží často společně nad nulou, nebo společně pod nulou. U 6 z 16 nádrží se průměrné residuum liší od nuly o více než 1 mm. Model tedy u celých nádrží systematicky přeceňuje nebo podceňuje délku žabek. **Residua nejsou nezávislá**: žabky z jedné nádrže se od modelu odchylují podobně.

4.4 Model, který počítá každou nádrž jednou

Druhá možnost je postup, který jsme použili u krabů: spočítáme průměr každé nádrže a model odhadneme z průměrů. Každá nádrž tak bude v modelu jen jednou.

```
# Průměrná délka žabek v každé nádrži
data_nadrze <-
  aggregate(
    x = delka_tela_mm ~ nadrz + vyschnuti,
    data = data_zabky,
    FUN = mean
  )

# Tabulka má jeden řádek pro každou nádrž
nrow(x = data_nadrze)
```

```
[1] 16
```

```
# Každá nádrž je v modelu jedním pozorováním
mod_prumery_nadrzi <-
```

```
  lm(
    formula = delka_tela_mm ~ vyschnuti,
    data = data_nadrze
  )

# Zobrazíme tabulku koeficientů a intervaly spolehlivosti
summary(object = mod_prumery_nadrzi)
```

```

Call:
lm(formula = delka_tela_mm ~ vyschnuti, data = data_nadrze)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.98815 -0.86922 -0.09299  0.61405  2.32321

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       28.3132     0.4366  64.853  < 2e-16 ***
vyschnutivyschla  -3.7634     0.6174  -6.095 2.76e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.235 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7263,    Adjusted R-squared:  0.7068
F-statistic: 37.15 on 1 and 14 DF,  p-value: 2.764e-05
```

```
confint(object = mod_prumery_nadrzi)
```


```
                    2.5 %    97.5 %
(Intercept)      27.376788 29.249517
vyschnutivyschla -5.087618 -2.439179
```

V modelu z průměrů nádrží je rozdíl vyschlých nádrží −3,76 mm se standardní chybou 0,617 mm a modelu zbývá jen 14 stupňů volnosti. Koeficient determinace je 0,73. S hodnotou 0,39 z modelu se všemi žabkami ho ale porovnat nemůžeme: podobně jako u porovnávání modelů pomocí AIC platí, že R^2 lze srovnávat jen mezi modely se stejnou odezvou a stejnými pozorováními. Tady model popisuje průměry nádrží, a ty kolísají méně než jednotlivé žabky.

Residua tohoto modelu jsou odchylky průměrů nádrží od průměru jejich skupiny. Je jich jen 16, proto stačí jeden graf:

```r
# Residua proti odhadnutým hodnotám pro model z průměrů nádrží
plot(
  x = fitted(object = mod_prumery_nadrzi),
  y = residuals(object = mod_prumery_nadrzi),
  xlab = "Odhadnutá průměrná délka v nádrži (mm)",
  ylab = "Residuum (mm)",
  pch = 16,
  cex.lab = 1.2
)

abline(
  h = 0,
  lty = 2
)
```




Obě skupiny nádrží mají podobné rozptýlení residuí a žádná nádrž nevybočuje. Každý bod je teď jedna nezávislá nádrž, takže problém s podobností žabek z jedné nádrže tento model nemá.

4.5 Který model je přesnější: všechny žabky, nebo průměry nádrží?

Než se podíváte na srovnání

Který z obou modelů dá podle vás širší interval spolehlivosti pro rozdíl mezi vyschlými a nevyschlými nádržemi? Proč?

Model	Počet pozorování	Rozdíl (mm)	SE (mm)	95% CI (mm)	df
Každá žabka zvlášť	485	−3,51	0,199	[−3,90; −3,11]	483
Každá nádrž jednou	16	−3,76	0,617	[−5,09; −2,44]	14



Obrázek 7: Odhad rozdílu délky žabek z vyschlých nádrží a jeho 95% interval spolehlivosti podle dvou modelů.

Odhad rozdílu se mezi oběma modely téměř nezměnil. **Standardní chyba je ale v modelu průměrů nádrží 3,1krát větší a interval spolehlivosti je odpovídajícím způsobem širší.** Stupně volnosti klesly z 483 na 14. Rozdíl mezi vyschlými a nevyschlými nádržemi zůstal jasný i v poctivém modelu, jen víme méně přesně, jak je velký.

4.6 Proč 16 nádrží nevydá za 485 žabek

Při práci s nejistotou odhadu jsme viděli, že standardní chyba se zmenšuje s počtem nezávislých pozorování. Model, který počítá každou žabku zvlášť, předpokládá, že každá z 485 žabek přináší novou, nezávislou informaci o vlivu vyschnutí. Žabky z jedné nádrže si ale jsou podobné: sdílejí vodu, potravu i hustotu pulců. Druhá žabka ze stejné nádrže proto o vyschnutí neřekne skoro nic nového, co by už neřekla první.

Model se všemi žabkami tak „vidí" mnohem víc nezávislé informace, než ve skutečnosti máme. Důsledkem je **příliš malá standardní chyba, příliš úzký interval spolehlivosti, příliš mnoho stupňů volnosti a příliš malá p-hodnota.** Tuto chybu nazýváme pseudoreplikace: závislá pozorování analyzujeme, jako by byla nezávislá opakování.

Pseudoreplikace má praktický důsledek, který známe z testování hypotéz. Když je standardní chyba příliš malá, testová statistika vychází příliš velká a model častěji ohlásí efekt i tam, kde žádný není. Chyba I. typu (falešný poplach) je pak mnohem pravděpodobnější, než udává zvolená hladina významnosti.

Pravidlo pro analýzu

Počet nezávislých odpovědí na otázku určuje úroveň, na které se mění zkoumaný prediktor. Když se prediktor mění jen mezi skupinami, rozhoduje počet skupin, ne počet řádků.

4.7 Pomůže změřit víc žabek z každé nádrže?

Co by pomohlo víc?

Představte si, že pokus opakujete a chcete rozdíl mezi vyschlými a nevyschlými nádržemi odhadnout přesněji. Co pomůže nejvíc?

a) Změřit v každé z 16 nádrží dvakrát víc žabek.
b) Použít dvakrát víc nádrží a v každé změřit stejný počet žabek jako dosud.
c) Měřit žabky přesněji, na desetiny milimetru.
d) Obě možnosti a) a b) pomohou stejně.

Řešení

Správně je b).

- a) Víc žabek z jedné nádrže zpřesní odhad průměru této nádrže. Nádrže se ale od sebe liší i bez ohledu na vyschnutí a tuto variabilitu víc žabek z téže nádrže nezmenší. Od určitého počtu žabek už přesnost téměř neroste.
- b) Každá nová nádrž je nová nezávislá odpověď na otázku o vyschnutí. Právě jejich počet rozhoduje o přesnosti odhadu.
- c) Přesnější měření zmenší jen malou část variability mezi žabkami; rozdíly mezi nádržemi zůstanou.
- d) Obě možnosti nepomohou stejně, viz a) a b).

Častá chyba: víc řádků znamená víc informace

Velký počet řádků v tabulce neznamená velký počet nezávislých opakování. Rozhoduje, kolik jednotek dostalo zkoumanou úpravu nebo se liší zkoumaným prediktorem nezávisle na ostatních.

4.8 Proč jsme u krabů a křídlatky pracovali s průměry

Stejná úvaha odpovídá na otázku, kterou jsme si položili u krabů. Zeměpisná šířka se mění jen mezi slanisky: všichni krabi z jednoho slaniska mají stejnou zeměpisnou šířku. Na otázku, zda jsou krabi na severu větší, tedy máme 13 nezávislých odpovědí, ne 392. Kdybychom do modelu dali všechny kraby, standardní chyba sklonu by vyšla 0,034 mm na stupeň. Z průměrů slanisek vychází 0,079 mm na stupeň, tedy zhruba 2,4krát víc. Průměry slanisek byly poctivé řešení.

Stejně jsme postupovali u křídlatky: tloušťku listů jednotlivých rostlin jsme zprůměrovali za každou populaci, protože teplota místa původu se mění jen mezi populacemi.

4.9 Co průměry nádrží zahodí

Model z průměrů je poctivý, ale má svou cenu:

- nádrž s 11 žabkami a nádrž se 47 žabkami se v něm počítají stejně, ačkoli průměr větší nádrže je mnohem přesnější;
- ztratíme informaci o rozdílech mezi žabkami uvnitř nádrže;
- nemůžeme použít prediktory, které se mění u jednotlivých žabek, například den, kdy žabka vylezla z vody.

Zůstává tedy otázka: dá se sestavit model, který zachová každou žabku, a přesto bude počítat nezávislé nádrže, a ne nezávislé žabky?

Vaše vlastní studie: kolik nezávislých odpovědí?

Vraťte se ke své studii. Na které úrovni se mění prediktor, který vás zajímá? Co je ve vaší studii jednotkou nezávislé replikace? Kolik takových jednotek byste reálně zvládli prozkoumat a kolik měření byste udělali v každé z nich?

Ukázka: larvy vážek v tůních

Okolí tůně (les nebo pole) se mění mezi tůněmi, ne mezi larvami. Jednotkou nezávislé replikace je proto tůň. Raději prozkoumáme víc tůní s menším počtem larev, například 24 tůní po 10 larvách, než 4 tůně po 60 larvách.

5 Nádrž jako další prediktor?

5.1 Co se stane, když přidáme nádrž do modelu?

Z předchozích lekcí víme, že do modelu můžeme přidat další prediktor. Nabízí se tedy přidat číslo nádrže jako kategoriální prediktor, aby model věděl, která žabka je z které nádrže.

Předpovězte výsledek

Co podle vás model vypíše pro rozdíl mezi vyschlými a nevyschlými nádržemi, když do něj přidáme nádrž jako kategoriální prediktor?

```
# Nádrž přidáme jako kategoriální prediktor před vyschnutí
mod_nadrz_pevne <-
  lm(
```

```
    formula = delka_tela_mm ~ factor(nadrz) + vyschnuti,
    data = data_zabky
  )

# Zobrazíme celý souhrn modelu
summary(object = mod_nadrz_pevne)
```

```

Call:
lm(formula = delka_tela_mm ~ factor(nadrz) + vyschnuti, data = data_zabky)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-5.1395 -1.1395 -0.2667  0.7250  9.9512

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       26.6842     0.4359  61.219  < 2e-16 ***
factor(nadrz)4    -1.5447     0.5234  -2.951 0.003323 **
factor(nadrz)5    -2.2751     0.5216  -4.362 1.59e-05 ***
factor(nadrz)9     2.5263     0.5338   4.732 2.94e-06 ***
factor(nadrz)14    0.5908     0.5294   1.116 0.264989
factor(nadrz)15   -2.5447     0.5234  -4.862 1.59e-06 ***
factor(nadrz)21   -2.9474     0.6164  -4.781 2.33e-06 ***
factor(nadrz)22   -1.8544     0.5165  -3.590 0.000365 ***
factor(nadrz)27    0.4408     0.6447   0.684 0.494479
factor(nadrz)34    2.3158     0.7006   3.306 0.001021 **
factor(nadrz)40   -0.3592     0.5294  -0.679 0.497755
factor(nadrz)45    3.9522     0.7198   5.490 6.58e-08 ***
factor(nadrz)51    1.5825     0.6562   2.411 0.016275 *
factor(nadrz)52   -3.6354     0.5273  -6.895 1.75e-11 ***
factor(nadrz)53   -2.2740     0.5316  -4.278 2.29e-05 ***
factor(nadrz)54    1.9825     0.6249   3.172 0.001612 **
vyschnutivyschla       NA         NA      NA       NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.9 on 469 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5334,    Adjusted R-squared:  0.5184
F-statistic: 35.74 on 15 and 469 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Tabulka koeficientů má pro každou nádrž kromě referenční vlastní řádek: rozdíl průměru této nádrže oproti nádrži 2. V posledním řádku, u vyschnutí, ale místo čísel stojí `NA` a nad tabulkou

R upozorňuje `(1 not defined because of singularities)`: jeden koeficient nešel odhadnout. Rozdíl mezi vyschlými a nevyschlými nádržemi model neodhadl.

Doplňující: co se stane s opačným pořadím prediktorů

Když v zápisu modelu uvedeme vyschnutí před nádrží (`delka_tela_mm ~ vyschnuti + factor(nadrz)`), R vypíše pro vyschnutí číslo −1,98 mm a místo toho vynechá nádrž 54. Toto číslo ale není vliv vyschnutí. Je to jen rozdíl mezi průměrem nádrže 2 (26,68 mm) a nádrže 54 (28,67 mm). Podle toho, kterou nádrž R vynechá, by vyšlo pokaždé jiné číslo.

5.2 Vyschnutí a nádrž nesou stejnou informaci

Proč model selhal? Každá nádrž buď vyschla, nebo nevyschla. Jakmile má každá nádrž v modelu vlastní koeficient, je v nich zahrnuto i vyschnutí: průměr vyschlých nádrží je jen průměr několika nádrží. Pro samostatný koeficient vyschnutí už v datech nezbývá žádná informace.

Nádrž jsme tu použili jako pevný faktor: kategoriální prediktor, jehož každá úroveň má v modelu vlastní koeficient a jehož konkrétní úrovně nás zajímají. Z toho plyne obecné pravidlo:

Pravidlo pro analýzu

Prediktor, který se mění jen mezi skupinami, nemůže být v modelu zároveň se skupinou jako pevným faktorem. Skupina by „spotřebovala" všechnu informaci, ze které by se jeho vliv dal odhadnout.

5.3 Souvisí den metamorfózy s délkou žabky?

Nádrž jako pevný faktor ale v jiné situaci velmi pomůže. Žabky z jedné nádrže nevylezly z vody najednou: první vylezly po 41 dnech od začátku pokusu, poslední po 82 dnech. Den metamorfózy se tedy mění **uvnitř** nádrží, u jednotlivých žabek. Jsou žabky, které vylezly později, větší, nebo menší?

Předpovězte směr vztahu

Pulec, který zůstane ve vodě déle, má víc času růst. Čekali byste, že žabky, které vylezly později, budou větší? Co asi ukáže model, který nádrže nebere v úvahu?

```
# Vztah délky ke dni metamorfózy bez ohledu na nádrže
mod_den <-
  lm(
    formula = delka_tela_mm ~ den_pokusu,
    data = data_zabky
  )
```


```r
# Stejný vztah uvnitř nádrží: nádrž jako kategoriální prediktor
mod_den_nadrz <-
  lm(
    formula = delka_tela_mm ~ den_pokusu + factor(nadrz),
    data = data_zabky
  )

# Porovnáme odhad sklonu dne v obou modelech (zaokrouhleno)
round(
  x = coef(summary(mod_den))["den_pokusu", ],
  digits = 3
)
```

```
  Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
    -0.007      0.018     -0.399      0.690
```

```r
round(
  x = coef(summary(mod_den_nadrz))["den_pokusu", ],
  digits = 3
)
```

```
  Estimate Std. Error    t value   Pr(>|t|)
     0.233      0.012     19.437      0.000
```



Obrázek 8: Délka žabky podle dne, kdy vylezla z vody. Vlevo jedna přímka pro všechny žabky, vpravo stejná data s přímkami uvnitř jednotlivých nádrží z modelu s nádrží jako kategoriálním prediktorem.

Bez ohledu na nádrže vychází sklon −0,007 mm za den s p-hodnotou 0,69: žádný zřetelný vztah. Když ale do modelu přidáme nádrž, sklon vyjde 0,23 mm za den se standardní chybou 0,012 mm. **Uvnitř každé nádrže jsou žabky, které vylezly později, zřetelně větší**, za deset dní navíc v průměru asi o 2,3 mm.

5.4 Proč se vztah ukázal až uvnitř nádrží

Z vyschlých nádrží vylézaly žabky v průměru později (58. den pokusu) než z nevyschlých (49. den pokusu), a přitom byly menší. Když všechny žabky smícháme dohromady, rozdíly **mezi** nádržemi překryjí vztah **uvnitř** nádrží a přímka vyjde téměř vodorovná. Vztah se ukáže, až když model porovnává žabky ze stejné nádrže.

Tady nádrž jako pevný faktor pomohla, protože den metamorfózy se mění uvnitř nádrží. Model porovnává žabky ze stejné nádrže a rozdíly mezi nádržemi z porovnání odstraní. Stejnou situaci známe z terénních pokusů s **bloky**: pole rozdělíme na několik částí s podobnými podmínkami a v každé části porovnáme všechna ošetření. Blok jako kategoriální prediktor odstraní rozdíly mezi částmi pole a porovnání ošetření se zpřesní. Totéž platí pro opakovaná měření jednoho jedince.

Pro otázku o vyschnutí nám ale pevný faktor nepomůže. Potřebujeme model, který zachová všechny žabky a přitom pozná, že vyschnutí se mění jen mezi nádržemi.

Vaše vlastní studie: co se mění uvnitř jednotek?

Co ve vaší studii se mění uvnitř jednotek nezávislé replikace (datum odběru, místo v tůni, velikostní třída, pozorovatel)? Dalo by se jednotky seskupit do bloků s podobnými podmínkami?

Ukázka: larvy vážek v tůních

Uvnitř tůně se mění velikost a stadium larev a datum odběru. Lesní a polní tůně můžeme vybírat ve stejných oblastech, například v 6 oblastech po 2 lesních a 2 polních tůních. Oblast je pak blok: lesní a polní tůně porovnáváme v podobném podnebí.


6 Každá nádrž má vlastní výchozí úroveň

6.1 Nádrže jako výběr z mnoha možných tůní



Obrázek 9: Několik pokusných nádrží zastupuje mnoho možných tůní v krajině. Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Zajímá nás nádrž číslo 27 sama o sobě? Ne. Nádrže jsou pro nás výběr z mnoha tůní, které mohly vyschnout, nebo nevyschnout. Kdybychom pokus opakovali, použili bychom jiné nádrže, s jinou vodou a jinými řasami. Zajímá nás, jak moc se tůně mezi sebou typicky liší, a ne, o kolik je právě nádrž 27 lepší než nádrž 54.



Obrázek 10: Průměrná délka žabek v každé nádrži. Svislá čárka ukazuje průměr nádrží s danou úpravou; nádrže se kolem něj rozptylují na obě strany.

Výchozí úrovně nádrží se rozptylují kolem průměru své úpravy, některé výš, jiné níž. Můžeme si je představit jako náhodné tahy z rozdělení, které má tvar podobný normálnímu rozdělení z předchozí lekce. Takovou skupinovou proměnnou, jejíž úrovně chápeme jako výběr z většího souboru možných úrovní, nazýváme náhodný faktor. Odchylky jednotlivých skupin od průměru jsou pak **náhodné efekty**.

6.2 Z čeho se skládá délka jedné žabky

Délku každé žabky můžeme rozložit na tři části: průměr její skupiny nádrží, odchylku její nádrže a odchylku žabky od výchozí úrovně nádrže. První dvě části dávají odhadnutou délku žabky. Slovy:

$$\text{odhadnutá délka žabky} = \text{intercept} + \text{rozdíl po vyschnutí} \times \text{vyschla} + \text{odchylka nádrže}$$

Veličina *vyschla* je 1 pro nádrž, která vyschla, a 0 pro nádrž, která nevyschla; rozdíl po vyschnutí se tedy přičte jen u vyschlých nádrží.

Skutečná délka žabky se od odhadnuté liší ještě o residuum, tedy o odchylku žabky od výchozí úrovně její nádrže.

Podívejme se na jednu konkrétní žabku z nádrže 45. Čísla pocházejí z modelu, který odhadneme v následující části:

Veličina	Hodnota
nádrž	45 (nevyschla)
naměřená délka žabky	29 mm
intercept (průměr nevyschlých nádrží)	28,27 mm

Veličina	Hodnota
rozdíl po vyschnutí	−3,73 mm
vyschla nádrž? (1 = ano, 0 = ne)	0
odchylka nádrže 45	1,89 mm

$$\begin{aligned}\text{odhadnutá délka žabky} &= 28{,}27 + (-3{,}73) \times 0 + 1{,}89 \\ &= 28{,}27 + 0{,}00 + 1{,}89 \\ &= 30{,}16 \text{ mm}\end{aligned}$$

Žabka měřila 29 mm, její residuum je tedy 29 − 30,16 = −1,16 mm. Nádrž 45 patřila k nádržím s většími žabkami, proto je její odchylka kladná.

Stejný zápis obecně, pro žabku i z nádrže j:

$$y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 x_j + u_j + e_{ij}$$

- y_{ij} je délka žabky i z nádrže j;
- β_0 je intercept, průměrná délka žabek z nevyschlých nádrží (řádek `(Intercept)` ve výstupu R);
- β_1 je rozdíl vyschlých nádrží oproti nevyschlým (řádek `vyschnutivyschla`);
- x_j je 1, pokud nádrž j vyschla, a 0, pokud nevyschla; mění se jen mezi nádržemi, proto má jen index j;
- u_j je odchylka nádrže j od průměru její úpravy, tedy posun její **výchozí úrovně**;
- e_{ij} je residuum, odchylka žabky i od výchozí úrovně její nádrže.

Nové je u_j. Model neodhaduje každou odchylku nádrže jako samostatný koeficient, jako to dělal pevný faktor. Předpokládá, že odchylky nádrží pocházejí z normálního rozdělení s průměrem 0 a s neznámou směrodatnou odchylkou, kterou z dat odhadne. Protože odchylka u_j posouvá intercept každé nádrže, nazýváme tento člen **náhodný intercept**. Model, který obsahuje pevné efekty (vyschnutí) i náhodné efekty (nádrže), je **smíšený model**.

6.3 Model s náhodným interceptem v R

Funkce `lm()`, se kterou jsme dosud pracovali, náhodné efekty odhadnout neumí. Každý prediktor v ní dostane vlastní koeficienty, takže nádrž by v ní mohla být jen pevným faktorem, a to jsme už viděli, že nefunguje. Pro smíšené modely existuje v R několik balíčků. Všechny dělají v jádru totéž. Liší se tím, jak složité je s nimi pracovat, kolik různých úloh zvládnou a jaké mají nevýhody:

Balíček a funkce	Složitost	Všestrannost	Nevýhody
`nlme`, funkce `lme()`	náhodné efekty se zapisují zvláštním argumentem mimo vzorec	jen pro spojitá měření, jako je délka nebo hmotnost	starší; jiný zápis, než jaký najdete ve většině novějších článků

Balíček a funkce	Složitost	Všestrannost	Nevýhody
`lme4`, funkce `lmer()` a `glmer()`	náhodné efekty se zapisují přímo do vzorce	spojitá měření i odezvy typu ano/ne a počty, každé jinou funkcí	`lmer()` sama nevypisuje p-hodnoty
`glmmTMB`, funkce `glmmTMB()`	stejný zápis jako `lme4`	spojitá měření i odezvy typu ano/ne a počty jednou funkcí; i složitější modely	výstup obsahuje víc částí, než zatím potřebujeme
`brms`, funkce `brm()`	jiný, bayesovský přístup ke statistice	velmi všestranný	výpočet trvá dlouho a potřebuje další software; přesahuje rámec kurzu

V kurzu použijeme `glmmTMB()`, a to z několika důvodů:

- **Stejný zápis vzorce jako `lm()`.** Model zapíšeme stejně jako dosud, jen přidáme náhodný efekt. Zápis `(1 | nadrz)` je navíc stejný jako v balíčku `lme4`, takže mu porozumíte i ve většině vědeckých článků.
- **Jedna funkce pro různé typy odezvy.** V následující lekci budeme modelovat odezvy typu ano/ne a počty. `glmmTMB()` takové modely umí také, včetně náhodných efektů, takže se nemusíme učit novou funkci.
- **Přehledný výstup.** Souhrn modelu obsahuje odhady, standardní chyby i p-hodnoty pevných efektů a směrodatné odchylky náhodných efektů.
- **Spolehlivost.** Balíček je aktivně vyvíjený, rychlý a i složitější modely obvykle odhadne bez potíží.

Funkce `glmmTMB()` umí odhadnout i úplně obyčejný lineární model bez náhodných efektů, a dá přitom stejné výsledky jako `lm()`. Navíc nabízí možnosti, které `lm()` nemá: náhodné efekty, modely pro odezvy typu ano/ne nebo počty a také různou variabilitu residuí v různých skupinách.

Balíček stačí nainstalovat jednou. Následující kód ověří, zda je balíček k dispozici, a pokud chybí, zastaví se se srozumitelnou zprávou.

```
# Balíček stačí nainstalovat jednou:
# install.packages("glmmTMB")

if (
  !requireNamespace(
    package = "glmmTMB",
    quietly = TRUE
  )) {
  stop(
    "Chybí balíček {glmmTMB}. Nainstalujte ho, viz komentář výše.",
```

```
    call. = FALSE
  )
}
```

Ověříme, že `glmmTMB()` bez náhodného efektu odhadne stejný model jako `lm()` se všemi žabkami:

```
# Stejný model jako mod_vsechny_zabky, jen jinou funkcí
mod_bez_nadrzi <-
  glmmTMB::glmmTMB(
    formula = delka_tela_mm ~ vyschnuti,
    data = data_zabky,
    REML = TRUE
  )

# Koeficienty z lm() a z glmmTMB()
coef(object = mod_vsechny_zabky)
```

```
     (Intercept) vyschnutivyschla
       27.963158        -3.505531
```

```
glmmTMB::fixef(object = mod_bez_nadrzi)
```

```


Conditional model:
     (Intercept)  vyschnutivyschla
          27.963            -3.506
```

Oba modely odhadly stejný intercept i stejný rozdíl po vyschnutí. Do vzorce teď stačí přidat náhodný intercept pro nádrž:

```
# Vyschnutí je pevný efekt, nádrž náhodný intercept
mod_smiseny <-
  glmmTMB::glmmTMB(
    formula = delka_tela_mm ~ vyschnuti + (1 | nadrz),
    data = data_zabky,
    REML = TRUE
  )
```

Zápis vzorce je stejný jako u `lm()`, jen přibyl člen `(1 | nadrz)`. Čteme ho „intercept (`1`) se liší podle (`|`) nádrže". Argument `REML = TRUE` říká, aby model odhadl rozdíly mezi nádržemi až po zohlednění vlivu vyschnutí. Podobně jsme u směrodatné odchylky dělili `n - 1` místo `n`, aby nevyšla systematicky menší.

6.4 Jak velký je rozdíl a jak přesně ho známe

```
# Souhrn smíšeného modelu
summary(object = mod_smiseny)
```

```
 Family: gaussian  ( identity )
Formula:          delka_tela_mm ~ vyschnuti + (1 | nadrz)
Data: data_zabky

      AIC       BIC    logLik -2*log(L)  df.resid
   2043.2    2059.9   -1017.6    2035.2       481

Random effects:

Conditional model:
 Groups   Name        Variance Std.Dev.
 nadrz    (Intercept) 1.310    1.145
 Residual             3.612    1.901
Number of obs: 485, groups:  nadrz, 16

Dispersion estimate for gaussian family (sigma^2): 3.61

Conditional model:
                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)       28.2667     0.4336   65.19  < 2e-16 ***
vyschnutivyschla  -3.7280     0.6044   -6.17 6.93e-10 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
# 95% intervaly spolehlivosti pevných efektů (parm = "beta_")
confint(
  object = mod_smiseny,
  parm = "beta_"
)
```

```
                    2.5 %    97.5 % Estimate
(Intercept)      27.416857 29.116476 28.26667
vyschnutivyschla -4.912673 -2.543287 -3.72798
```

Horní část výstupu (`AIC`, `BIC`, `logLik`) zatím nepotřebujeme. Řádek začínající `Number of obs` potvrzuje, že model zná 485 žabek v 16 nádržích. V části `Conditional model` najdeme tabulku pevných efektů. Čte se stejně jako u `lm()`: intercept je průměr nevyschlých nádrží a koeficient

`vyschnutivyschla` rozdíl vyschlých nádrží. Žabky z vyschlých nádrží jsou podle smíšeného modelu o 3,73 mm menší, se standardní chybou 0,604 mm a s 95% intervalem spolehlivosti od −4,91 do −2,54 mm.

Standardní chyba je téměř stejná jako v modelu z průměrů nádrží (0,617 mm), ačkoli model pracuje se všemi 485 žabkami. Smíšený model tedy „poznal", že vyschnutí se mění jen mezi 16 nádržemi.

Ve výstupu místo `t value` stojí `z value` (zde −6,17) a p-hodnota se počítá z normálního rozdělení místo t-rozdělení. Normální rozdělení odpovídá t-rozdělení s velmi mnoha stupni volnosti. Při 16 nádržích je proto interval smíšeného modelu o něco užší a p-hodnota menší, než by byly při přesnějším výpočtu. Na závěru o vyschnutí to nic nemění.

6.5 Jak moc se liší nádrže a jak moc žabky v jedné nádrži

V části `Random effects` výstupu jsou dva řádky:

- `nadrz (Intercept)`: směrodatná odchylka výchozích úrovní nádrží, 1,14 mm. Typická nádrž se od průměru své úpravy liší asi o 1,1 mm.
- `Residual`: směrodatná odchylka residuí, 1,90 mm. Typická žabka se od výchozí úrovně své nádrže liší asi o 1,9 mm.

Kde je víc variability?

Liší se víc nádrže mezi sebou, nebo žabky uvnitř jedné nádrže?


Žabky uvnitř nádrže se liší víc než nádrže mezi sebou. Rozdíly mezi nádržemi přesto nejsou zanedbatelné. Když obě směrodatné odchylky umocníme na druhou, dostaneme rozptyly, které se dají sčítat:

$$\text{podíl variability mezi nádržemi} = \frac{\text{rozptyl mezi nádržemi}}{\text{rozptyl mezi nádržemi} + \text{rozptyl mezi žabkami v nádrži}}$$

$$\frac{1{,}14^2}{1{,}14^2 + 1{,}90^2} = \frac{1{,}31}{1{,}31 + 3{,}61} = 0{,}27$$

Přibližně 27 % variability v délce žabek, která zbývá po zohlednění vyschnutí, připadá na rozdíly mezi nádržemi a zbytek na rozdíly mezi žabkami jedné nádrže. Právě tato podobnost žabek z jedné nádrže způsobila, že model se všemi žabkami tak silně podhodnotil nejistotu.

6.6 Kde leží odhadnuté výchozí úrovně nádrží?



Obrázek 11: Pro každou nádrž: průměr jejích žabek (prázdný kruh) a výchozí úroveň odhadnutá smíšeným modelem (plný kruh). Přerušované čáry ukazují odhad modelu pro nevyschlé a vyschlé nádrže. Nádrže jsou seřazené podle počtu žabek.

Výchozí úrovně nádrží ze smíšeného modelu leží blízko průměrů nádrží, ale o kousek blíž k průměru své úpravy. Nejvíc se posunula nádrž 45, ze které vylezlo jen 11 žabek, a to o 0,47 mm. Nádrže se 40 a více žabkami se posunuly nanejvýš o 0,13 mm. Model tak odhaduje výchozí úroveň malé nádrže opatrněji: z mála žabek nelze její průměr určit tak přesně, a model si proto „půjčí" část informace od ostatních nádrží.


6.7 Co prozradí residua a výchozí úrovně nádrží

Jako u každého modelu zkontrolujeme residua. U smíšeného modelu máme navíc odhadnuté odchylky nádrží, o kterých model předpokládá, že pocházejí z normálního rozdělení.

```
# Residua: odchylky žabek od výchozí úrovně jejich nádrže
vec_residua <-
  residuals(object = mod_smiseny)


# Histogram residuí
hist(
  x = vec_residua,
  breaks = 20,
  main = "Residua smíšeného modelu",
  xlab = "Residuum (mm)",
  ylab = "Četnost",
```

```
  cex.lab = 1.2
)
```




```
# Residua proti odhadnutým hodnotám (včetně výchozí úrovně nádrže)
plot(
  x = fitted(object = mod_smiseny),
  y = vec_residua,
  xlab = "Odhadnutá délka (mm)",
  ylab = "Residuum (mm)",
  pch = 16,
  col = "#8C8C8C66",
  cex.lab = 1.2
)


abline(
  h = 0,
  lty = 2
)
```



V modelu se všemi žabkami tvořila residua jen dva sloupce. Ve smíšeném modelu má každá nádrž vlastní odhad, a body se proto rozprostřely po celé ose odhadnutých hodnot. Rozptýlení residuí je podobné u malých i velkých odhadů.

```
# Q–Q graf residuí
qqnorm(
  y = vec_residua,
  main = "Q–Q graf residuí",
  xlab = "Teoretické kvantily",
  ylab = "Residua (mm)"
)


qqline(y = vec_residua)
```




```
# Odhadnuté odchylky (posuny výchozích úrovní) nádrží
vec_odchylky_nadrzi <-
  glmmTMB::ranef(object = mod_smiseny)$cond$nadrz[, 1]

# Q–Q graf odchylek nádrží
qqnorm(
  y = vec_odchylky_nadrzi,
  main = "Q–Q graf odchylek nádrží",
  xlab = "Teoretické kvantily",
  ylab = "Odchylka nádrže (mm)"
)

qqline(y = vec_odchylky_nadrzi)
```



Residua jsou pravostranně šikmá: několik žabek bylo mnohem větších, než by odpovídalo jejich nádrži, a na Q–Q grafu se body vpravo nahoře odklánějí od přímky. Stejný tvar jsme v předchozí lekci viděli u velikostí, které vznikají růstem. Odchylka od normálního tvaru je mírná a závěr o vyschnutí na ní nestojí: stejný rozdíl ukázal i model z průměrů nádrží, jehož residua se týkají celých nádrží. Odhadnuté odchylky nádrží leží přibližně na přímce. Je jich ovšem jen 16, takže jejich tvar posuzujeme jen hrubě.

Doplňující: platí totéž pro suchou hmotnost?

Suchá hmotnost dává stejný obraz. Podle smíšeného modelu vážily žabky z vyschlých nádrží v sušině o 0,096 g méně, se standardní chybou 0,023 g. Model se všemi žabkami by uvedl standardní chybu 0,0077 g, model z průměrů nádrží 0,024 g. Residua hmotnosti jsou ještě šikmější než residua délky, protože hmotnost roste s délkou zhruba třetí mocninou.

6.8 Jakou část variability zachytil model se všemi žabkami?

U lineárních modelů jsme se ptali, jakou část variability odezvy model zachytí. Odpověď dával koeficient determinace R^2. Stejnou otázku si položíme i u smíšeného modelu. Abychom ji mohli zodpovědět, připomeneme si na modelu, který počítá každou žabku zvlášť, odkud se R^2 bere.

R^2 se počítá ze dvou součtů čtverců:

- Celkový součet čtverců měří, jak moc se délky všech žabek liší od jejich společného průměru. Popisuje variabilitu dřív, než použijeme jakýkoli prediktor.
- Součet čtverců residuí (RSS) měří, kolik z těchto rozdílů zůstane, když každé žabce přiřadíme odhad modelu, tedy průměr její úpravy.

Zachycený podíl variability je ta část celkového součtu čtverců, která po přidání prediktoru z residuí zmizela:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{součet čtverců residuí}}{\text{celkový součet čtverců}}$$

Pro model, který počítá každou žabku zvlášť:

$$R^2 = 1 - \frac{2\ 208{,}0}{3\ 628{,}1} = 0{,}39$$

Vyšlo stejné číslo jako `Multiple R-squared` ve výstupu `summary()`. Stejnou úvahu jsme poznali u analýzy rozptylu: celkový součet čtverců se rozdělil na část **mezi skupinami**, kterou zachytí rozdílné průměry skupin, a na část **uvnitř skupin**, která zbude jako residua. V modelu se všemi žabkami jsou skupinami vyschlé a nevyschlé nádrže. Rozdíly mezi nádržemi se stejnou úpravou model nezná, takže skončily v residuích spolu s rozdíly mezi žabkami.

6.9 Koeficient determinace jako podíl rozptylu

Součty čtverců rostou s počtem žabek. Když je vydělíme počtem žabek bez jedné, dostaneme rozptyly. Rozptyl je druhá mocnina směrodatné odchylky a má tu výhodu, že se rozptyly nezávislých částí dají sčítat. Rozptyl naměřených délek se rozpadne na dvě části:

$$\text{rozptyl délek} = \text{rozptyl zachycený vyschnutím} + \text{rozptyl residuí}$$

Rozptyl zachycený vyschnutím je rozptyl odhadnutých hodnot modelu. Každá žabka v nich dostane průměr své úpravy, takže tato část obsahuje jen rozdíl mezi vyschlými a nevyschlými nádržemi.

Část variability	Rozptyl (mm²)
zachycená vyschnutím (odhadnuté hodnoty)	2,93
residua (rozdíly mezi žabkami se stejnou úpravou)	4,56
celkem (naměřené délky)	7,50

$$7{,}50 = 2{,}93 + 4{,}56$$

Podíl první části na celku je opět R^2:

$$R^2 = \frac{\text{rozptyl zachycený vyschnutím}}{\text{rozptyl délek}} = \frac{2{,}93}{7{,}50} = 0{,}39$$

Obě cesty vedou ke stejnému číslu. Pohled přes rozptyly se hodí pro smíšený model, protože ten ve výstupu neukazuje součty čtverců, ale směrodatné odchylky, ze kterých rozptyly snadno dostaneme.

6.10 Tři části variability v délce žabek


V modelu se všemi žabkami tvořila residua jednu velkou část. Smíšený model z ní oddělil rozdíly mezi nádržemi. Z části `Random effects` jsme už přečetli rozptyl mezi nádržemi a rozptyl mezi žabkami v jedné nádrži. Spolu s rozptylem zachyceným vyschnutím tak máme tři části variability:

$$\text{celkový rozptyl} = \text{rozptyl zachycený vyschnutím} + \text{rozptyl mezi nádržemi} + \text{rozptyl mezi žabkami v nádrži}$$

Odhadněte předem

Na kterou ze tří částí podle vás připadne největší díl variability v délce žabek: na vyschnutí, na rozdíly mezi nádržemi, nebo na rozdíly mezi žabkami jedné nádrže?

Část variability	Rozptyl (mm²)	Podíl
zachycená vyschnutím	2,93	37 %
rozdíly mezi nádržemi	1,31	17 %
rozdíly mezi žabkami v nádrži	3,61	46 %
celkem	7,86	100 %



Obrázek 12: Rozdělení variability v délce žabek. Horní pruh: model, který počítá každou žabku zvlášť. Dolní pruh: smíšený model, ve kterém se residua rozdělila na rozdíly mezi nádržemi a rozdíly mezi žabkami jedné nádrže.

Největší část variability připadá na rozdíly mezi žabkami jedné nádrže. Vyschnutí zachytí o něco méně a rozdíly mezi nádržemi tvoří menší, ale zřetelnou část. Podíl vyschnutí je v obou modelech podobný: smíšený model vyschnutí nic neubral, jen rozdělil residua na dvě části.

Součet tří částí (7,86 mm²) je o něco větší než rozptyl naměřených délek (7,50 mm²). Smíšený model totiž rozptyl mezi nádržemi nepočítá jen z našich 16 nádrží, ale odhaduje ho pro celý soubor

nádrží, ze kterého naše nádrže pocházejí. Proto vyšel podíl vyschnutí o kousek menší než R^2 modelu se všemi žabkami.

Pozor: dva různé podíly nádrží

V části o rozdílech mezi nádržemi a mezi žabkami jsme spočítali, že na nádrže připadá asi 27 % variability. Tady vyšlo asi 17 %. Obě čísla jsou správná, ale mají jiný jmenovatel. Dřívější podíl se počítal jen z variability, která zbyla po zohlednění vyschnutí. Tady počítáme z celé variability v délce žabek, včetně části zachycené vyschnutím.

6.11 Marginální a podmíněné R^2

Ze tří částí variability můžeme spočítat dvě různá R^2. Liší se tím, které části počítáme jako zachycené modelem:

- **Marginální R^2** počítá jako zachycenou jen část připadající na pevné efekty, tady na vyschnutí. Odpovídá na otázku: kolik variability zachytí prediktor, který nás zajímá?
- **Podmíněné R^2** počítá jako zachycené pevné i náhodné efekty, tady vyschnutí i rozdíly mezi nádržemi. Odpovídá na otázku: kolik variability zachytí celý model, když zná i výchozí úrovně nádrží?

Slovy:

$$\text{marginální } R^2 = \frac{\text{rozptyl zachycený vyschnutím}}{\text{celkový rozptyl}}$$

$$\text{podmíněné } R^2 = \frac{\text{rozptyl zachycený vyschnutím} + \text{rozptyl mezi nádržemi}}{\text{celkový rozptyl}}$$

S čísly z našeho modelu:

$$\text{marginální } R^2 = \frac{2{,}93}{2{,}93 + 1{,}31 + 3{,}61} = 0{,}37$$

$$\text{podmíněné } R^2 = \frac{2{,}93 + 1{,}31}{2{,}93 + 1{,}31 + 3{,}61} = 0{,}54$$

Obecně, se symboly:

$$R^2_m = \frac{\sigma^2_f}{\sigma^2_f + \sigma^2_u + \sigma^2_e}, \qquad R^2_c = \frac{\sigma^2_f + \sigma^2_u}{\sigma^2_f + \sigma^2_u + \sigma^2_e}$$

- R^2_m je marginální a R^2_c podmíněné R^2 (z anglického *marginal* a *conditional*);
- σ^2_f je rozptyl odhadů pevné části modelu, tady rozdílu mezi vyschlými a nevyschlými nádržemi;
- σ^2_u je rozptyl výchozích úrovní nádrží, tedy druhá mocnina směrodatné odchylky v řádku `nadrz (Intercept)`;
- σ^2_e je rozptyl residuí, tedy druhá mocnina směrodatné odchylky v řádku `Residual`.

Vyschnutí zachytí asi 37 % variability v délce žabek. Rozdíly mezi nádržemi přidají dalších asi 17 %, takže celý model zachytí asi 54 %. Zbylých 46 % tvoří rozdíly mezi žabkami jedné nádrže, které model nevysvětlí. Marginální a podmíněné R^2 zavedli S. Nakagawa a H. Schielzeth (2013).

Doplňující: výpočet R^2 smíšeného modelu v R

Tři rozptyly můžeme z modelu získat přímo:

```
# Rozptyl odhadů pevné části (jen vyschnutí, bez nádrží)
rozptyl_vyschnuti <-
  var(predict(object = mod_smiseny, re.form = NA))

# Rozptyl výchozích úrovní nádrží
rozptyl_mezi_nadrzemi <-
  glmmTMB::VarCorr(x = mod_smiseny)$cond$nadrz[1, 1]

# Rozptyl residuí
rozptyl_v_nadrzi <-
  sigma(object = mod_smiseny)^2

rozptyl_celkovy <-
  rozptyl_vyschnuti + rozptyl_mezi_nadrzemi + rozptyl_v_nadrzi

# Marginální a podmíněné R²
rozptyl_vyschnuti / rozptyl_celkovy
```

```
[1] 0.3734719
```

```
(rozptyl_vyschnuti + rozptyl_mezi_nadrzemi) / rozptyl_celkovy
```

```
[1] 0.540255
```

Argument `re.form = NA` říká funkci `predict()`, aby počítala odhady bez výchozích úrovní nádrží. Pro složitější modely zvládne tento výpočet například funkce `r2()` z balíčku `performance`.

6.12 Co R^2 smíšeného modelu říká a co ne

Pro R^2 smíšeného modelu platí stejná omezení jako pro R^2 lineárního modelu. Popisuje data, na kterých byl model odhadnut. Neříká, jestli jsou splněny předpoklady modelu, ty jsme kontrolovali na residuích. A neříká ani, jak přesně model odhadne délku jedné konkrétní žabky. U smíšeného modelu k tomu přibývají tři věci:

- **Vysoké podmíněné R^2 neznamená, že vyschnutí je důležité.** Velkou část podmíněného R^2 mohou tvořit rozdíly mezi nádržemi, které mají jiné příčiny. O vyschnutí vypovídá marginální R^2 a hlavně odhad rozdílu s jeho intervalem spolehlivosti.
- **Rozdíly mezi nádržemi model nevysvětluje, jen je popisuje.** Víme, že se nádrže liší, ale ne proč. Kdybychom v každé nádrži změřili třeba teplotu vody nebo hustotu pulců, mohli bychom je přidat jako prediktory a část rozptylu mezi nádržemi by se přesunula do zachycené části.
- **R^2 smíšeného modelu nelze srovnávat s R^2 modelu z průměrů nádrží.** Model z průměrů nádrží má R^2 0,73, ale jeho odezvou je průměr nádrže, ne délka žabky. Průměry kolísají mnohem méně než jednotlivé žabky, proto je podíl zachycené variability vyšší. R^2 se dá porovnávat jen mezi modely se stejnou odezvou a stejnými pozorováními.


6.13 Čtyři způsoby, jak odpovědět na stejnou otázku

Postup	Nezávislé jednotky	Rozdíl (mm)	SE (mm)
každá žabka zvlášť	485 žabek	−3,51	0,199
průměry nádrží	16 nádrží	−3,76	0,617
nádrž jako pevný faktor	—	nelze	—
náhodný intercept	16 nádrží	−3,73	0,604

Všechny postupy kromě pevného faktoru odhadly podobný rozdíl. Liší se v tom, kolik nezávislé informace si myslí, že mají. Model se všemi žabkami nejistotu podhodnotil, model z průměrů a smíšený model ji odhadly podobně. Smíšený model navíc zachoval všechny žabky, takže by do něj šly přidat i prediktory, které se mění u jednotlivých žabek, například den metamorfózy.

Kdy tedy stačí jednodušší řešení? Pokud se zkoumaný prediktor mění jen mezi skupinami, skupiny mají podobný počet pozorování a žádný další prediktor se nemění uvnitř skupin, dá model z průměrů skupin prakticky stejnou odpověď jako smíšený model. Smíšený model se vyplatí, když se počty pozorování ve skupinách výrazně liší nebo když chceme do modelu přidat i prediktory, které se mění uvnitř skupin.

Extra: Když se nádrže liší i ve sklonu



Obrázek 13: Vztah délky žabky ke dni metamorfózy v modelu, ve kterém má každá nádrž vlastní výchozí úroveň i vlastní sklon.

Náhodný intercept dovoluje nádržím různou výchozí úroveň, ale sklon vztahu je pro všechny stejný. Nádrže se mohou lišit i v tom, jak rychle délka žabek přibývá s dalšími dny ve vodě. Takovou možnost zapisujeme jako **náhodný sklon**: `(1 + den_pokusu | nadrz)` znamená, že se podle nádrže liší intercept i sklon dne. Interpretace takového modelu přesahuje rámec této lekce; stačí vědět, že tato možnost existuje a že potřebuje dostatek skupin i dostatek měření v každé z nich.

Vaše vlastní studie: zápis modelu

Napište vzorec modelu pro svou studii ve tvaru `odezva ~ prediktor + (1 | jednotka)`. Co bude jeden řádek vaší tabulky?

Ukázka: larvy vážek v tůních

Jeden řádek tabulky je jedna larva. Vzorec modelu: `delka_larvy_mm ~ okoli + (1 | tun)`, kde `okoli` má úrovně `les` a `pole`. Pokud tůně vybíráme v oblastech jako v blocích, přibude do modelu i oblast.

7 Pevný, nebo náhodný faktor?

7.1 Zajímají nás konkrétní úrovně, nebo celý soubor možných úrovní?

Stejnou skupinovou proměnnou můžeme v modelu použít jako pevný, nebo jako náhodný faktor. Rozhodnutí neplyne ze samotných dat, ale z otázky, kterou si klademe. Pomohou tyto otázky:

Pevný, nebo náhodný faktor?

1. **Zajímají nás konkrétní úrovně?** Pokud chceme vědět, jak se liší právě tyto úrovně (například tři konkrétní druhy), jde o pevný faktor. Pokud jsou úrovně jen zástupci mnoha možných (nádrže, lokality, jedinci), jde spíš o náhodný faktor.
2. **Opakovaly by se stejné úrovně v novém pokusu?** Stejné druhy nebo stejné pohlaví ano, stejné nádrže nebo stejní jedinci ne.
3. **Je úrovní dost?** Rozptyl mezi skupinami se z několika málo skupin odhaduje špatně. Jako hrubé vodítko potřebuje náhodný faktor alespoň zhruba pět úrovní, lépe víc.
4. **Na které úrovni se mění zkoumaný prediktor?** Pokud se mění jen mezi skupinami, skupina nemůže být pevným faktorem a pomůže náhodný faktor nebo model z průměrů skupin.

V našem pokusu je vyschnutí pevný faktor: zajímají nás přesně tyto dvě úrovně a opakovaly by se v každém novém pokusu. Nádrž je náhodný faktor: konkrétní nádrže nás nezajímají, v novém pokusu by byly jiné a máme jich 16.

7.2 Pevný, nebo náhodný? Šest situací z biologie

Rozhodněte

Pro každou situaci rozhodněte, zda byste skupinovou proměnnou použili jako pevný, nebo jako náhodný faktor.

1. Pokus v květináčích porovnává růst tří konkrétních druhů trav.
2. Na 20 lokalitách podél řeky měříte délku pstruhů a zajímá vás vliv teploty vody.
3. Na poli je 8 bloků a v každém bloku jsou všechny čtyři dávky hnojiva.
4. Každého z 30 netopýrů zvážíte v pěti různých měsících.
5. Porovnáváte délku křídla samců a samic.
6. Velikost ryb měříte jen ve třech jezerech.

Řešení

1. **Pevný faktor** druh. Zajímají nás právě tyto tři druhy a v novém pokusu bychom použili stejné.

2. **Náhodný faktor** lokalita. Lokality zastupují mnoho možných míst u řeky; teplota vody se mění mezi lokalitami, proto ji nelze odhadnout vedle lokality jako pevného faktoru.
3. **Náhodný faktor** blok. Bloky jsou jen části pole s podobnými podmínkami a v jiném roce by byly jinde. Blok jako pevný faktor by zde také fungoval, protože dávky hnojiva se mění uvnitř bloků.
4. **Náhodný faktor** netopýr. Jednotliví netopýři nás nezajímají a opakované vážení jednoho jedince není nezávislé.
5. **Pevný faktor** pohlaví. Dvě úrovně, které nás zajímají a opakovaly by se v každém pokusu.
6. **Spíš pevný faktor, nebo opatrnost.** Ze tří jezer se rozptyl mezi jezery odhadnout nedá. Můžeme jezera porovnat jako pevný faktor, ale závěr pak platí jen pro tato tři jezera.

7.3 Když nepomůže ani model: jedno ošetřené povodí

Smíšený model pozná, kolik nezávislých jednotek v datech je, ale nemůže je vytvořit. V experimentálním lese Hubbard Brook v USA výzkumníci pohnojili vápníkem celé jedno lesní povodí potoka a srovnávali ho s jedním sousedním, neošetřeným povodím. Ve dvou povodích změřili stovky semenáčků javoru. Úprava se ale týkala celého povodí a ošetřené povodí bylo jen jedno. Jakýkoli rozdíl mezi semenáčky může stejně dobře pocházet z vápníku jako z toho, čím se tato dvě povodí lišila odjakživa.

Podobně je tomu u pstruhů z potoka Mack Creek v Oregonu: jeden úsek potoka protéká pasekou, druhý starým lesem. Ryb je v datech stovky, ale každé prostředí (paseka, starý les) zastupuje jen jeden úsek.

Častá chyba: spoléhat na to, že statistika zachrání návrh

Když má každá úprava jen jednu nezávislou jednotku, žádný model z dat nezjistí, jak moc se jednotky liší i bez úpravy. Chybu v návrhu studie nelze opravit analýzou; je potřeba jí předejít při plánování.

Vaše vlastní studie: pevný, nebo náhodný faktor?

Které skupinové proměnné ve vaší studii budou pevné a které náhodné? Má každá úroveň zkoumaného prediktoru několik nezávislých jednotek, nebo jen jednu?

Ukázka: larvy vážek v tůních

Okolí tůně (les, pole) je pevný faktor. Tůň je náhodný faktor, stejně jako oblast, pokud jsme tůně vybírali v oblastech. Lesních i polních tůní musí být několik, ideálně v každé oblasti; jedna lesní a jedna polní tůň by byly stejná past jako jedno pohnojené povodí.

7.4 Vylézají z vyschlých nádrží menší žabky?

Se všemi nástroji z této lekce můžeme odpovědět na hlavní otázku.

Napište závěr

Napište dvě až tři věty závěru: jak velký je rozdíl mezi žabkami z vyschlých a nevyschlých nádrží, jak přesně ho známe, co bylo jednotkou nezávislé replikace a jaké je hlavní omezení studie. Potom svůj závěr porovnejte s naším.

Závěr

Žabky z nádrží, které před pokusem vyschly a znovu se naplnily, byly na konci metamorfózy v průměru o 3,7 mm kratší než žabky z nádrží, které nevyschly (95% interval spolehlivosti 2,5 až 4,9 mm). Vyschnutí zachycuje asi 37 % variability v délce žabek a rozdíly mezi nádržemi dalších asi 17 %; zbytek tvoří rozdíly mezi žabkami jedné nádrže.

Závěr má několik omezení:

- **Vyschnutí a hustota pulců se v pokusu překrývají.** Z vyschlých nádrží vylezlo 295 žabek, z nevyschlých 190. Ve vyschlých nádržích tedy přežilo víc pulců a mohli si víc konkurovat o potravu. Menší žabky mohou být důsledkem vyschnutí samotného, vyšší hustoty pulců, nebo obojího. Jde o konfundování, které tato data nedokážou rozplést.
- **16 nádrží je málo.** Odhad je proto poměrně nepřesný a residua jsou mírně šikmá.
- **Nádrže nejsou divoké tůně.** Zobecnění na skutečné tůně v krajině vyžaduje opatrnost.

8 Jak naplánovat vlastní studii

8.1 Sedm otázek před prvním měřením

Celá lekce ukázala, že o tom, co z dat půjde říct, se rozhoduje dřív, než začneme měřit. Tyto otázky si položte před každou studií, ve které budete měřit víc organismů na jednom místě nebo jeden organismus víckrát:


Sedm otázek před prvním měřením

1. **Jaká je otázka a co budu měřit?** Organismus, odezva a její jednotka.

2. **Na které úrovni se mění prediktor, který mě zajímá?** U jednotlivých organismů, nebo jen mezi skupinami (tůně, lokality, nádrže)?
3. **Co je jednotka nezávislé replikace?** Nejmenší jednotka, které byla úprava nebo hodnota prediktoru přidělena nezávisle na ostatních.
4. **Kolik jednotek a kolik měření v každé?** Pro prediktor, který se mění mezi skupinami, je počet skupin důležitější než počet měření ve skupině.
5. **Co se mění uvnitř jednotek a dá se využít?** Bloky, dvojice, opakovaná měření stejného jedince.
6. **Které skupinové proměnné budou pevné a které náhodné?** Zajímají mě konkrétní úrovně? Je jich dost?
7. **Jak bude vypadat model?** Zapište vzorec dřív, než začnete sbírat data.

K návrhu patří i dvě zásady, které známe z pokusů: kontrolní skupina se má od ošetřené lišit jen zkoumanou úpravou a úpravu je vhodné přidělit jednotkám náhodně, třeba losem. Jinak se může stát, že ošetřené jednotky se od kontrolních liší ještě něčím jiným.

8.2 Larvy vážek v tůních: návrh od otázky po model



Obrázek 14: Plánovaný příklad: larvy vážek v lesních a polních tůních. Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Ukázkovou studii z rámečků „Vaše vlastní studie" lze složit do jednoho návrhu. Jde o vymyšlený příklad, který ukazuje plánování; data k němu nemáme.

Krok	Návrh
Otázka	Mají larvy vážek v tůních obklopených lesem jinou délku těla než v tůních mezi poli?
Odezva	délka těla larvy (mm)
Prediktor	okolí tůně: `les`, nebo `pole`; mění se jen mezi tůněmi
Jednotka nezávislé replikace	tůň
Rozsah	6 oblastí, v každé 2 lesní a 2 polní tůně, v každé tůni 10 larev: 24 tůní, 240 larev
Co se mění uvnitř	velikost a stadium larev, datum odběru; oblast funguje jako blok
Pevné a náhodné faktory	okolí pevný faktor; tůň a oblast náhodné faktory
Hlavní rizika	lesní a polní tůně se mohou lišit i velikostí nebo hloubkou; některé tůně mohou během léta vyschnout

Vzorec modelu by vypadal takto:

```
delka_larvy_mm ~ okoli + (1 | oblast) + (1 | tun)
```

Na otázku o okolí tůně tak budeme mít 24 nezávislých odpovědí, ne 240. Kdybychom stejné úsilí věnovali 4 tůním po 60 larvách, měli bychom jen 2 lesní a 2 polní tůně, a tedy skoro stejnou past jako jedno pohnojené povodí. Model s oblastí i tůní obsahuje dva náhodné faktory; takové modely v této lekci neodhadujeme, ale zápis ukazuje, kam návrh míří.

8.3 Váš návrh na jedné stránce

Odpovědi z pěti rámečků „Vaše vlastní studie" můžete sepsat do jednoho přehledu. Takový jednostránkový návrh se hodí na začátku semestrální práce i při první konzultaci se školitelem.

Váš návrh na jedné stránce

1. **Otázka:** …
2. **Organismus a odezva (jednotka):** …
3. **Prediktor a úroveň, na které se mění:** …
4. **Jednotka nezávislé replikace:** …
5. **Počet jednotek a počet měření v každé z nich:** …
6. **Bloky, dvojice nebo opakovaná měření:** …
7. **Pevné a náhodné faktory:** …

8. **Vzorec modelu:** `odezva ~ prediktor + (1 | jednotka)`
9. **Největší riziko návrhu a jak ho zmenším:** …

9 Co když nás nezajímá délka, ale přežití?

V pokusu se dalo měřit i něco jiného než délka žabek: kolik z 50 pulců v každé nádrži přežilo až do metamorfózy. Taková odezva není spojité měření, ale počet z daného maxima, a normální rozdělení ji nepopíše dobře. Modely pro počty a pro odezvy typu ano/ne probereme v následující lekci.

Funkce `glmmTMB()`, kterou jsme použili, takové modely umí také. Stačí jí říct, jaké rozdělení má odezva, a člen `(1 | nadrz)` může zůstat stejný. Hierarchie dat totiž nezávisí na tom, co měříme, ale na tom, jak jsme data sebrali.

Shrnutí

- Počet řádků v tabulce není totéž co počet nezávislých opakování. Rozhoduje úroveň, na které se mění zkoumaný prediktor.
- Pseudoreplikace obvykle nezmění odhad efektu, ale podhodnotí jeho nejistotu: příliš malá standardní chyba, příliš úzký interval, příliš mnoho stupňů volnosti a častější falešné poplachy.
- Model z průměrů skupin je poctivé řešení, ale ztrácí informaci uvnitř skupin. Skupina jako pevný faktor pomůže jen pro prediktory, které se mění uvnitř skupin.
- Smíšený model s náhodným interceptem dává každé skupině vlastní výchozí úroveň, zachová všechna pozorování a nejistotu prediktoru, který se mění mezi skupinami, posoudí podle počtu skupin.
- Zda je skupinová proměnná pevný, nebo náhodný faktor, rozhoduje otázka: zajímají nás konkrétní úrovně, nebo jsou to zástupci mnoha možných? Náhodný faktor potřebuje dost úrovní.
- Návrh studie rozhoduje o tom, co z dat půjde říct. Chybějící nezávislé jednotky žádný model nenahradí.

Slovníček pojmů

Pojmy použité v těchto materiálech a jejich definice:

Interaktivní slovníček je dostupný online: https://cuni-natur-biostatistics.github.io/slovnik/