## 溶栓治疗评价表

适应证	符合	不详	不符合
年龄 18-75 岁			$\checkmark$
发病在 6h 以内			4
脑功能损害的体征持续存在超过 1 小时,且比较严重(NIHSS 7-22 分)	A		
脑CT已排除颅内出血,且无早期脑梗死低密度改变及其他明显早期脑梗死改变			$\checkmark$
意识清楚或轻度嗜睡	Ø		
血压控制在 180/100mmHg 以下	g		
排除 TIA	Ø		
患者或家属签署知情同意书	Ø		
禁忌症			
近3个月有头颅外伤史、脑梗死或心肌梗死病史			9
近3周内有胃肠道或泌尿系出血			1
近 2 周内有进行过大的手术			8
近1周内有不可压迫部位的动脉穿刺			4
严重的意识障碍			
严重心、肾、肝功能不全或严重糖尿病者			Ø
体检发现有活动性出血或外伤(如骨折)的证据			
凝血功能异常			Ø
已口服抗凝药,且 INR>1.5			8
48 小时内接受过肝素治疗(aPTT 超出正常范围)			Ø
血小板计数<100*10³/L			Ø
血糖<2.7mmol/L			Ø
收缩压>180mmHg, 或舒张压>100mmHg			8
妊娠			<b>D</b>
不合作			9
评价:□可以溶栓 溶栓方法:□ 介入动脉溶栓□ 静脉药物溶栓			
□ 红织纤溶酶原激活物 □ 尿激酶			
评价	者: _ <i>9</i>	5W%	

日期: \_\_ 11.1/レ