

二十四节气养生歌赏析 (廿二)※ ——小雪养生

王志华 李彦知 杨建宇*

(中国中医药现代远程教育杂志社, 北京 100021)

关键词: 二十四节气; 小雪; 养生歌诀

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2012.22.050

文章编号:1672-2779(2012)-22-0075-02

[歌诀] 小雪雪降温肾阳,
早卧晚起着寒装,
八段太极晒太阳,
保护心脑血管膏方,
温补益肾栗腰果,
丹参山楂血黏降。

1 原文解释

养生宜做到早睡早起, 注意防寒保暖; 多食温补益肾食物, 如栗子、山药等, 可常食丹参、山楂等避免血液黏稠, 也可服用膏方以保护心脑血管; 多做八段锦、太极拳等运动以健体防病; 常晒太阳避免精神抑郁。

2 节气特点

每年公历的11月22~23日, 视太阳到达黄经240°时为二十四节气中的小雪。小雪反映降雪开始的时间和程度。《月令七十二候集解》曰:“十月中, 雨下而为寒气所薄, 故凝而为雪。小者未盛之辞。”《群芳谱》中说:“小雪气寒而将雪矣, 地寒未甚而雪未大也”。意思是说, 小雪时节气温下降, 故而雪花生成; 但此阶段的雪常常是半冰半融状态, 或落到地面后立即融化了。我国古代将小雪分为三候:“一候虹藏不见; 二候天气上升地气下降; 三候闭塞而成冬。”由于天空中的阳气上升, 地中的阴气下降, 导致天地不通, 阴阳不交, 所以万物失去生机, 天地闭塞而转入严寒的冬天。到了小雪节气, 意味着华北地区将有降雪。如果说立冬节气标志着我国北方大部地区进入冬季, 到了小雪节气, 冷空气的直接表现就是使这些地区的气温逐步降到0℃以下, 长江中下游许多地区陆续进入冬季。虽说随着冬季的到来, 从全国范围来讲, 降水逐渐跌入一年中的低谷, 但江南比江北雨量还是偏多, 即便这一地区12月中下旬才有初雪, 但此时的阴雨天气, 给人们的感受已经不是深秋凉意, 而是湿冷了。0℃以下, 因此应注意添衣保暖。除了要穿上防寒的冬装

3 养生要点

3.1 起居养生

3.1.1 重视头部保暖 小雪时节很多地方的气温已降至

外, 应特别重视头部保暖。因为“头为诸阳之会”, 当头部受到风寒侵袭时, 血管收缩, 肌肉紧张, 很容易引发伤风感冒、头痛、面瘫, 甚者可引发心脑血管病。头部是大脑神经中枢的所在地, 每天都需要消耗大量的能量。因为头部皮肤薄、血管粗、毛发多, 故头部散发的热能也较大。由于头部与人体热平衡的关系非常密切, 寒冬季节若不注意头部保暖, 体热会很快从头部散发出去, 以至损害人体阳气, 消耗机体的能量。因此, 小雪节气人们外出时宜戴上帽子、围巾等以防头部受寒。

3.1.2 谨防室内空气干燥 小雪时节降水量偏少, 空气变得干燥。加之北方地区已经开始供暖, 故室内空气会变得异常干燥, 人易出现烦躁不安、口唇干裂、鼻咽干燥等现象。在干燥的环境中, 人体抵抗力会降低, 容易引发或者加重呼吸系统的疾病。有研究表明, 当空气相对湿度低于40% RH的时候, 鼻部和肺部呼吸道黏膜脱水, 弹性降低, 黏液分泌减少, 黏膜上的纤毛运动减慢, 灰尘、细菌等容易附着在黏膜上, 刺激喉部引发咳嗽, 人容易发生支气管炎、支气管哮喘以及呼吸道的其他疾病。因此小雪节气须防燥。除了要多喝水外, 还可通过使用加湿器、摆放植物等方式缓解室内空气干燥。

3.2 饮食养生 小雪时节天气寒冷, 寒为阴邪, 容易损伤肾阳, 故此时宜多食温补益肾食物, 如羊肉、牛肉、腰果、栗子、山药等。小雪节气时心脑血管病多发, 为了预防此类病的发生, 可常食丹参、山楂、黑木耳、西红柿、芹菜、红心萝卜等避免血液黏稠, 以保护心脑血管。除此之外, 也可有针对性的服用一些膏方来防止心脑血管病的发生。虽说服用膏方是冬季调养的好方法, 市场上也有成品膏方出售, 但若要达到最好的效果, 还是应该“一人一方”。也就是说, 膏方是药而不是保健品, 应依据个人的身体状况酌情选用, 膏方的选配与服用应在专业医师指导下进行。

3.3 运动养生

3.3.1 多做干浴按摩 小雪节气常做干浴按摩可预防流行性感。具体做法是: 站、坐练习均可, 全身放松, 两手掌相互摩擦至热, 先在面部按摩64次, 用手指自前头顶至后头部、侧头部做梳头动作64次, 使头皮发热, 然后用手掌搓两脚心, 各搓64下, 最后搓到前胸、腹背部, 做干洗澡, 直到搓热为止。

※ 基金项目: 世中联(北京)远程教育科技发展中心十二五攻关项目 NO: SZ125008

* 通讯作者

3.3.2 常练八段锦 八段锦是我国民间广泛流传的一种健身养生体操。它是由八种如“锦”缎般优美、柔顺的动作组成，又因此法共为八段，每段一个动作，故名为“八段锦”。常练八段锦可柔筋健骨、养气壮力，具有行气活血、协调五脏六腑之功能。现代医学研究也已证实，八段锦能改善神经体液调节功能和加强血液循环，对腹腔脏器有柔和的按摩作用，对神经系统、心血管系统、消化系统、呼吸系统及运动器官等都有良好的调节作用，是一种较好的体育运动。八段锦虽然是全身运动，但呼吸并不急促，而保持固有的自然呼吸并增加呼吸深度，每天坚持锻炼，对于防治高血压、胃溃疡、糖尿病以及许多慢性疾病有一定作用。八段锦动作简单，易记易学，适合男女老少等不同人群练习。

3.4 精神养生 小雪时节天气变化大，天气阴冷，气压

偏低，人体缺乏足够的光照，容易出现精神抑郁。现代医学研究发现，季节变化对抑郁患者有直接影响，因为与抑郁症相关的神经递质中，脑内5-羟色胺系统与季节变化密切相关。一般来说，在春夏之季，5-羟色胺系统功能最强，秋冬季节最弱。当日照时间减少，引起抑郁患者脑内5-羟色胺的缺少，人随之会出现失眠、烦躁、悲观、厌世等一系列症状。为避免此类情况的发生，小雪节气时人们最好多到户外晒太阳，以保持脑内5-羟色胺的稳定。也可多听听音乐以增添生活中的乐趣，缓解紧张情绪。清代医学家吴尚说：“七情之病，看花解闷，听曲消愁，有胜于服药者也。”足见音乐对人的精神影响之大。

(本文校对：张文娟 收稿日期：2012-09-23)

经阴道超声诊断女性输尿管下段结石 42 例分析

李海侠

(吉林省榆树市环城医院电诊科, 榆树 130400)

摘 要: 经阴道超声检查输尿管下段及下尿路是一种无创、可重复性，不受腹壁脂肪层厚度的影响、肠气的干扰及耻骨联合的遮挡，且更接近目标，图像更清晰，准确率高，同时还可以检查子宫、双侧附件、盆腔情况，以排除宫外孕、黄体破裂、急性盆腔炎等妇科急症，有助于进行鉴别诊断。

关键词: 输尿管下段结石；阴道超声

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2012.22.051

文章编号:1672-2779(2012)-22-0076-02

输尿管结石临床多见于年青人，位于输尿管下段最多，大多为单个，左右侧发病大致相似，患者常伴有恶心、呕吐，有时血尿为肉眼可见；输尿管膀胱间段最为狭小，结石容易停留；由于输尿管下段的肌肉和膀胱三角区相连，并且直接附着于后尿道，故常伴发尿频、尿急和尿痛的特有症状。我院采用经阴道超声检查，获得的超声图像比经腹更清晰，提高了诊断准确率，报告如下。

1 资料与方法

1.1 选择 2009年12月至2012年3月间在我院接受超声检查的输尿管下段结石患者42例病历资料，年龄19~42岁，患者临床生命体征：通常在运动后或夜间突然发生一侧腰背部剧烈疼痛，同时可以出现下腹部及大腿内侧疼痛、恶心呕吐、面色苍白等，疼痛之后，有些患者可以发现随尿排出的结石；约80%患者出现血尿，其中只有一部分能够肉眼发现尿是红色的；结石堵塞了输尿管，尿液排出不畅，造成肾积水；输尿管结石也可以诱发细菌感染，导致肾积脓、高热。

1.2 经阴道超声检查方法 使用彩色超声诊断仪。腹部探头频率3.5~5.0 MHz，阴道探头频率6.5 MHz。先经背侧探测双肾、输尿管上段，顺序向下探测输尿管下段、膀胱、尿道后。再经阴道超声检查，检查时，膀胱留有

约50~100 ml尿液，阴道探头置于阴道口，声束向前，先探查尿道；顺序向前、稍上方，探查膀胱；然后探头紧贴阴道穹隆部声束继续向前、稍后方偏左右探查左右侧输尿管下段。测量结石大小，测量输尿管扩张的内径，测量结石距膀胱入口的距离。

2 结果

经阴道超声检查，42例患者中有36例患者输尿管下段结石，结石最大为1.1cm×0.65cm，最小为0.35cm×0.102cm；膀胱结石4例，大的为0.5cm×0.4cm，小的为0.3cm×0.3cm；尿道结石2例，大小分别为0.5cm×0.4cm、0.3cm×0.2cm。

3 讨论

由于输尿管下段的肌肉和膀胱三角区相连，并且直接附着于后尿道，故常伴发尿频、尿急和尿痛的特有症状。在不影响尿流通过的较大结石，可仅有隐痛，血尿也轻。在孤立肾的输尿管结石阻塞或双侧输尿管阻塞，或一侧输尿管结石阻塞使对侧发生反射性无尿等情况，都可发生急性无尿，甚至肾功能不全。一旦出现输尿管下段结石的症状的话，就要积极的就医，就医的时候一定要找出是什么原因引起的。据专家介绍说，输尿管结石绝大多数来源于肾脏，包括肾结石或体外震波后结石碎块降落所致。由于尿盐晶体较易随尿液排入膀胱，故