

杨建宇二十四节气养生歌赏析(三)※

立 春

王志华 李彦知 杨建宇[△]

(中国中医药现代远程教育杂志社, 北京 100021)

关键词: 二十四节气; 立春; 养生歌诀; 赏析

doi: 10.3969/j.issn.1672-2779.2012.03.063

文章编号: 1672-2779 (2012) -03-0093-02

[歌诀] 立春踏青宜养肝, 早起晚睡泡脚眠, 防疫将息乍寒暖, 春捂养阳防春寒, 制怒怡情好心态, 寡欲避风似神仙。

1 原文解释

立春节气, 万物复苏, 天气乍暖还寒, 各种细菌病毒异常活跃, 人容易患病。此时养生要以养“阳”为主。为了与大自然生发的春气相呼应, 宜多到户外踏青游玩, 不仅使身体得到锻炼, 而且使心情得到放松; 在起居方面应做到晚睡早起, 睡前泡脚; 穿衣重视防风保暖, 不可过早脱掉棉衣; 保持心情舒畅, 避免抑郁发怒以利于养护肝脏。

2 节气特点

立春是一年中第一个节气, 在每年的公历 2 月 4 日前后。《月令七十二候集解》曰: “立春, 正月节。立, 建始也。”立春, 意味着春季的开始。此时太阳黄经为 315°。我国古代将立春的十五天分为三候: “一候东风解冻, 二候蜇虫始振, 三候鱼陟负冰”, 意思是说, 东风送暖, 大地开始解冻。立春五日后, 蜇居的虫类慢慢在洞中苏醒, 再过五日, 河里的冰开始溶化, 鱼开始到水面上游动, 此时水面上还有没完全溶解的碎冰片, 如同被鱼负着一般浮在水面。立春时节, 万物复苏, 天气乍暖还寒, 气温忽高忽低, 气压变化较大, 但气候仍以风寒为主, 因为当阴气和阳气进行交流的时候, 便会出现风, 尤其初春, 更是多风。此时在我国北方, 冷空气还占据着主导地位, 甚至有的年份还会有强冷空气向南侵袭, 造成较大范围的雨雪、大风和降温天气。

3 养生要点

3.1 起居养生 民间谚语说: “立春雨水到, 早起晚睡觉”, 这种养生方法有一定的科学依据。早在《黄帝内经》中就载: “春三月, 此谓发陈, 天地俱生, 万物以荣, 夜卧早起, 广步于庭, 被发缓形, 以使志生, 生而勿杀, 予而勿夺, 赏而勿罚, 此春气之应, 养生之道也。”也就是说, 立春以后的睡眠, 应遵循“晚睡早起, 与日俱兴”

的原则。但晚睡也要有个度, 一般不能超过 23 点, 起床时间可比冬季稍晚些。

立春一到, 有些人便急着脱去厚厚的冬衣, 这也是不可取的。因为在立春后的一段时间里, 天气乍暖还寒, 气温忽高忽低, 防风保暖仍是此时养生的重点。谚语说: “春捂秋冻, 百病难碰”。“春捂”要恰到好处。一般日平均气温未达到 10℃时就需要“捂”, 捂的重点部位应是背、腹、足底。“捂”背部可预防感冒的发生; “捂”腹部可以保护脾胃, 预防消化不良和腹泻; “捂”脚可预防“寒从脚下起”, 保护人体阳气。防止脚冷除了要加强脚部的保暖以外, 还可多采用泡脚的方法。足为肾之根, 泡脚可温肾阳。另外, 立春养生还应注意保健防病。因为天气刚刚转暖, 各种致病细菌、病毒的生长繁殖加快, 现代医学所说的流感、流脑、麻疹、猩红热、肺炎也多有发生和流行, 为了避免春季疾病的发生, 应尽量保持室内空气清新, 要勤开窗、常通风。

3.2 饮食养生

3.2.1 多食辛甘发散食物 立春饮食调养要注意阳气生发的特性。《素问·藏气法时论》曰: “肝主春, ……肝苦急, 急食甘以缓之, ……肝欲散, 急食辛以散之, 用辛补之, 酸泻之”。在五脏与五味的关系中, 酸味入肝, 具收敛之性, 不利于阳气的生发和肝气的疏泄, 因此立春应少吃酸性食物, 宜多吃辛甘发散之品, 如香菜、韭菜、洋葱、芥菜、萝卜、豆豉、茼蒿、茴香、菠菜、黄花菜、蕨菜、大枣、百合、荸荠、桂圆、银耳等。其中, 最值得一提的是萝卜。《燕京岁时记》中云: “是日, 富家多食春饼, 妇女等多买萝卜而食之, 曰‘咬春’。谓可以却春困也。”中医认为, 萝卜生食辛甘而性凉, 熟食味甘性平, 有顺气、宽中、生津、解毒、消积滞、宽胸膈、化痰热、散瘀血之功效。常食萝卜不但可解春困, 而且可理气、祛痰、通气、止咳、解酒等。

3.2.2 宜常吃芽菜 芽菜在古代被称为“种生”, 最常见的芽菜有豆芽、香椿芽、姜芽等。立春吃芽菜有助于人体阳气的升发。《黄帝内经》曰: “春三月, 此为发陈。”发, 是发散的意思; 陈, 即陈旧。《黄帝内经》把万物发芽的姿态不叫发新而叫发陈, 是因为这些植物的嫩芽具有将植物陈积物质发散掉的功效。因此, 如果人体的阳气发散不出来, 可借助这些嫩芽的力量来帮助发散。近

※基金项目: 世中联(北京)远程教育科技发展中心十二五攻关项目
[No: SZ125008]

△指导老师

年研究发现,芽菜中含有一种干扰素诱生剂,能诱生干扰素,增强机体抗病毒、抗癌肿的能力。芽菜的吃法以凉拌、煮汤为佳,这些吃法最能体现它幼嫩、爽口的特点。绿豆芽和黄豆芽性寒凉,在做芽菜的时候,可适量放一些辛辣、芳香、发散的调料,如配姜丝以中和其寒性。而绿豆芽寒性更重,易伤胃气,脾胃虚寒和患有慢性胃炎的人不要多吃。香椿芽最好先用沸水焯5min再凉拌。香椿不宜过多食用,否则易诱使痼疾复发,慢性病患者应少食或不食。

3.3 运动养生 立春时天气虽已转暖,但仍很寒冷。此时运动应选择踏青、散步、慢跑、打太极等强度不太大的方式,以微有汗出为度,避免运动后气喘吁吁、大汗淋漓,否则易损耗阳气,对养生不利。踏青是立春时较为适宜的运动。因为此时多去户外游玩,能与大自然生发的春气相呼应,不仅锻炼了身体,而且放松了心情,有利于调养肝脏。

立春时还应经常按摩肝脏和脾胃,具体方法是:①

双手平举,单脚站立,轻轻踮起脚跟,保持3~5秒后放下脚跟,一只脚做5次,再换另一只脚,如此循环3~5min,感觉头脑清醒即可。②双腿跨开,与肩同宽,脚尖朝向前方,维持身体的重心,让身体处于放松的状态。掌心向内,举起右臂,尽量贴近耳后,指尖向上延伸。手臂带动身体向左侧下压拉伸,细心感受右侧肋部的肌肉舒展。上下弹压15s后,换另一侧重复此动作。下压时不要勉强,有轻微紧绷感即可。

3.4 情志养生 立春养生应以养肝为主,养肝切忌“怒”。生气发怒易导致肝脏气血郁滞不畅而成疾。现代医学研究表明,不良的情绪易使神经内分泌系统功能紊乱,免疫功能下降,容易引发精神病、肝病、心脑血管等疾病。因此,立春时应注意调养精神,保持乐观情绪,力戒暴怒,即使生气也不要超过3min,尽量保持心态平和,以使肝气顺达,肝气正常生发。

(本文校对:王治华 收稿日期:2012-01-08)

家庭治疗与精神分裂症复发率的关联

刘翠欣 张月卿 胡学慧 黎梅 严玉民

(河北省荣军医院,保定 071000)

摘要:目的 探讨家庭治疗与精神分裂症复发率的关联。方法 将符合CCMD-3精神分裂症诊断标准痊愈出院的100例男病人随机分为实验组和对照组,实验组在药物治疗的基础上对亲属进行家庭治疗,每月1次,同时进行简明精神症状量表(BPRS)评定。对照组单纯采用药物治疗,每月进行简明精神症状量表评定。随访时间1年。结果 实验组病人1年的复发率为30%,明显低于对照组72%,差异具有统计学意义($\chi^2=17.65$, $P<0.01$)。结论 对亲属进行家庭治疗能降低精神分裂症患者的复发率。

关键词:亲属;家庭治疗;精神分裂症;复发

doi: 10.3969/j.issn.1672-2779.2012.03.064

文章编号:1672-2779(2012)-03-0094-02

精神分裂症是以基本个性改变,思维、情感、行为的分裂,精神活动与环境的不协调为主要特征的一类最常见的精神病^[1]。而且精神疾病的复发率很高,导致精神分裂症复发的影响因素很多。家庭成员的情感表达与精神分裂症的复发也有密切关系^[2]。家庭治疗顾名思义,是针对“家庭”为对象而实行的心理治疗,与以“个人”为对象的个人心理治疗不同。家庭治疗的特色是把焦点放在家庭各成员之间的人际关系上,不大注重各个成员的内在心理结构^[3]。为探讨对亲属家庭治疗与精神分裂症复发率的关联,我们进行了1年的家庭随访,进行了对照研究,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 所有病例均来自我院痊愈出院的男病人。入组标准:①符合CCMD-3精神分裂症诊断标准,治疗效果达到痊愈。②年龄23~47岁,平均年龄(34.5±12.53)岁。③入院时简明精神症状量表BPRS>35分,出院标准为痊愈(减分率≥75%)。我们于2006年2月至2007年2月共采集100例出院病例,随机分为实验组

和对照组,每组各50例。2组病人平均年龄为(33.87±12.25)岁和(34.25±12.70)岁,平均病程为(7.56±3.12)年和(7.71±3.47)年,2组病人的一般资料经统计学分析差异无统计学意义($P>0.05$),2组病人均以氯氮平治疗为主。

1.2 方法 由经过正规培训的一位心理医生和一名护士组成小组,对实验组的家庭进行随访,对亲属进行家庭治疗。家庭治疗时参加人员包括心理治疗师、患者及其父母或配偶及子女,每户分别进行。方法是在了解病态家庭结构成因的基础上,通过“孤掌难鸣,一个巴掌拍不响”、“转负为正”或“改观重解”、“旁观者清,当局者迷”等方式使家庭成员认识到症结所在,忽视过去,注重目前,以系统的眼光了解家庭问题,并策动家人行为的实际改善。善用家庭原有的正性情感,并发挥家庭里存在的各种心理资源来启发进步。进而共同改变其病态的认识行为模式,并反复练习,以取得家庭成员行为的实际改善^[3]。总之,治疗者要能兼顾彼此,注意保持平衡但中立的立场。原则上,家庭治疗者多注重家庭目